
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sudamérica y especialmente la Argentina y países limítrofes (Parte 1a.) 1913-1914 Dabbene, R. 1917

Cita: Dabbene, R. (1917) Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sudamérica y especialmente la Argentina y países limítrofes (Parte 1a.) 1913-1914. *Hornero* 001 (01) : 046-048

BIBLIOGRAFÍA

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sudamérica
y especialmente la Argentina y países limítrofes (1)

1913 - 1914

ALVAREZ, sobre aves uruguayas.

Exterior de las aves uruguayas. Costumbres, régimen alimenticio, su utilidad del punto de vista agrícola; por TEODORO ALVAREZ, Montevideo, 1913, pp. 1-88, 81 figs. en el texto.

BRABOURNE, sobre avicultura en el Paraguay.

Aviculture in Paraguay, in *The Avicultural Magazine*, vol. V, N.º 6, April 1914.

Algunas notas interesantes sobre aves de esa región.

BRABOURNE y CHUBB, sobre el género Tinamus.

A synopsis of the genus Tinamus. By Lord BRABOURNE and CH. CHUBB. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, XII, Dec. 1913, pp. 577-579.

BRABOURNE y CHUBB, sobre las especies del género Crypturus.

A key to the species of the genus Crypturus with descriptions of some new forms. By Lord BRABOURNE and CH. CHUBB. *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, ser. 8º, t. XIV, Oct. 1914, pp. 319-322.

Además de la clave para distinguir las especies de Crypturus, los autores describen un nuevo género: Crypturellus con *C. tataupa* como tipo.

BRABOURNE y CHUBB, sobre aves del Perú. *Bull. Brit. Ornith. Club*, vol. XXXV, N.º cc, Nov. 4, 1914, p. 20.

Describen. *Upucerthia juninensis*; tipo: Junín, Perú.

CHAPMAN, sobre nuevas aves neotropicales.

1. Diagnoses of apparently new Colombian Birds. Publ. II. By FRANK M. CHAPMAN. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, vol. XXXIII, March 19, 1914, pp. 167-192, map.

Describe varias formas relacionadas con especies argentinas: *Porphyriops melanops bogotensis* subsp. nov.; tipo: Savana de Bogotá; *Pitangus sulphuratus caucensis* subsp. nov.; tipo: Coli, valle del río Cauca, Colombia.

2. Descriptions of new Birds from Ecuador. By FRANK M. CHAPMAN. *Bull. Amer. Mus. N. H.*, XXXIII, May 22, 1914, pp. 317-322.

Describe: *Speotyto cunicularia punensis*, subsp. nov.; tipo: Isla Puna, Ecuador.

(1) La primera parte de estas noticias, la cual comprende sólo las principales publicaciones aparecidas desde 1912 hasta mediados de 1914, ha sido publicada en *Physis*, t. I, N.º 7, Dic. 31, 1914, pp. 478-483. Por ser esta lista muy extensa, la publicación completa se hará en varios números de la presente Revista.

CHAPMAN, sobre nuevas aves de Colombia.

Diagnoses of apparently new Colombian Birds. Publ. III. By FRANK M. CHAPMAN. *Bull. Amer. Mus. N. H.*, vol. XXXIII, Nov. 21, 1914, pp. 603-637.

Describe nuevas formas relacionadas con especies argentinas: *Streptoprocne zonaris altissima*, subsp. nov.; tipo: Laguneta, alt. 10.300 pies, Andes centrales de Colombia.

La distribución que el autor indica de las diferentes formas de *S. zonaris* en Sudamérica es la siguiente:

1. *S. zonaris zonaris* (SHAW). S. Brasil a Norte Argentina; localidad típica: Chapada, Matto Grosso.

2. *S. z. albicincta* (CAB.). Norte de Sud América; desde los límites sur de Amazonia a Costa Rica. Tipo: Guayanas.

3. *S. z. albissima* (CHAPM.) Zona templada (¿y alpina?) de Colombia y Ecuador.

Describe también: *Trogonurus curucui cupreicauda*, subsp. nov.; tipo Bagado, alt. 1.000 pies, Choco, Colombia; *Synallaxis azarae media*, subsp. nov.; tipo: Salento, alt. 7.000 pies. Andes centrales de Colombia; *Manacus manacus interior*, subsp. nov.; tipo: Villavicencio, Colombia; *M. m. bangsi*, subsp. nov.; tipo: Barbacoas, Nariño, Colombia; *M. m. leucochlamys*, subsp. nov.; tipo: Esmeralda, Ecuador; y añade la clave para distinguir las varias formas de *Manacus manacus*.

Otras formas descritas son: *Pachyrhamphus castaneus saturatus*, subsp. nov.; tipo: La Murelia, Colombia; *Pyroderus scutatus occidentalis*, subsp. nov.; tipo: San Antonio, Andes occidentales de Colombia

CLARKE, BROWN y RAMSAY, sobre ornitología de las regiones antárticas.

Ornithology of the Scottish National Antarctic Expedition. *Report Sci. Res. Scott. Nat. Antarc. Exped*, IV., 1913, pp. 203-306, 7 pls., 2 maps. By CLARKE, W. E.; BROWN, N. R. and RAMSAY, L. N. G.

Los autores describen los nidos, huevos y costumbres de varias especies de aves (*Pagodroma nivea*, *Daption capensis*, *Chionis alba*, etc.).

DABBENE, sobre un ave nueva para la Argentina.

Un ave nueva para la Argentina. Por ROBERTO DABBENE. *Boletín de la Soc. Physis*, I, N.º 7, Dic. 1914, pp. 435-436.

Manacus manacus gutturosus (DESM.) en Santa Ana, Misiones. Coleccionado por F. M. RODRÍGUEZ. Distribución de las formas.

DA COSTA, sobre el valor económico de las aves de São Paulo, Brasil

Os pequenos amigos da agricultura. Por J. WILSON DA COSTA. São Paulo, 1914, pp. 1-118; ilustr.

El autor expone los peligros que resultan de un desmonte extensivo. Indica las especies de aves útiles, los servicios económicos de

las aves domesticadas, etc. Entre las especies útiles cita el «alma de gato» (*Piaya cayana macroura*) que se alimenta de insectos y el carpintero (*Colaptes campestris*) destructor de hormigas.

FORBES, notas sobre el pelicano de MOLINA.

Notes on Molina's Pelican (*Pelecanus thagus*). By HENRY O. FORBES. *The Ibis*, tenth ser., vol. II, N.º 3, July 1914, pp. 403-420, pl. XIII.

El autor da interesantes noticias sobre las costumbres de ese pelicano y notas sobre la diferente coloración del pico y de las partes desnudas en varios ejemplares de sexo y edad distinta, acompañando el trabajo con una lámina en color en la cual están reproducidas dichas variaciones.

GAIN, sobre las costumbres del pingüín Adelia.

La vie et les mœurs du pingouin Adélie. Par L. GAIN. *IX Congrès Intern. Zool. Monaco*, 1914, pp. 501-521, 13 láms.

HARTERT, sobre una nueva forma de *Nycticorax* de las islas Malvinas.

New form: *Nycticorax cyanocephalus falklandicus*, Falkland Isl. By E. HARTERT. *Bull. Brit. Ornith. Club*, vol. XXXV, N.º CC, Nov. 1914, p. 15. Distinta de la forma que habita Chile y Patagonia.

El autor también confirma que la forma de Sudamérica conocida con el nombre de *N. tayazu-guira* es igual a *N. n. naevius* (BODD.) de Norte América.

HELLMAYR, sobre nuevas formas de aves de las regiones neotropicales.

Neue Formen aus dem neotropischen Gebiet. von HELLMAYR, C. E. *Verhandl. Ornith. Gesell. Bayern*, vol. XII, part. 3, pp. 206-214, 1914.

Describe una nueva forma de carpintero de la Argentina: *Dryobates mixtus berlepschi* subsp. nov., tipo: Neuquen, Argentina.

HELLMAYR y von SEILERN, sobre nuevas aves de la América tropical.

Neue Vögel aus dem tropischen America. Von HELLMAYR, C. E. und J. Graf von SEILERN. *Verhandl. Ornith. Gesell. Bayern*, XII, part. 1.ª, 1914, pp. 87-92.

Los autores describen una nueva forma de *Myiarchus tyrannulus*: *M. t. tobagensis* subsp. nov.; tipo: Tobago.

HELLMAYR y von SEILERN, sobre nuevas formas de aves de las Indias occidentales y de Venezuela.

Weitere neue formen aus Westindien und Venezuela. By HELLMAYR C. E., und J. Graf von SEILERN. *Verhandl. Ornith. Gesell. Bayern*, vol. XII, parte 3, pp. 201-205, 1914.

Describen nuevas formas relacionadas con especies argentinas: *Myiarchus tyrannulus sanctaluciae*, subsp. nov.; tipo: Isla Santa Lucía, Antillas; *Myiarchus ferox insulicola* subsp. nov.; tipo: isla de Tobago; *Dysithamnus mentalis cumbreanus*, subsp. nov.; tipo: Montañas de la costa de Venezuela. — R. D.

(Continuad).