
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lariformes de la República Argentina (Parte 1a.) Dabbene, R. 1918

Cita: Dabbene, R. (1918) Lariformes de la República Argentina (Parte 1a.).
Hornero 001 (02) : 049-056

EL HORNERO

REVISTA DE LA SOCIEDAD ORNITOLÓGICA DEL PLATA

DIRECTOR
ROBERTO DABBENE

SECRETARIO
PEDRO SERIÉ

T. I

BUENOS AIRES, MAYO DE 1918

N.º 2

SUMARIO

R. DABBENE.— <i>Lariformes de la República Argentina</i>	pág. 49
L. DINELLI.— <i>Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina.</i> ..	» 57
P. SERIÉ.— <i>Nombres vulgares y científicos de aves de Buenos Aires.</i>	» 68
C. A. MARELLI.— <i>Aves de Curuzú uatiá (Corrientes)</i> ..	» 74
A. CARDOSO.— <i>La ornitología fantástica de los conquistadores</i>	» 80
R. DABBENE.— <i>Notas sobre una colección de aves de la isla de Martín García.</i> ..	» 89
R. DABBENE.— <i>Distribución geográfica de algunas especies de aves</i> ..	» 96
R. DABBENE.— <i>Nido y pichones de un gavián, Parabuteo unicinctus (TEMM., Lám. I)</i> ..	» 100
E. BUDIN.— <i>El «keu», Tinamotis Pentlandi (VIGORS)</i>	» 101
R. DABBENE.— <i>Nidos del federal y del pecho colorado</i> ..	» 104
D. RODRIGUEZ.— <i>Costumbres de un dendrocoláptido, Pseudoseisura lophotes (REI HENB.)</i> ..	» 105
L. CASTILIÓN.— <i>Habitat de la avutarda</i> ..	» 108
R. DABBENE.— <i>Nidificación del pato barcino</i> ..	» 111
S. SHIPTON.— <i>Nueva subespecie de Balará cinerea (VIEILL.)</i> ..	» 113
A. RENARD.— <i>Sobre un nido de leñatero, Anumbius anumbi (VIEILL.)</i> ..	» 116
H. AMBROSETTI.— <i>Sobre un gavián, Rupornis Fucherani (VERR.)</i> ..	» 116
L. LUGONES.— <i>El hornero (poesía)</i> ..	» 117
<i>Movimiento social</i> ..	» 118
<i>Informaciones</i> ..	» 122
<i>Bibliografía</i> ..	» 127

LARIFORMES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(PARTE I.ª)

POR

ROBERTO DABBENE

El orden *Lariformes* comprende las gaviotas, los estérnidos llamados comúnmente gaviotines o golondrinas de mar, los léstridos y estercorarios (gaviotas pardas) y los rayadores o pico de tijera.

Son aves, en general, de tamaño mediano, buenas voladoras, acuáticas, con los dedos del pie completamente o parcialmente reunidos por una membrana; con alas muy largas, cola redondeada, cuadrada o más o menos profundamente ahorquillada, siempre compuesta de doce plumas (rectrices). Algunas especies recuerdan en el aspecto general a los petreles o aves de las tormentas, pero difieren de éstas por carecer de los tubos nasales sobre el caballete del pico.

Son aves sociables que forman grandes colonias; se alimentan de peces, gusanos y también de larvas y de insectos, y descansan nadando sobre el agua. Ponen, generalmente, tres huevos con manchas oscuras sobre fondo blanco, ante u oli-

váceo. Los pichones nacen cubiertos de plumón, pero pueden correr al corto tiempo y alimentarse por sí mismos.

Algunas especies recorren grandes distancias en sus migraciones, siendo la *Sterna paradisea* BRÜNN. (= *Sterna macrura* NAUM.) entre todas las aves, la que franquea el espacio más largo. Esta especie ha sido llamada también *Sterna arctica*, porque nidifica en las tierras más cercanas al polo Norte que se conocen. Cuando los pichones han llegado a su completo desarrollo, y al principio del invierno en el hemisferio boreal, emprende su viaje hacia el sur, y algunos meses después se encuentra en las playas del continente antártico, en donde pasa los meses del verano austral.

En el mes de Junio ya está de regreso a las tierras árticas para nidificar, habiendo así cumplido un viaje redondo de 22.000 millas. Es, por consiguiente, tal vez el único animal que puede gozar continuamente de la luz del día durante ocho meses del año.

Por sus caracteres anatómicos, los *Lariformes* están emparentados con los chorlos, aunque difieran de éstos en el aspecto externo.


Habitan las costas del mar, pero se encuentran también en el interior de los continentes, a lo largo del curso de los grandes ríos.

Comprenden tres familias: *Laridae* (gaviotas y gaviotines); *Catharactidae* o *Stercorariidae* (gaviotas pardas) y *Rhynchopidae* (rayadores), todas representadas en la República Argentina.

Clave para distinguir las familias ⁽¹⁾:

- a. Pico sin una cera córnea que cubra gran parte de la mandíbula superior, cuya extremidad no está terminada en gancho; ambas mandíbulas, siendo más o menos derechas y de igual longitud, o la superior débilmente arqueada en la extremidad sobre la inferior o aun la mandíbula inferiores más larga que la superior. Dedos con uñas débiles, plumas centrales de la cola generalmente más cortas que las laterales, en ningún caso sobresalen de és-

(1) NOTA.—Las claves están subordinadas únicamente a los caracteres que presentan las especies de cada familia que se encuentran en la República Argentina.



1. *LARUS maculipennis* Lichtenstein ($\frac{2}{3}$).
2. *STERNA hirundinacea* Lesson ($\frac{2}{3}$).
3. *RHYNCHOPS intercedens* Saunders ($\frac{2}{3}$).
4. *CATHARACTA skua antarctica* (Lesson); pico y extremidad de la cola ($\frac{2}{3}$).
5. *LEUCOPHAEUS Scoresbyi* (Trail); pico y lado interno del pie derecho ($\frac{2}{3}$).

tas. Coloración general del plumaje: blanco, gris ceniciento, o pardo moteado de blanco en las partes inferiores; gris ceniciento o gris perla, negro apizarrado, pardo o blanco moteado de pardo sobre las alas y dorso.

b. Mandíbula inferior igual o más corta que la superior, la cual en este caso está ligeramente arqueada en la extremidad

fam. I
LARIDÆ
 (gaviotas y gaviotines)
 figs. 1, 2 y 5

bb. Mandíbula inferior mucho más larga que la superior, ambas muy comprimidas lateralmente

fam. II
RHYNCHOPIDÆ
 (rayadores)
 fig. 3

aa. Pico con una cera córnea, la cual cubre más de la mitad de la mandíbula superior, cuya extremidad termina en un gancho muy robusto. Dedos con uñas fuertes y arqueadas; las plumas centrales de la cola sobresalen de las demás. Coloración general del plumaje: pardo uniforme y más o menos rojizo, a veces con algo blanco en las alas...

fam. III
CATHARACTIDÆ
 (gaviotas pardas)
 fig. 4

Familia I. **LARIDÆ**

Esta familia comprende dos subfamilias bien caracterizadas por la forma del pico y de la cola, cuyos caracteres más salientes están indicados en la clave que sigue:

a. Pico con la mandíbula superior doblada moderadamente en la extremidad sobre la inferior; cola cuadrada

subfam.
Larinae
 (gaviotas)
 figs. 1 y 5

aa. Pico con ambas mandíbulas casi iguales en longitud, la superior muy débilmente arqueada desde la mitad; cola distintamente ahorquillada.....

subfam.
Sterninae
 (gaviotines)
 fig. 2


La subfamilia *Larinae* o gaviotas, está representada en la Argentina por dos géneros: *Larus* y *Leucophaeus*; el primero con cinco especies, y con una el segundo, pudiéndose distinguir uno de otro por los caracteres indicados a continuación:

a. Dedo posterior libre; pico algo largo y no muy macizo, su altura máxima está contenida casi tres veces (o más) en el largo del caballete del pico (véase fig. 1)

gén. **LARUS**

Fig. 6, j.

Fig. 6, a.




Larus maculipennis (del Cat. B. Brit. Mus.)

Fig. 7, j.

Fig. 7 a.

Fig. 8.




Larus glaucoodes

L. serranus ad. (del Cat. B. Brit. Mus.)

Fig. 9, j.

Fig. 9, a.



Larus cirrhocephalus.

- aa. Dedo posterior unido al interno por una membrana rugosa; pico muy obtuso, su altura máxima está contenida sólo poco más de dos veces en la longitud del caballete del pico (véase fig. 5). Coloración general del plumaje: *Adulto*: cabeza, cuello y parte inferior del cuerpo, gris; dorso negro, escapulares y secundarias con ancha punta blanca; tapadas inferiores del ala gris humo; cola blanca, pico, tarso y dedos rojo vermellón. *Joven*: cabeza negro de humo, cuello parduzco; dorso pardo obscuro; partes inferiores blancas hasta el pecho, el cual es parduzco como el cuello, y cola blanca; pico amarillo de ocre en la base, negruzco en la extremidad; tarso y dedos pardo claro

gén. LEUCOPHAEUS
única especie
L. Scoresbyi con los
caracteres del género.

Las cinco especies argentinas del gén. *Larus*, pueden ser distinguidas por los siguientes caracteres:

- a. Dorso y alas, gris ceniciento o gris perla. Tamaño menor; ala plegada menos de 38 centímetros.
- b. *Adulto*: Cabeza y parte del cuello anterior, negro o pardo café, formando este color una especie de capucho.
Joven y el *adulto* sólo por corto espacio de tiempo en invierno, con la cabeza blanca o ante acanelada. Pico rojo obscuro amarillento o pardo obscuro. Cobijas inferiores del ala, gris pálido.
- c. Capucho pardo café en el *adulto*; cabeza blanca o ante acanelada en el *joven*, o por corto tiempo durante el invierno en el *adulto*. Pico, tarso y dedos, rojo obscuro.
- d. 1. Distribución del blanco y del negro sobre las tres plumas externas del ala como en la figura 6 a. Capucho café pardo o blanco en invierno.....

Larus maculipennis
adulto

2. Distribución del blanco y del negro sobre las tres plumas externas del ala como en la figura 6 j (*). Negro de la barba interna de la 3.^a pluma del ala

(*) El aumento o la disminución del blanco o del negro va variando con la edad del ave hasta tener una distribución fija en el *adulto*.

- (remige) alcanzando el mástil de la misma. Capucho blanco *Larus maculipennis*
joven
- dd. 1. Distribución del blanco y del negro sobre las tres plumas externas del ala como en la figura 7 a. Capucho café pardo..... *Larus glaucodes*
adulto
2. Distribución del blanco y del negro sobre las tres primeras plumas del ala como en la figura 7 j. Capucho ante acanelado. Negro de la barba interna de la 3.^a pluma del ala, no alcanzando el mástil de la misma..... *Larus glaucodes*
joven
- cc. Capucho negro en el adulto; cabeza blanca en el joven y en el adulto en invierno. Pico, tarsos y dedos rojo oscuro en el adulto; pardo oscuro en el joven. Distribución del blanco y negro sobre las tres primeras plumas del ala como en la figura 8..... *Larus serranus*
adulto
- bb. Cabeza y parte del cuello anterior, gris ceniciento como el dorso, formando un capucho de ese color. En invierno, por poco tiempo, la cabeza es blanca.
1. Distribución del blanco y negro sobre las tres primeras plumas del ala, como en la figura 9 a. Pico, tarso y dedos, carmesí..... *Larus cirrhocephalus*
adulto
2. Distribución del blanco y negro sobre las tres primeras plumas del ala como en la figura 9 j. Pico amarillento en la base, negruzco en la punta, tarsos y dedos pardo oscuros. Cobijas inferiores del ala color plomo. Capucho blanco..... *Larus cirrhocephalus*
joven
- aa. Dorso y alas negro apizarrado en el adulto, blanco moteado de pardo o pardo moteado de blanco en el joven. Cabeza y cola blancas en el adulto; más o menos moteadas de pardo en el joven. Partes inferiores blancas en el adulto; pardas, moteadas de blanco, en el joven; tamaño mayor, ala plegada, siempre más de 38 centímetros *Larus dominicanus*

La distribución de las 6 especies nombradas es la siguiente:

1. **Larus maculipennis** LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl. Berl. Mus.*, p. 83 (1823 — Montevideo). «Gaviota de capucho café».

Distribución: Costa Atlántica, desde Alagoa en el Brasil al Chubut en Patagonia; al oeste, a través de los Andes a Chile. En el interior de la República Argentina ha sido señalada en Córdoba y Tucumán.

2. **Larus cirrhocephalus** VIEILLOT, *Nouv. Dict. d'Hist. Nat.*, XXI, p. 502 (1818 — Brasil). «Gaviota de capucho gris».

Distribución: Costa sur del Brasil, del Uruguay y de la Provincia de Buenos Aires, ríos Paraná y Paraguay hasta Matto Grosso, y probablemente de allí, cruzando el continente hasta la costa del Perú. En el interior de la República Argentina ha sido señalada hasta Jujuy por LÖNNBERG.

3. **Larus glaucodes** MEYEN, *Nov. Act. Acad. Caes. Leop.*, XVI, p. 115, pl. XXIV (1834 — Chile).

Distribución: Patagonia, Tierra del Fuego, Malvinas, Estrecho de Magallanes y costa de Chile hasta Coquimbo.

4. **Larus serranus** TSCHUDI, *Arch. für Naturg.*, I, p. 314 (1844 — Perú). «Gaviota serrana».

Distribución: Costa del Ecuador y lagos andinos del Perú Bolivia, Chile y altiplanicie de la República Argentina, (cumbres Calchaquies, Tucumán y puna de Jujuy).

5. **Larus dominicanus** LICHTENSTEIN, *Verz. Doubl. Berl. Mus.*, p. 82 (1823 — «Habitat ad littora Brasiliæ») «Gaviota cocinera».

Distribución: Ambas costas de Sudamérica, desde los 10° lat. sur a las regiones antárticas; Malvinas, Georgia del sur. En el interior de la República Argentina, hasta los lagos andinos de la Patagonia occidental.

6. **Leucophæus Scoresbyi** TRAILL «Gaviota».

Larus scoresbii TRAILL, *Mem. Wern. Soc.*, p. 514 (1823—New South Shetland Islands).

Distribución: Este de Patagonia, Malvinas, Nuevas Shetland del sur, regiones antárticas al sur del Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes y costa chilena del Pacífico, hasta Chiloé.

(Continuará.)