

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Aves de Curuzú Cuatiá (Corrientes) Marelli, C. A. 1918

Cita: Marelli, C. A. (1918) Aves de Curuzú Cuatiá (Corrientes). *Hornero* 001 (02) : 074-080

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

## AVES DE CURUZÚ CUATIA (CORRIENTES)

POR

CARLOS A. MARELLI

A fines de los meses de Abril y Mayo del año pasado, tuve que trasladarme por dos veces consecutivas a Curuzú Cuatiá, una de las ciudades más importantes de la parte central sud de la provincia de Corrientes, con motivo de verificar la eficacia de algunos específicos garrapaticidas en la hacienda vacuna de aquel territorio. El objetivo esencial era diferente del que se propone este artículo, no obstante lo cual, dados mis afectos por esta rama de la Historia Natural, invitado por los miembros de la Comisión redactora de *EL HORNERO*, el Sr. Dr. ROBERTO DABBENE y el Sr. Don PEDRO SERIÉ, a presentar una modesta lista de las aves de aquel punto del país, pude reunir de mis recuerdos y colecciones realizadas en los breves momentos libres y con el concurso además de los compañeros de la comisión de ensayos, el Dr. PASCUAL TROISE de Gualaguaychú, el Dr. PRUDENCIO M. PLAZA de Villaguay, en la Provincia de Entre Ríos, de Don FLORENCIO SANTA CRUZ de Concordia, y del Dr. CELESTINO POZZI de Curuzú Cuatiá, los datos y las especies que menciono en la siguiente lista.

No nos era posible apartarnos de los caminos, y no dudo que nuevas colecciones en otras épocas del año han de dar muchos resultados para la distribución de las especies de aves en el país y para sus migraciones, siempre que sea posible reunir la mayor serie de listas de avifaunas locales.

La provincia de Corrientes no ha sido todavía bien explorada desde este punto de vista, y en este sentido esperamos tener en los señores CARLOS POZZI y Dr. CELESTINO POZZI buenos colaboradores, quienes además nos proporcionaron en aquel paraje muchas comodidades con la fineza y la buena amistad que los caracteriza.

1. **Rhea americana Rothschildi** Brab. et Chubb. — Domesticado he visto al ñandú o avestruz americano en los alrededores de la ciudad de Curuzú Cuatiá.

2. **Crypturus obsoletus** (TEMM.) — Creo haber podido identificar con esta especie un ejemplar que observé en los alrededores de la ciudad mencionada, ateniéndome a su coloración pardo olivácea, con los flancos canela claro y a la cabeza negruzca como también a su tamaño algo menor que el de la otra especie *Crypturus tataupa*; no me fué posible procurarla.

3. **Rhynchotus rufescens** (TEMM.) — Anoté varios ejemplares de esta martineta o perdiz grande.

4. **Nothura maculosa** (TEMM.) — La perdiz o perdiz común abunda tanto como en la provincia de Entre Ríos, y es frecuente verla por ambos lados de la vía del Ferrocarril Entre Ríos que va a Concordia, donde es poco objeto de caza no obstante sus excelentes condiciones para serlo. Obtenida en Entre Ríos por BARROWS, es natural que su dispersión alcance a la Provincia de Corrientes. La hemos visto a ambos costados de los caminos en dirección oeste y nordeste desde la ciudad de Curuzú Cuatiá.

5. **Penelope obscura** (TEMM.) — He apuntado dos ejemplares domesticados en la estancia del Sr. DE LA FUENTE que pertenecen a esta forma de Pava de monte; y por lo que sabemos ha sido anotada en la parte nordeste de la República Argentina por varios observadores, alcanzando la República del Paraguay y sudeste del Brasil.

6. **Notioenas maculosa** (TEMM.) RIDGW. — Es frecuente encontrarla aislada y fácil de ser confundida, vista desde lejos, con la paloma doméstica.

7. **Picazurus picazuro** (TEMM.) RIDGW. — Suele ser encontrada sola y en pequeñas bandadas como de 10 a 15 individuos, a los cuales era posible aproximársele bastante. Las barras blancas ribeteadas de negro del cogote, la distinguía de las manchas profusas blancas del dorso y las alas con gotas apicales del mismo color que tiene *Columba maculosa* TEMMINCK.

8. **Zenaida auriculata** (DES MURS).—Esta paloma torcaz la he notado una sola vez por esa fecha y su presencia fué indicada en la amplia zona que comprende el norte y nordeste de la Argentina.

9. **Columbina picui** (TEMM.)—Rarísimos ejemplares de esta palomita pude encontrar, la que como la anterior fué recogida en el norte y nordeste argentino.

10. **Pardirallus rytirhynchus** (VIEILL.).—He visto algunos especímenes en los bañados hacia el nordeste de Curuzú Cuatiá de esta gallineta de agua, que he podido identificarla así por su color pardo verdoso y por su tamaño. Fué coleccionada en el norte del país.

11. **Aramides ypacaha** (VIEILL.).—Pude observar un ejemplar cautivo en un establecimiento de campo al nordeste de Curuzú Cuatiá, y según informaciones obtenidas procedía de la localidad; lo conocían vulgarmente con el nombre de *pakaá* los paisanos del paraje.

12. **Belonopterus cayennensis grisescens** (PRAŽÁK).—El teruterero lo he notado varias veces.

13. **Jacana jacana** (LINN.).—Observé en los bañados algunos individuos de esta especie.

14. **Ardea cocoi** (LINN.).—Vi ejemplares aislados de garza mora hacia el establecimiento de San Miguel y de San Pedro.

15. **Euxenura magüari** (GM.).—Había muy lejos en el campo tomando el sol muchos especímenes desparramados de esta especie de cigüeña, comprobando su presencia por los despojos de un individuo.

16. **Mycteria mycteria** (LICHT.) H. et R. VON IHERING.—Otra cigüeña que incluyo aquí por su coloración toda blanca es el jabirú. Dejo constancia de que su presencia debe ser verificada con informaciones complementarias, debido a que no fué posible obtener ejemplares.

17. **Dendrocygna fulva** (GM.).—He observado pequeñas bandadas y especímenes aislados del pato silbón, única especie de la familia que me fué posible identificar sin poder procurármelo.

18. **Chauna Salvadorii** (Brab. et Chubb).—Ejemplares aislados del chajá hacia el nordeste en dirección al establecimiento de San Pedro.

19. **Catharista atratus brasiliensis** (BP.).—Vi en San Miguel varios individuos de este buitre todo negro, que se habían lanzado sobre una res muerta hacía pocas horas, sin poder obtener ningún ejemplar no obstante la buena puntería del Dr. DE LA PLAZA.

20. **Polyborus plancus** (MILLER) [= *tharus* auct.].—Esta ave común o carancho no era fácil tenerla a una distancia conveniente para ser alcanzada.

21. **Milvago chimango** (VIEILL.).—Tan abundante como la especie anterior.

22. **Urubitinga urubitinga** (GM.).—Este gavilán lo he visto una sola vez en San Miguel.

23. **Tinnunculus sparverius australis** (RIDGW.).—El halconcito más común de la Argentina, hallábase también en aquella parte de la Provincia de Corrientes.

24. **Speotyto cunicularia** (MOL.).—La lechucita de las vizcacheras fué el único representante de la familia que distinguí por aquella latitud.

25. **Amazona aestiva** (LINN.).—He visto este loro cautivo en San Pedro y se me afirmó que anidaban en la localidad.

26. **Streptoceryle torquata** (LINN.).—Apunté en mi libreta unos ejemplares en libertad de este martín pescador, por cuyo tamaño y caracteres exteriores me inclino a referirlo a la especie mencionada. En dirección hacia San Pedro.

27. **Podager nacunda** (VIEILL.).—En el establecimiento de San Miguel y en uno de los espinillares próximos, el Sr. Dr. P. TROISE me indicó esta ave que identifiqué con la especie mencionada.

28. **Guira guirã** (GM.).—La urraca común, como así es conocida vulgarmente en la provincia de Buenos Aires, la he observado en pequeñas bandadas no mayores de diez individuos en San Miguel y en San Pedro.

29. **Furnarius rufus rufus** (GM.). — El hornero abundaba en los montes de espinillos al nordeste y al oeste de Curuzú Cuatiá; sus nidos se orientaban en todas direcciones y las entradas eran dextrorsas y sinistrorsas; también he visto nidos en la cima de los postes comunes de alambrados.

30. **Siptornis Orbignyi** (REICHENB.). — Recogido hacia el nordeste de la ciudad nombrada.

31. **Coryphistera alaudina** (BURM.). — Obtenida en los bosques y bosquecillos de las vecindades de Curuzú Cuatiá y por vez primera se cita en la provincia de Corrientes.

32. **Anumbius anumbi** (VIEILL.). — Citaré también ejemplares cazados de este conocido leñatero o carpintero, en las vecindades del pueblo y por ambos lados en los caminos hacia San Pedro y San Miguel.

33. **Pseudoseisura lophotes** (REICHENB.). — He cazado individuos de esta especie hacia el nordeste en los espinillares. Se distinguía en el monte por su vuelo sostenido en un mismo sentido con las inflexiones producidas por el peso del animal al desplazarse en su medio.

34. **Picolaptes angustirostris** (VIEILL.). — Debo este ejemplar al Sr. Dr. C. Pozzi quien me lo obtuvo de su establecimiento de San Miguel, situado a nueve leguas al oeste de Curuzú Cuatiá.

35. **Taenioptera cinerea** (VIEILL.) [= *mengeta* auct.]. — Uno de los tiránidos más comunes en los campos de los alrededores de la ciudad y en dirección a los establecimientos nombrados. El Dr. Pozzi me remitió algunos.

36. **Taenioptera coronata** (VIEILL.). — Obtuve un ejemplar de esta especie en un bosquecillo vecino del pueblo y era menos abundante que el anterior.

37. **Taenioptera irupero** (VIEILL.) « Viudita ». — La viudita es uno de los pájaros más hermosos que alegran la vista por su color blanco y las alas con las primarias negras, excepto las más internas blancas en la base con el ápice negro; volaba muy graciosamente de poste en poste y de árbol en árbol

haciendo variados movimientos tratando de ocultarse entre la maleza, y al reaparecer posábase en la parte más alta de las ramitas de los árboles, repitiendo sucesivamente el mismo movimiento.

38. **Sisopygis icterophrys** (VIEILL.). — Cacé un ejemplar de esta especie como a unas cuatro leguas hacia el nordeste de Curuzú Cuatiá, en los montes que se encuentran a ambos lados del camino.

39. **Machetornis rixosa rixosa** (VIEILL.). — He obtenido varios ejemplares de este tiránido en los mismos parajes ya citados.

40. **Serpophaga subcristata** (VIEILL.). — Vi varios especímenes de este pajarito conocido en Buenos Aires con el nombre de piojito.

41. **Pitangus sulphuratus bolivianus** (LAFR.). — Anoté ejemplares en ambos establecimientos y obtuve algunos en los espinillares de las vecindades de Curuzú Cuatiá, donde es conocido con el nombre vulgar de pitogüé, trátase del bienteveo común o pitohué.

42. **Pyrocephalus rubinus rubinus** (BODD.). — Obtuve un individuo joven de esta especie cerca de Curuzú Cuatiá.

43. **Mimus triurus** (VIEILL.). — Encontré varios individuos de esta especie de calandria.

44. **Polioptila dumicola** (VIEILL.). — Vi ejemplares del piojito azulado en las proximidades de los caminos al internarse entre los montes al nordeste de la ciudad mencionada.

45. **Anthus correndera** VIEILL. — En mis excursiones pude cerciorarme también de la presencia de la cachila.

46. **Compsothlypis pitiayumi pitiayumi** (VIEILL.). — Anoté un ejemplar de este hermoso pajarito.

47. **Saltator aurantirostris** VIEILL. — Cacé un individuo de esta especie en los primeros bosquecillos de espinillos próximos a Curuzú Cuatiá:

48. **Sicalis Pelzeni** SCI. — Era fácil encontrarlo en las proximidades y en el pueblo mismo el jilguero o jilguerito amarillo.

49. **Passer domesticus** (LINN.). — Los gorriones han alcanzado también a la provincia de Corrientes.

50. **Brachospiza capensis capensis** (P. L. S. MÜLLER). — El chingolo no faltaba en aquella parte casi central de la provincia mencionada.

51. **Paroaria cucullata** (LATH.). — Era común en el monte de aquella localidad el cardenal y fué posible obtener varios especímenes.

52. **Gubernatrix cristata** (VIEILL.). — El cardenal amarillo era tan común como el anterior y obtuve algunos ejemplares.

53. **Molothrus bonariensis bonariensis** (GM.). — El tordo común o renegrido era un ave común en aquella localidad.

54. **Trupialis militaris Defilippii** BP. — He visto también a este pecho rojo.

55. **Cyanocorax chrysops** (VIEILL.). — La urraca azul la he visto cautiva en un establecimiento de campo de Curuzú Cuatiá.

56. **Cyanocorax caeruleus** (VIEILL.). — Conjuntamente y en las mismas condiciones que la anterior anoté la urraca celeste.

---

## LA ORNITOLOGÍA FANTÁSTICA DE LOS CONQUISTADORES (1)

POR

ANÍBAL CARDOSO

---

Entre las distintas citas y descripciones que en libros y documentos nos ha dejado la época colonial, pintando con fantásticos colores una fauna extravagante y fenomenal, merecen un buen capítulo las que se refieren a las aves de nuestro país (2), cuya

---

(1) En 1916 presenté, como delegado del Museo Nacional de Historia Natural, al Congreso de Historia y Bibliografía, un trabajo titulado: «Nuestros conocimientos en ciencias naturales durante la época colonial». De dicho trabajo extracto algunos pasajes que dedico a EL HORNERO.

(2) Entiéndase las «Provincias del Río de la Plata», pues me refiero a la época colonial.