

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Nido y pichones de un Gavilán *Parabuteo unicinctus* (Temminck) Dabbene, R. 1918

Cita: Dabbene, R. (1918) Nido y pichones de un Gavilán *Parabuteo unicinctus* (Temminck). *Hornero* 001 (02) : 100-101

Un ejemplar de Bauru, São Paulo (colección del Museo Paulista).

Un ejemplar de Bahía, en la colección del conde H. v. BERLEPSCH.

Un ejemplar (♂ ad.) de Cantagallo, Río de Janeiro, obtenido por el señor C. EULER y existente en las colecciones del Museo de Berlín.

La segunda especie, *Cooperastur poliogaster* (TEMME), parece ser aún más escasa.

Además del tipo (♀ ad.) obtenido por NATTERER en Ypanema, São Paulo, y existente en el Museo de Leyden, se conocen solamente los siguientes ejemplares:

Uno, adulto, procedente del valle del Río Amazonas (colección SALVIN-GODMAN).

Un ejemplar joven de Puerto Bertoni, Paraguay (colección A. de W. BERTONI).

Otro (♂ no enteramente adulto) conseguido en Santa Ana, Misiones Argentinas, en Agosto de 1912 por el señor FRANCISCO M. RODRÍGUEZ y existente en las colecciones del Museo Nacional de Buenos Aires.

R. DABBENE.

## NIDO Y PICHONES DE UN GAVILÁN

### *PARABUTEO UNICINCTUS* (TEMMINCK)

El artístico grupo representado en la fotografía (lám. I) constituye una hermosa preparación taxidérmica, adquirida, recientemente por el Museo Nacional de Historia Natural. Su autor es el conocido coleccionista señor DEMETRIO RODRÍGUEZ.

Tanto el nido como las aves fueron obtenidos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por el mismo señor RODRÍGUEZ a mediados del mes de Octubre.

Este gavilán no es escaso en la provincia mencionada, y WITHINGTON, en sus notas, (1), dice haber conseguido en Lomas de Zamora varios especímenes de esta ave, así como sus nidos, pero éstos estaban probablemente abandonados, pues no hace

(1) *The Ibis*, 1888, p. 469

*EL HORNERO*

(Vol. I — 1918)

LÁM. I.



MUS. NAC. H. N. BS. AIRES.

FOT. C. VILLALOBOS.

*Parabuteo unicinctus* con su nido y pichones.

mención de los hijuelos, los cuales por lo que me consta no han sido descriptos.

Los dos pichones que el señor RODRÍGUEZ halló en el nido, y que supone habrían salido del huevo sólo desde un par de días, tenían ya los ojos abiertos pero el cuerpo totalmente cubierto de fino plumón. Este es de un color gamuza acanelado claro, más pálido sobre los lados del cuerpo y casi blanco sobre la parte inferior. El pico es negro pardusco en el culmen, amarillento en la extremidad; la mandíbula, la cera y los tarsos amarillento sucio. Longitud total: 95 mm.; tarsos: 19 mm., pico: 10 mm.

El nido es de forma casi circular, muy poco cóncavo y construido con gramíneas, pasto seco y ramitas de sauce y ceibo entrelazadas, y amontonadas, quedando el material más grueso en la periferia.

Sus dimensiones son: 78 cm. de diámetro por 22 cm. de espesor.

Estaba situado en la bifurcación de los troncos de un ceibo (*Erythrina cristagalli* L.) a una altura de siete metros del suelo.

R. DABBENE.

#### EL «KEU»

##### *TINAMOTIS PENTLANDI* VIGORS

Durante un viaje que realicé en el mes de Diciembre del año 1912 en la provincia de Jujuy, hacia el este de la Quebrada de Humahuaca, a unos 4.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, tuve ocasión de cazar unos ejemplares de estas interesantes aves.

El «keu» pertenece a los Tinámidos o perdices sudamericanas. Habita las altiplanicies de la Cordillera o sus contrafuertes. Nunca lo he observado a una altitud menor de 4.000 metros; escoge para sus correrías los lugares abiertos, poblados de pequeñas colinas, que a su vez vienen a formar cañadas generalmente surcadas por algún arroyo; sitios alegres que frecuentan muchas otras aves, vicuñas y guanacos.

El «keu» debe su nombre indígena a una onomatopeya de su grito. Vive en pequeñas colonias de seis individuos más o menos. Seguramente hay un solo macho para cada colonia.