
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Descripción de dos formas de aves aparentemente nuevas procedentes del N. W. de la República Argentina Dabbene, R. 1918

Cita: Dabbene, R. (1918) Descripción de dos formas de aves aparentemente nuevas procedentes del N. W. de la República Argentina. *Hornero* 001 (03) : 178-182

NOTAS

DESCRIPCIÓN DE DOS FORMAS DE AVES APARENTEMENTE NUEVAS PROCEDENTES DEL N. W. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Revisando las colecciones de aves ingresadas en el Museo Nacional de Historia Natural, durante estos últimos años, he tenido la ocasión de observar varios ejemplares pertenecientes a los géneros *Penelope* y *Spinus*, los cuales representan formas, al parecer, nuevas para la ciencia ⁽¹⁾.

Son las siguientes:

1. *Penelope nigrifrons* sp. n.

Caracteres distintivos de la especie.—Intermediaria entre *Penelope speciosa* TODD ⁽²⁾ y *Penelope Sclateri* GRAY, de las que difiere por la presencia de una estrecha faja negra que ocupa la parte inferior de la frente, prolongándose hasta arriba de los ojos, y por la coloración más uniforme y casi sin contraste de las partes inferiores y superiores del cuerpo.

Con respecto a este último carácter, la nueva especie difiere de *Penelope speciosa* por tener los lados y la parte inferior del pecho y superior del abdomen del mismo color oliváceo-parduzco de la parte emplumada del cuello y superior del pecho. La región inferior del abdomen, las subcaudales, los flancos y rabadilla son casi de ese mismo color y sólo tienen un ligero baño de pardo acanelado, mientras que en *P. speciosa* esas partes son bermejas o rojizo ferrugíneas, y este color se extiende casi hasta la parte superior del pecho. En *Penelope Sclateri* GRAY el abdomen, el dorso superiormente y la rabadilla son canela rojizos, y además las dimensiones son apreciablemente menores.

Descripción.—Nuca, cuello, parte superior del dorso, escapu-

⁽¹⁾ La descripción de estas nuevas especies apareció en la revista *Physis*, t. IV, págs. 102-106 (1918).

⁽²⁾ *Proc. Bi. L. Soc. Wash.*, XXVIII, April 1915, p. 82. Tipo: Río Suruta, prov. del Sara, Bolivia; J. STEINBACH in colección Carnegie Museum,

lares, cobijas del ala, pecho y parte superior del abdomen de un oliváceo parduzco con ligeros reflejos verdosos bronceados especialmente en la parte superior del cuerpo. Cada pluma de esas partes, con excepción de las de la nuca y de la parte posterior del cuello, tienen ambos lados más o menos anchamente ribeteados de blanco. Dorso inferior, rabadilla, crissum, subcaudales, parte inferior del abdomen, flancos y muslos de un parduzco acanelado uniforme. Esta coloración va insensiblemente confundiéndose con el tinte oliváceo parduzco de lo restante de la parte inferior del cuerpo, sin presentar un contraste muy aparente en el tono de la coloración general. Una faja negra de unos seis milímetros de ancho ocupa la frente directamente sobre el pico, mientras que en los costados va estrechándose y limita superiormente la parte desnuda situada entre el pico y el ojo, para continuar en forma de una línea superciliar muy angosta y de color negro parduzco hasta la región auricular. Las demás plumas de la frente y las que siguen como faja a los lados de la cabeza sobre la línea superciliar indicada son de un gris plateado y sólo tienen una angosta línea negruzca a lo largo del mástil. Las plumas de la corona son parduzco oliváceas, con borde ceniciento claro y un espacio emplumado que ocupa la parte mediana de la garganta y la barba es negro parduzco uniforme. La faja sobre las mejillas varía de gris a parduzco, y las auriculares son negro parduzcas. Remiges primarias y rectrices laterales negro parduzcas, con ligero lustre verdoso bronceado; las secundarias y rectrices medianas olivácea parduzcas con lustre bronceado. Tarsos amarillento blanquecinos, emplumados en casi todo el tercio superior; pico parduzco, partes desnudas del cuello carmesí. Iris pardo.

Sexos similares, la hembra de dimensiones algo menores.

♂ ala, 290-300 mm.; cola, 310 mm.; tarsos, 63 mm.; dedo medio sin uña, 56 mm.

Tipo, ♂ ad. Cerro de Calilegua, Ledesma, prov. de Jujuy, alt. 2300 m., Agosto 10, 1917. EMILIO BUDIN, in colección del Museo Nacional de Historia Natural, N.º 9415 a.

Especímenes examinados: 3 (1 ♂, 2 ♀♀).

Distribución geográfica.—Región N. W. de la República Argentina. Prov. Jujuy.

Esta pava de monte representa probablemente una forma meridional de *Penelope Sclateri* GRAY, o tal vez de *Penelope speciosa* TODD. De esta última especie, el Museo Nacional posee dos viejos ejemplares procedentes de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (colección San Martín), y otro recientemente adquirido, procedente de Buenavista, provincia del Sara, Bolivia (colección J. STEINBACH), y por consiguiente de la misma localidad del tipo de la especie.

Los dos ejemplares de Santa Cruz de la Sierra son los mismos que BURMEISTER ha citado con el nombre de *Penelope boliviana* [= *jacquasú* SPIX] en los *Proc. Zool. Soc. London*, 1871, p. 701 y que SCLATER, en una nota al pie de la misma página supuso pertenecer a *Penelope Sclateri* GRAY.

De la primera especie difieren por tener la faja emplumada de la mejilla gris en vez de pardo oscuro uniforme, y de la segunda por las dimensiones mucho mayores y además por el tono de la coloración general.

Las dos citas arriba indicadas deben entonces entrar en la sinonimia de *Penelope speciosa* TODD. •

También en la colección del Museo Nacional existen dos ejemplares (♂ y ♀) de una especie de *Penelope* cazados en San Pedro de Colalao, prov. de Tucumán, en Septiembre de 1898, por el Dr. FELIPE SILVESTRI, los cuales no me ha sido posible referir a ninguna especie conocida. En los caracteres generales concuerdan con los ejemplares de *Penelope obscura Bridgesi* GRAY, que habita también dicha provincia, pero difieren en la coloración general de las partes inferiores del cuerpo, las que son de un pardo rojizo en vez de pardo chocolate. También las dimensiones de los ejemplares citados son mayores que las de *Penelope obscura Bridgesi*, midiendo el ala 350 mm. y la cola 360 mm.

Las especies del género *Penelope* señaladas hasta ahora entre los límites del territorio argentino son las siguientes:

I. *Penelope obscura obscura* TEMM.

Penelope obscura TEMMINCK, *Hist. Nat. Pig. et Gall.*, iii, pp. 68, 693 (1815 — ex AZARA et ILLIGER: Paraguay).

Distrib. en la República Argentina.—Río Pilcomayo—G. KERR; Mocovi, Chaco Austral—S. VENTURI; islas del Uruguay—W. B. BARROWS.

2. *Penelope obscura Bridgesi* GRAY.

Penelope Bridgesi GRAY, *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1860, p. 270 (1860 — Bolivia).

Distrib. en la República Argentina.—Tucumán: Tafi — S. VENTURI; San Pablo — L. DINELLI; Villa Nougúés y Ñorco — L. DINELLI; Vipos — P. GIRARD. Salta: Orán — F. M. RODRÍGUEZ.

3. *Penelope superciliaris* TEMM.

Penelope superciliaris TEMMINCK, *Hist. Nat. Fig. et Gall.*, iii, p. 72. (1815 — Brésil).

Distrib. en la República Argentina.—Misiones: Bompland — P. JÖRGENSEN; Santa Ana — F. M. RODRÍGUEZ.

4. *Penelope nigrifrons* sp. n.

Distrib. N. W. República Argentina.—Cerro de Calilegua, provincia de Jujuy — E. BUDIN.

2. *Spinus ictericus magnirostris* subsp. nov.

Caracteres subespecíficos.—Difiere de *Spinus ictericus ictericus* (LICHT.) del sur del Brasil, Paraguay y de la República Argentina, por sus dimensiones algo mayores y por el pico mucho más grueso y robusto. Además la coloración general de las partes superiores es algo más oscura.

Ala, 76-79 mm.; cola, 52-53 mm.; tarso, 16-18 mm.; culmen (expuesto) 12-14 mm.; altura del pico al nivel de los respiraderos, 9 1/2-10 mm.; ancho en el mismo punto, 8 mm.

El pico en los ejemplares de *Spinus ictericus* (LICHT.) que he observado, tiene las dimensiones siguientes:

Culmen (expuesto), 9-10; altura al nivel de las ventanas nasales, 6-7; ancho en el mismo punto, 6 mm.

El largo del ala en la especie típica varía de 70-74 mm.

Tipo ♂ ad. Sierra del Cajón, Salta, alt. 4000 m. Enero 12, 1914.—D. RODRÍGUEZ, in colecc. Mus. Nac., Buenos Aires, N.º 8502 a.

Especímenes examinados: 4, de las procedencias siguientes:

- a) ♂ ad. Sierra del Cajón, Salta N. W. Argentina, altura 4000 m.—D. RODRÍGUEZ. Tipo de la especie.
- b) ♀ ad. Sierra del Cajón, Salta, alt. 4000 m., Enero 12, 1914.—D. RODRÍGUEZ.

- c) ♀ ad. Laguna Blanca, Catamarca, N. W. Argentina, alt. 3200 m., Octubre 9, 1917.—J. MOGENSEN, in colecc. STEWART SHIPTON, Concepción, Tucumán.
- d) ♀ ad. Laguna Blanca, Catamarca, alt. 3200 m. Octubre 10, 1917—J. MOGENSEN, in colecc. STEWART SHIPTON.

Probablemente es esta una forma localizada en la región montañosa del N. W de la República Argentina y a una altura entre 3000 y 4000 m.

ROBERTO DABBENE.

MELANISMO TEMPORARIO DE LA PALOMITA

COLUMBINA PICUI (TEMM.)

He tenido siempre una marcada simpatía por las torcacitas, esas graciosas avecillas que constituyen uno de los mejores adornos de nuestros jardines, parques y montes. En el Bosque de La Plata abunda, y abundaba mucho más en épocas anteriores cuando su área ocupaba una superficie décupla de la actual; debiendo atravesar cada día, y a menudo varias veces, ese bosque para ir a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, con frecuencia, especialmente en primavera y en particular después de algún fuerte temporal, hallaba pichones de esta ave, caídos de los nidos, que llevaba a casa y criaba con la mayor facilidad; esos animalitos, especialmente si eran capturados muy jóvenes, se amansaban de un modo admirable y se volvían tan familiares y cariñosos para conmigo, que se acostumbraban a seguirme y todas las veces que me aproximaba a ellos demostraban su placer de verme haciendo temblar levemente sus alas cerradas y emitiendo una especie de corto y apagado gemido. Su alimentación fué siempre de sólo alpiste (*Phalaris canariensis*), y puedo decir exclusiva, pues muy pocas aceptaron el arroz crudo, rechazando constantemente el cocido o las migas de pan; soltadas con las alas cortadas en el jardín, entonces buscaban con afán semillas de graminácea, de caapikí (*Stellaria media*) y de otras pequeñas cariofiláceas y compositáceas, y además tragaban con verdadera