

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves Reborati, J. H. 1918

Cita: Reborati, J. H. (1918) Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. *Hornero* 001 (03) : 193b-194

NIDOS Y HUEVOS DE VENCEJOS <sup>(1)</sup>

*Cypseloides fumigatus* (STREUBEL), *Streptoprocne zonaris* (SHAW) (Lám. II).—Estas especies de cipsélidos construyen sus nidos contra las paredes verticales de los cerros de Tucumán, a una altitud de 700 a 800 metros sobre el nivel del mar.

El nido tiene la forma de un cono truncado, de 10 a 15 centímetros de alto por 8 a 10 de ancho y está formado de musgos, mezclado con tierra y pequeñas piedras, el todo fuertemente adherido a la pared de la barranca. Es macizo y muy poco hondo, teniendo solamente de dos a tres centímetros de profundidad. En esta pequeña concavidad y sobre algunos fragmentos de ramitas o helechos, la hembra deposita generalmente un solo huevo, de forma alargada, con polos desiguales y enteramente blanco.

Los huevos de *Cypseloides fumigatus*, miden 26-24 × 19-17 milímetros y los de *Streptoprocne zonaris*, 39 × 24 mm.

SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS  
ESPECIES DE AVES

En Concepción (Corrientes) se ha observado en estos días la presencia de bandadas de pequeños loritos con cabeza colorada, que se posan en las quintas de la población. Según me ha comunicado la dirección de EL HORNERO, pertenecen a la especie *Pionopsitta pileata*, (SCOP.). Hasta ahora no eran conocidos en el departamento, aunque se sabía que abundan en el Paraguay.

También ha llamado la atención la presencia en las mismas quintas y en la misma fecha, de un pájaro negro, con el pecho colorado, del tamaño de una paloma casera, llamado «yacú toro» en el Paraguay y Misiones. La dirección de EL HORNERO me comunicó, también, que este pájaro es el *Pyroderus scutatus*

(1) Los huevos y los nidos han sido colectados por el señor PABLO GIRARD, de Tucumán, y la fotografía tomada por el señor ANTONIO POZZI representa una reconstrucción del habitat de estas aves, hecha por el señor SANTIAGO POZZI, la que pertenece a las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires.

Para la determinación de las especies, véase el n.º 1.º, pp. 6-8 de esta Revista.

(SHAW), perteneciente a la familia de los Cotíngidos, bastante común en el Paraguay, Misiones y en los Estados del sureste del Brasil.

Hago observar, por último, que en este mismo pueblo han aparecido, desde unos tres años, grandes cantidades de gorriones (*Passer domesticus*), pájaros antes completamente desconocidos en esta región. Se nota, sin embargo, que su número va decreciendo, sea porque el ambiente no les es propicio o porque no encuentran la clase de alimento que les conviene.

JOSÉ H. REBORATTI.

Concepción (Corrientes), Julio 31 de 1918.

#### CAPTURA DE ALGUNAS ESPECIES RARAS DE AVES NEOTROPICALES

El señor JUAN MOGENSEN de Concepción (Tucumán), me ha enviado, para la determinación, tres ejemplares de aves colectadas por él en Misiones y en Gualfiin (Catamarca), las cuales pertenecen a dos especies muy poco comunes de la avifauna neotropical.

Son las siguientes:

##### I. *Rhynchocyclus megacephalus* (SWAINSON)

Obtenido en Río Segundo, Alto Paraná, Misiones argentinas, en Diciembre de 1917. Colección STEWART SHIPTON, Concepción, Tucumán.

Esta especie es nueva para la avifauna argentina.

El ejemplar colectado por el señor MOGENSEN es una hembra adulta y corresponde perfectamente a la detallada descripción que ha dado HELLMAYR en *Verhandl. Zool. - Bot. Gesell. Wien*, t. 53, p. 206 (1903), especialmente en lo que se refiere a las dos líneas pardo negruzcas que desde la frente se prolongan por los lados de la cabeza hasta la nuca, y otras amarillentas más abajo de éstas, sobre los ojos; por el color amarillento rojizo de las fajas que cruzan el ala y por el color verdoso oliváceo sucio de la garganta.

El pico es negro por arriba, blanquizco en la mitad basal de la mandíbula.