
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos (Parte 3a.) 1914-1915 Dabbene, R. 1918

Cita: Dabbene, R. (1918) Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos (Parte 3a.) 1914-1915. *Hornero* 001 (03) : 211-212

BIBLIOGRAFÍA

Recientes publicaciones ornitológicas sobre Sud América y especialmente la Argentina y países vecinos

1914-1915

(Véase página 128)

SNETHLAGE, aves amazónicas.

Catálogo das aves amazónicas, contendo todas as especies descritas e mencionadas até 1913. Pela Dr. EMILIA SNETHLAGE. *Boletín do Museu Goeldi (Museu Paraense) de Historia Natural e Ethnographia*, vol. VIII, 1914, pp. 1-532, 6 pls., 1 mapa.

En esta obra, una de las mejores publicadas en Sud América, la Dra. SNETHLAGE describe 1117 especies de aves del valle del Amazonas. La mayor parte de las especies tienen su correspondiente nombre vulgar y además hay claves para las órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies. También da algunas noticias sobre las exploraciones efectuadas en el Norte del Brasil y notas sobre los límites de la región tratada en la obra. Acompañan este trabajo algunas láminas y un mapa. En las láminas están representados los caracteres de estructura de las aves, para ayudar a la identificación de las especies.

TODD, sobre nuevas aves neotropicales.

Preliminary Diagnoses of apparently new Birds from tropical America. By W. E. CLYDE TODD. *Proc. Biol. Soc. Washington*, XXVI, Aug. 1913, pp. 169-174.

Describe las siguientes nuevas formas relacionadas con especies argentinas: *Basileuterus auricapillus viridescens* subsp. nov., tipo Buena Vista, prov. del Sara, Bolivia; *Elaenia boliviana* sp. nov., tipo Puerto Suárez, Bolivia; *Leptopogon amaurocephalus diversus* subsp. nov., tipo Mamotoco, Santa Marta, Colombia; *Myiarchus fortirostris* sp. nov., próxima de *M. ferox ferocior* CAB., tipo prov. del Sara, Bolivia; *Thamnophilus doliatus heteroleucus* subsp. nov., tipo Tocuyo, Venezuela; *Xenops genibarbis neglectus* subsp. nov., tipo Las Quiguas, Venezuela; *Picolaptes brevittatus certhiolus* subsp. nov., tipo Curicke, Río Grande, Bolivia. También describe el autor un nuevo género y una nueva especie de picaflor: *Microstilbon insperatus* de Buena Vista, Bolivia, el cual es próximo al gen. *Chaetocercus*.

1915

BANGS, sobre las varias formas americanas de *Gallinula chloropus* (L.).

The american forms of *Gallinula chloropus* (L.). By O'BANGS. *Proc. New Engl. Zool. Club*, V, May, 1915, pp. 98-99.

El autor da la siguiente distribución para las varias formas de esta gallineta:

Gallinula chloropus galeata (Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y Norte de Argentina); *G. c. pauxilla*, subsp. nov., (W. Colombia); *G. c. cachinnans*, subsp. nov., (parte Central y Este de Norte America, al Sur hasta Nicaragua. El tipo procede de Florida); *G. c. cerceris* (isla de Santa Lucía, Antillas menores); *G. c. garmani* (Suroeste de Sud America: Perú, Bolivia, Chile).

CHAPMAN, sobre nuevas aves de Colombia y Centro America.

Descriptions of proposed new Birds from Central and South America. By FRANK M. CHAPMAN. *Bull. Amer. Mus. N. H.*, New York, XXXIV, art. XI, May 27, 1915, pp. 363-388.

El autor describe varias formas de aves, entre las cuales algunas relacionadas con especies argentinas: *Chaemepelia rufipennis caucae*, subsp. nov., tipo, Valle del Río Cauca, Colombia; *Leptoptila rufaxilla pallidipectus*, subsp. nov., tipo, Buena Vista, alt. 4500 pies, Andes del Este de Colombia; *Asio flammeus bogotensis*, subsp. nov., tipo Savanna de Bogotá, Colombia. También trata de las varias formas sudamericanas de *Cerchneis sparverius*, enumerando las siguientes: *C. sp. isabellinus*; *C. sp. ochraceus*; *C. sp. caucae* subsp. nov., tipo La Mannelita, alt. 3500 pies, valle del Río Cauca, Colombia; *C. sp. aequatorialis*; *C. sp. cinnamomimus*; *C. sp. fernandensis*, subsp. nov., tipo, isla de Juan Fernandez, Chile, y *C. sp. australis*, cuya localidad típica debe ser Bahía, Brasil, en vez de Río Paraná. Además, describe una nueva forma de carpintero: *Chloronerpes rubiginosus buenavistae*, tipo Buena Vista, Andes del Este de Colombia.

CHAPMAN, sobre nuevas aves de Colombia.

Diagnoses of apparently new Colombian Birds, Publ. IV. By FRANK M. CHAPMAN. *Bull. Amer. Mus. N. H.*, New York, XXXIV, art. XXIII, Dic. 30, 1915, pp. 635-662.

El autor describe algunas formas relacionadas con especies argentinas: *Tachytriorchis albicaudatus exiguus*, subsp. nov., tipo, Barrigón. Colombia; *Herpetotheres cachinnans fulvescens*, subsp. nov., tipo, Alto Bonito, alt. 1500 pies, Antioquía, Colombia; *Habrura pectoralis bogotensis*, subsp. nov., tipo, Savanna de Bogotá, Colombia; *Catamenia analoides schistaceifrons*, subsp. nov., tipo Cundinamarca, Colombia; *Phrygillus unicolor grandis*, subsp. nov., tipo, Paramo de Santa Isabel, alt. 12700 pies, Andes centrales de Colombia; *Phrygillus unicolor geospizapsis*; *Phrygillus unicolor nivarius*; *Molothrus bonariensis aequatorialis*, subsp. nov., tipo, Barbacoas, Narina, Sureste de Colombia.

R. D.

(Continuad).