
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Especies de aves nuevas para el Paraguay Winkelried Bertoni de, A. 1919

Cita: Winkelried Bertoni de, A. (1919) Especies de aves nuevas para el Paraguay. *Hornero* 001 (04) : 255-259

tinto, aplícala al hierro que a su contacto se hace pedazos y le deja franca la entrada para alimentar a sus polluelos» (1).

GUEVARA no acepta la noticia de LOZANO, diciendo por su parte que «ese atributo no se hace creíble si primero no se nos muestra esta prodigiosa hierba o por lo menos, el lugar donde se cría». En cambio de esta negación nos da algunos datos interesantes: «Carpintero dicen a un pájaro pequeño de color oscuro, con gargantilla o collarín amarillo en unos, azul en otros, de pico negro, colorado y amarillo. Anidan en los árboles más duros abriendo con el pico en los troncos concavidad suficiente para su domicilio. Sacuden con tanto aire los troncos con la dureza de los picos que imitan propiamente los golpes de hacha con que un robusto carpintero desbasta a fuerza de brazos las superfluidades de los maderos».

AZARA dice que los guaraníes les llaman Ipecús y describe varias especies (*Colaptes*, *Chrysoptilus*, *Dendrocopus*, etc.).

ESPECIES DE AVES NUEVAS PARA EL PARAGUAY

POR

A. DE WINKELRIED BERTONI

COLUMBIFORMES

I. *Columba speciosa* GM.

En 1915 fué cazado en Puerto Bertoni un ejemplar de esta hermosa paloma que llegó mezclado con la común *C. rufina* TEMM. La especie se conocía sólo del Brasil.

(1) He dicho que es esta una leyenda también europea, porque recuerdo haber leído en «El Correo de Ultramar» (1868?) el cuento de «Maese Bloch», en que hay una referencia muy semejante.

2. **Columba plumbea** VIEILL.

Es otra especie brasileña. La observé de paso en Puerto Bertoni, en Julio de 1917 y 1918, cuando las otras se retiran. Se trata de ejemplares solitarios, al parecer desviados de su ruta habitual, como la especie anterior.

LARIFORMES

3. **Larus maculipennis** LICHT.

En Julio de 1916 mi hermano WERNER cazó un ejemplar en Puerto Bertoni. (Colecc. Bertoni).

CORACIIFORMES

4. **Antrostomus sericeocaudatus** (CASS.)

No es raro en el interior de los bosques de Puerto Bertoni e Ihguasú. Encontré varios nidos con 2 huevos blancos. La especie se parece a *A. rufus* (BODD.).

SCANSORES

5. **Baillonius bailloni** (VIEILL.)

De este tucano brasileño mi colección posee una ♀ cazada en Puerto Bertoni por Octubre de 1917. En muy pocos años observé el paso de raros ejemplares solitarios, que no se detienen en la localidad; procedían de la costa argentina.

PASSERIFORMES

6. **Synallaxis albescens** TEMM.

Poseo un ejemplar cazado en Puerto Bertoni. Queda, pues, confirmado que existe también en el Paraguay.

7. **Heliobletus contaminatus** (LICHT.)

Esta especie, que en vida se confunde fácilmente con los *Xenops*, no parece rara en los bosques de Puerto Bertoni, de

donde tengo varios ejemplares. No tiene nada que ver con el *H. superciliosus* LICHT. (¿AZARA n.º 245), con el que los autores le suelen confundir. En cuanto al n.º 245 de AZARA, para mí no puede ser otra cosa que *Asthenes striaticeps* (LAFR. & ORB.) o muy próximo.

8. *Xenops genibarbis pelzelni* (HELLM.)

En Noviembre 1917 obtuve una ♀ en Puerto Bertoni. Es nuevo para el Alto Paraná; el SR. DABBENE ya lo había señalado para Villarrica, donde lo cazó el Sr. POSNER.

9. *Manacus manacus gutturosa* (DESM.)

Mi colección contiene una ♀ cazada en Puerto Bertoni, donde parece que llega sólo por casualidad en invierno. El Sr. F. M. RODRIGUEZ lo obtuvo de las Misiones argentinas.

10. *Pipra fasciicauda* HELLM.

Este precioso píprido pasó todo el verano último en un reducido lugar de Puerto Bertoni, donde cacé cinco ejemplares de ambos sexos. Aún no puedo decir si habita la región o llegó de paso. Yo ya lo había señalado para el interior del Paraguay, y en la colección del finado GUILLERMO FOSTER, vi un ejemplar ♂ de Sapucay. Sin embargo el SR. HELLMAYR, en «*Genera Avium*» afirma que el género *Pipra* no existe en el Paraguay. La especie se conocía del Brasil central y Bolivia (1).

11. *Planesticus fumigatus* (LICHT.)

En Agosto del año pasado obtuve una ♀ en Puerto Bertoni. Aunque el ejemplar no es bien adulto, la determinación no me parece dudosa por ser—según RIDGWAY—la única especie conocida con la primera falange del dedo medio toda unida al exterior. La especie es del Norte del Brasil.

(1) BERTONI, A. DE W. «Segunda Contrib. a la Ornit. paraguaya», pág. 5, Asunción, 1906 (*Pipra fasciata*).

12. **Thraupis palmarum** (WIED)

Parece que esta especie llega también sólo accidentalmente. En Puerto Bertoni observé la primera pareja en Agosto de 1917 y luego toda una familia pasó el verano en la quinta, en perfecta armonía con *T. sayaca* (L.); actualmente desapareció totalmente. No le hallo diferencia con la forma típica de Bahía.

13. **Amaurospiza moesta** (HARTL.)

El Sr. MOGENSEN obtuvo este raro y mal conocido fringílido de las cataratas del Iguasú. Existe también en los bosques de Puerto Bertoni y parece comer los brotes tiernos de la graminácea llamada *Takuarembó* (*Chusquea ramossisima* LINDM.). En cuanto al género a que pertenece la especie hay mucho desacuerdo entre los autores. Yo, en «Fauna Paraguaya», sospeché que podría ser un *Dolospingus*.

14. **Sporophila pileata** (SCL.)

El ejemplar de Encarnación (Fauna Paraguaya, pág. 65), es un ♂ joven en muda. Más tarde cacé un ejemplar en Puerto Bertoni, de paso durante el invierno.

NOTA.—Descontando la *Pipra fasciicauda*, el *Planesticus fumigatus* y los dendrocoláptidos, hasta comprobación definitiva, todas las especies mencionadas pueden considerarse también como visitantes del bosque de la costa argentina que dista medio kilómetro de Puerto Bertoni. Es también posible que los años de clima anormal en que nos hallamos hayan desviado accidentalmente algunas de las especies y que no volveremos a verlas en muchos años. Aprovecho la oportunidad para señalar una especie nueva para la República Argentina, es el que tengo por:

Scytalopus speluncae (MÉNÉTR.)

Habita toda la costa misionera, sin pasar al Paraguay. Mis ejemplares fueron cazados en Puerto León a poca distancia del Paraná, pero lo observé hasta a 10 leguas al interior.

Puerto Bertoni, Septiembre 5 de 1918.