
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nidificación del cucúlido *Coccyzus melanocoryphus* Vieill Dabbene, R. 1926

Cita: Dabbene, R. (1926) Nidificación del cucúlido *Coccyzus melanocoryphus* Vieill. *Hornero* 003 (04) : 420d-422

De donde se desprende que estas avecitas, tan útiles, suelen también pagar su tributo al afán de destrucción y de lucro, que hasta ahora se conformaba con la caza de granívoras — tordos, mixtos y chingolos — y que seguramente fué facilitado el exterminio por el hecho de reunirse las golondrinas en bandadas numerosas, en los hilos del telégrafo, poco antes de emprender sus migraciones habituales.

Pedro Serié.

Captura de un ejemplar del picaflor, *Hylocharis cyanus* (Vieill.) en la provincia de Buenos Aires. — En el mes de Enero del corriente año ha sido cazado en Necochea, este de la provincia de Buenos Aires, un ejemplar macho de este picaflor. Su presencia en una latitud tan meridional debe ser considerada puramente accidental. — R. D.

Nueva captura del chorlo, *Mesoscolopax borealis*. — El señor Juan B. Daguerre ha obtenido nuevamente en Rosas, F. C. S., provincia de Buenos Aires, un ejemplar de este escaso chorlo, en fecha 11 de Enero del corriente año.

Como la vez anterior (1), se trata de un individuo aislado, que se encontraba junto con una becasa de mar, *Limosa haemastica* a la orilla de un canal. De esta última especie el Dr. José Llanos nos ha enviado desde Dolores, provincia de Buenos Aires, un cierto número de ejemplares, cazados en los meses de Junio y Julio de este año, y nos comunica también no ser escaso en los meses de invierno. Es interesante la presencia de estos chorlos en la Argentina durante esta estación, pues esta época corresponde al tiempo de la reproducción de la especie durante el cual la mayor parte de los individuos deberían estar en la extremidad norte del continente americano. Muchos de los ejemplares remitidos de Dolores por el Dr. Llanos se encuentran con el plumaje de cría y sólo dos revisten el plumaje invernal gris plomizo por arriba y blanco inferiormente. — R. D.

Semialbinismo en el chorlo cabezón. — El Dr. Llanos nos ha remitido también, de Dolores, provincia de Buenos Aires, un ejemplar de *Oreophilus ruficollis* semialbino.

Tiene la mayor parte de la cabeza, del dorso y las partes inferiores blancas. — R. D.

Nidificación del cucúlido *Coccyzus melanocoryphus* Vieill. — La fotografía aquí reproducida representa el nido y los pichones del cucúlido *Coccyzus melanocoryphus*. El nido es parecido a los de las pa-

(1) Hornero, t. III, N.º 3, p. 284.



lomas y está, como el de éstas, construido con ramitas entrelazadas. Fué hallado el 12 de febrero, en Los Talas, provincia de Buenos Aires, y estaba situado sobre la horquilla de las ramas de un álamo de la Carolina a la altura de un metro y medio del suelo. Contenía dos pichones ya bien desarrollados y en condiciones para dejar pronto el nido.

Hace unos años el señor Sternberg, encontró en los campos cerea de Buenos Aires, un nido de la paloma *Zenaida auriculata* en el que una hembra del cucúlido arriba nombrado había depositado 3 huevos. Trátándose de una sola observación, nos limitamos a señalar este caso, sin poder asegurar si este hecho es frecuente entre esta especie de *Coccyzus*.

R. D.

Tres aves nuevas para la avifauna uruguaya. — Nuestro distinguido consocio, el doctor Carlos Torres de la Llosa, nos comunica que ha obtenido en el departamento de Montevideo, varios ejemplares de la gallaretita, *Creciscus melanophaius* Vieill.; un ejemplar macho del águila negra, *Urubitinga urubitinga* (Gm.), capturado en el departamento de Rocha; y tres ejemplares de la gallineta enana, *Porzana spiloptera* Durnford, obtenidos en Barra de Pando, departamento de Canelones. Esta última especie sólo era conocida de la Argentina. Todos esos ejemplares de aves están vivos y se conservan en el Jardín Zoológico de Montevideo.

Las tres especies enumeradas no figuran en la lista de aves uruguayas publicada por el señor Tremoleras en el volumen II, pp. 10-25, de esta Revista.

R. D.

RECTIFICACIONES

En el vol. 1 (1918) 119, entre las aves donadas, se mencionan unas especies que envié en aquella época. Como no les había puesto la procedencia en un papelito atado a una de las patas, como se acostumbra, se dice que el Furnárido, *Siptornis sordida affinis* Berl. ha sido cazado en marzo en el valle de los Reartes. Las otras especies que iban con ésta, eran de esa localidad, pero ella, fué obtenida en la ciudad de Córdoba en los meses de primavera.

En el vol. 3 (1924) 276, en un artículo del señor E. Lynch Arribáza, «Nombres vulgares argentinos de las aves silvestres de la República», al tratar la familia *Trochilidae*, la Dirección de EL HORNERO, ha agregado, al que dice el autor del trabajo mencionado, a la especie *Hylocharis ruficollis* (Vieill.), el de «picaflor o rundún» en Córdoba, según A. Castellanos. Hace unos años le di al doctor Dabbene una lista de las aves de Córdoba cuyos nombres vulgares yo conocía o que en alguna parte de esa provincia los había oído emplear. Con el nombre de «picaflor» o de «rundún», designan en general a los colibríes en aquella provincia, pero a las especies que allí existen, *Helimaster furcifer*, *Chlorostilben aureoventris* y *Lesbia sparganura* y no al *Hylocharis ruficollis* (Vieill.) que vine a conocer aquí en el Tigre, que nunca he visto en Córdoba ni está citado por allá.

ALBERTO CASTELLANOS.