
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de las aves argentinas Zotta, A. R. 1935

Cita: Zotta, A. R. (1935) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 006 (01) : 151-196

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES ARGENTINAS

Comprende la enumeración de todas las especies y subespecies conocidas en la Argentina, ordenadas taxonómicamente según la moderna nomenclatura ornitológica, con sus nombres técnicos y vulgares y su distribución geográfica.

ELABORADA POR LA SECCION ORNITOLÓGICA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

CLASE AVES

SUBCLASE NEORNITHES

SUPERORDEN PALAEOGNATHAE

ORDEN RHEIFORMES

Familia **Rheidae** (*Ñandúes, o Avestruces americanos*)

1. RHEA Brisson, 1760

- (¹) * 1. **Rhea americana albescens** Lynch Arribálzaga et Holmberg Ñandú, Suri.
Avestruz, Choique,

Rhea albescens Lynch Arribálzaga et Holmberg, El Naturalista Argentino, Vol. 1.
1878, p. 101. Argentina (Buenos Aires, Carhué).

Rhea americana Rothschildi, Dabbene. EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 81-83.

Distribución. — Sur del Brasil, E. de Bolivia, Argentina (desde Los Andes al Atlántico, y desde las provincias del Norte al Río Negro).

2. PTEROCNEMIA Gray, 1871

- * 2. **Pterocnemia tarapacensis garleppi** Chubb Avestruz petizo de la Cordillera.

Pterocnemia tarapacensis garleppi Chubb, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 33, 1913, p. 79.
Bolivia (Esperanza, 4.000 mts.).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 81-83.

Distribución. — Altiplanicie de Bolivia, Argentina (N O. Salta, Jujuy).

- * 3. **Pterocnemia pennata** (d'Orbigny) Malochoique, Avestruz petizo.

Rhea pennata d'Orbigny, Voy. Am. Mérid. Vol. 2, 1834, Itin. p. 67, (Argentina, Patagonia).

(1) Los números con asterisco indican las especies representadas en las colecciones del Museo.

Pterocnemia pennata Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 81-83.

Distribución. — Sur de la República Argentina, desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes.

ORDEN TINAMIFORMES

Familia **Tinamidae** (*Perdices americanas y martinetas*)

3. TINAMUS Latham, 1790

- * 4. **Tinamus solitarius** (Vieillot) Macuco.

Criptura solitaria Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 34, 1819, p. 105. Paraguay.
Tinamus solitarius Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 260.

Distribución. — S. E. del Brasil, Paraguay, Argentina (N. E. Misiones).

4. CRYPTURELLUS Brabourne et Chubb, 1914

- * 5. **Crypturellus obsoletus obsoletus** (Temminck) Perdiz de monte rojiza.

Tinamus obsoletus Temminck, Hist. Nat. Fig. et Gall., Vol. 13, 1815, p. 588. Brasil y Paraguay.

Crypturus obsoletus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires Vol. 18, 1910, p. 185.

Distribución. — Brasil (desde Río de Janeiro a Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (N. E. Misiones).

- * 6. **Crypturellus parvirostris** (Wagler) Perdicita de monte, Inambú caá-huf.

Crypturus parvirostris Wagler, Syst. Av., 1827. Brasil.

Crypturellus parvirostris Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 260.

Distribución. — Brasil (desde el Sur de Amazonas hasta Madeira, y desde Pernambuco a São Paulo), Bolivia, Paraguay y Argentina (Chaco y Misiones).

- * 7. **Crypturellus undulatus undulatus** (Temminck) Perdiz ondulada.

Tinamus undulatus Temminck, Hist. Nat. Fig. et Gall., Vol. 3, 1815, p. 582, 751. Paraguay.

Crypturellus undulatus Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 88, 1934, p. 189.

Distribución. — Este de Bolivia, Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Chaco y Formosa).

- * 8. **Crypturellus tataupa tataupa** (Temminck) Perdiz del monte.

Tinamus tataupa Temminck, Hist. Nat. Fig. et Gall., Vol. 3, 1815, p. 590, 752. Brasil y Paraguay.

Crypturellus Kerberti = *C. tataupa* Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 251.

Crypturellus tataupa Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 88, 1934, p. 189.

Distribución. — N. E. y S. de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy hasta Misiones, N. de Córdoba).

5. RHYNCHOTUS Spix, 1825

- * 9. **Rhynchotus rufescens rufescens** (Temminck) Martineta colorada, Perdiz grande.
Tinamus rufescens Temminck, Hist. Nat. Fig. et Gall. Vol. 3, 1815, p. 552, 747. Paraguay.
Rhynchotus rufescens Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 186.
 Distribución — S. Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones y E. Chaco).
- * 10. **Rhynchotus rufescens pallescens** Kothe Martineta plumiza.
Rhynchotus pallescens Kothe, Journ. f. Orn., Vol. 55, 1907, p. 164. Argentina (Bs. Aires, Tornquist).
Rhynchotus rufescens pallescens Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, 1923, p. 101.
 Distribución. — Argentina (Este, desde el Chaco hasta La Pampa).
- * 11. **Rhynchotus rufescens maculicollis** Gray Martineta de Bolivia, Guaipo.
Rhynchotus maculicollis G. R. Gray, List Bds. Brit. Mus. Gallinae, 1867, p. 102. Bolivia.
Rhynchotus rufescens maculicollis Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 90, 1934 p. 9.
 Distribución. — S O. Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy y Tucumán).

6. NOTHOPROCTA Sclater et Salvin, 1873

- * 12. **Nothoprocta ornata rostrata** Berlepsch Perdiz del cerro.
Nothoprocta ornata rostrata Berlepsch, Ornith., Vol. 14, 1907, p. 371. Argentina, (Tucumán, Malamala 3.300 mts.).
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 91, 1935, p. 29-30.
 Distribución. — Argentina (Tucumán, Jujuy y Salta).
- * 13. **Nothoprocta cinerascens** (Burmeister) Perdiz montaraz.
Nothura cinerascens Burmeister, Journ. f. Orn., Vol. 8, 1860, p. 259. Argentina (Tucumán).
Nothoprocta cinerascens Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 186.
 Distribución. — Argentina (Centro y Oeste, Córdoba, Sgo. del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza).
- * 14. **Nothoprocta pentlandii pentlandii** (Gray) Perdicitita de la sierra.
Rhynchotus Pentlandii Gray, List. Bds. Brit. Mus., Gallinae, 1867, p. 103. Bolivia, Cordillera.
Nothoprocta pentlandii Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910 p. 186.
 Distribución. — Cordillera de los Andes, Bolivia y Argentina (Salta hasta Neuquén).

7. *NOTHURA* Wagler, 1827

- * 15. **Nothura maculosa boliviana** Salvadori Perdiz chica del Chaco.
Nothura boliviana Salvadori, Cat. Brit. Mus., Vol. 27, 1895, p. 558. Bolivia.
Nothura maculosa boliviana Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 92, 1935, p. 45-46.
 Distribución. — Sur de Bolivia, S. O. de Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Chaco y Formosa).
- * 16. **Nothura maculosa maculosa** (Temminck) Perdiz chica del Brasil.
Tinamus maculosus Temminck, Hist. Nat. Pig. et Gall., Vol. 3, 1815, p. 557. Paraguay.
Nothura maculosa Dabbene, An. Mus. Nac. His. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 187.
 Distribución. — Brasil (SE. São Paulo) SE. Paraguay, Argentina (Misiones).
- * 17. **Nothura maculosa nigroguttata** Salvadori Perdiz chica común.
Nothura nigroguttata Salvadori, Cat. Bds. Brit. Mus., Vol. 27, 1895, p. 558. Argentina (Río Negro).
Nothura maculosa nigroguttata Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 92, 1935, p. 45-46.
 Distribución. — Argentina (S. Chaco, Córdoba, Santa Fe, Corrientes hasta Río Negro).
- * 18. **Nothura darwinii darwinii** Gray Perdiz chica de Patagonia.
Nothura Darwinii Gray, List. Bds. Brit. Mus., Gallinae, 1867, p. 104. Argentina (Bahía Blanca).
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 92, 1935, p. 46.
 Distribución. — Argentina (S. Buenos Aires hasta Chubut).
- * 19. **Nothura darwinii mendozensis** Chubb Perdiz chica de Mendoza.
Nothura darwinii mendozensis Chubb, Bull. B. O. Club, Vol. 38, 1917, p. 31. Argentina (Mendoza).
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 92, 1935, p. 46.
 Distribución. — Argentina (N. Neuquén, Mendoza, S. San Juan).
- * 20. **Nothura salvadorii** Hartert Perdiz chica de Salta.
Nothura salvadorii Hartert, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 266. Argentina (Salta, Arenales).
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 92, 1935, p. 46.
 Distribución. — Argentina (Salta, Tucumán, y S. Jujuy).

8. *EUDROMIA* Geoffroy, 1832

- * 21. **Eudromia formosa formosa** (Lillo) Martineta grande de Tucumán.
Calopezus formosus Lillo, Rev. de Letr. y Sci. Soc. Tucumán 1905, p. 39. Argentina (Tucumán entre las Cejas e Isca Iacu).
Eudromia formosa formosa Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 94, 1935, p. 96.
 Distribución. — Argentina (Tucumán y N. O. Sgo. del Estero).

- * 22. **Eudromia formosa intermedia** (Dabbene et Lillo) Martineta copetona de Tucumán.
Calopezus elegans intermedius Dabbene et Lillo, An. Mus. Nac. His. Nat. Bs. Aires, Vol. 24, 1913, p. 192, pl. 12. Argentina (Tucumán, Valle de Colalao).
Eudromia formosa intermedius Dabbene, Rev. Diosa Cazadora N° 94, 1935, p. 95.
 Distribución. — Argentina (O. Tucumán, La Rioja, y S.O. Catamarca).
- * 23. **Eudromia elegans elegans** d'Orbigny et Geoffroy Martineta de Río Negro.
Eudromia elegans d'Orbigny et Geoffroy, Mag. Zool. 1832, cl. 2, pl. 1 y texto. Argentina (Río Negro).
Eudromia elegans elegans Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 94, 1935, p. 95.
 Distribución. — Uruguay, Argentina (Buenos Aires hasta el O., llegando a los límites de San Juan y Mendoza).
- * 24. **Eudromia elegans albida** (Wetmore) Martineta de San Juan.
Calopezus elegans albidus Wetmore, Journ. Wash. Acad. Sci., Vol. 11, 1921, p. 437. Argentina (San Juan).
Eudromia elegans albida Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 94, 1935, p. 95.
 Distribución. — Argentina (San Juan).
- * 25. **Eudromia elegans morenoi** (Chubb) Martineta de Neuquén.
Calopezus elegans morenoi Chubb, Bull. Brit. Orn. Cl. Vol. 38, 1917, p. 31. Argentina, (Neuquén).
Eudromia elegans morenoi Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 94, 1935, p. 95.
 Distribución. — Argentina (Mendoza, San Luis, La Pampa hasta S. Río Negro).

9. TINAMOTIS Vigors, 1836

26. **Tinamotis pentlandi** Vigors Queico, Keu.
Tinamotis pentlandi Vigors, Proc. Zool. Soc. London, 1836, p. 79. Perú (Cordillera de Los Andes).
 Dabbene, An. Mus. His. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 188.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, Chile (Tacna a Antofagasta), Argentina (NO. Salta, Jujuy hasta San Juan).
- * 27. **Tinamotis ingoufi** Oustalet Perdiz de Santa Cruz.
Tinamotis Ingoufi Oustalet, Ann. Sci. Nat. Zool. Vol. 9, 1890, p. 18. Argentina (Santa Cruz).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 188.
 Distribución. — Argentina (Santa Cruz, O. Río Negro).

SUPERORDEN IMPENNES

ORDEN SPHENISCIFORMES

Familia Spheniscidae (*Pingüines*)

10. APTENODYTES Miller, 1778

- * 28. **Aptenodytes patagonica patagonica** Miller Pingüín rey.
Aptenodytes patagonica Miller, Icon. Anim., 1778, pl. 23. Continente antártico.
Aptenodytes patagonica patagonica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 7.
 Distribución. — SE. del Estrecho de Magallanes, Islas Malvinas y Georgia del Sur.
- * 29. **Aptenodytes forsteri** Gray Pingüín emperador.
Aptenodytes forsteri Gray, Ann. y Mag. Nat. Hist., Vol. 13, 1844. p. 315. Continente Antártico, Lat. 64º77 S.
Aptenodytes forsteri Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 7.
 Distribución. — Región cincumpolar del continente antártico, hasta los 77º de Lat. S., Orcadas del Sur.

11. PYGOSCELIS Wagler, 1832

- * 30. **Pygoscelis papua papua** (Forster) Pingüín de pico rojo.
Aptenodytes papua Forster, Comment. Götting, Vol. 3, 1781, p. 140, pl. 3. Argentina (Islas Malvinas).
Pygoscelis papua papua Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 8.
 Distribución. — Islas Malvinas, Georgia, Orcadas del Sud, e Islas próximas al continente antártico, directamente al sur de Sud América.
- * 31. **Pygoscelis adeliae** (Hombron et Jacquinot) Pingüín de Adelia.
Catarrhactes adeliae Hombron et Jacquinot, Ann. Sci. Nat. Zoöl., Vol. 16, 1841, p. 320. Tierra de Adelia.
Pygoscelis adeliae Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 8.
 Distribución. — Continente antártico, hasta los 77º de Lat. S., Orcadas y Shetland del Sur.
- * 32. **Pygoscelis antarctica** (Forster) Pingüín de barbijo.
Aptenodytes antarctica Forster, Comment. Götting., Vol. 3, 1781, p. 141, pl. 4. Islas Shetlands del Sur.
Pygoscelis antarctica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 8.
 Distribución. — Regiones antárticas y sud antárticas al SE. del continente Americano, Islas Malvinas, e Islas Orcadas, Shetland, y Georgia del Sud.

12. EUDYPTES Vieillot, 1816

- * 33. **Eudyptes crestatus crestatus** (Miller) Pingüín de penacho amarillo.
Aptenodytes crestata Miller, Icon. An. 1784, pl. 49. Argentina (Islas Malvinas).
Eudyptes chrysocome nigrivestis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920 p. 8.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas, Tierra del Fuego y costa de Patagonia hasta B. Aires), Islas de Gough, Tristán da Cunha.

* 34. **Eudyptes chrysolophus** (Brandt) Pingüín de frente amarilla.

Catarrhactes chrysolophus Brandt, Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb., Vol. 2, 1837, p. 315. Argentina (Islas Malvinas).

Eudyptes chrysolophus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 8.

Distribución. — Islas Malvinas; Orcadas, Shetland y Georgia del Sur. Océano Atlántico Austral; Islas Kerguelén, Príncipe Eduardo Marion y Heard, Océano Indico.

13. SPHENISCUS Brisson, 1760

* 35. **Spheniscus humboldti** Meyen Pingüín de Humboldt.

Spheniscus Humboldti Meyen, Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol., Vol. 16, 1834, p. 110, pl. 21. Perú.

Dabbene, EL HORNERO, Vol., 2. N.º 1, 1920, p. 9.

Distribución. — Costa O. de Sud América desde el Perú, hasta Tierra del Fuego.

* 36. **Spheniscus magellanicus** (Forster) Pingüín de Magallanes.

Aptenodytes magellanicus Forster, Comment. Götting., Vol. 3, 1781, p. 143, pl. 5. Estrecho de Magallanes.

Spheniscus magellanicus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N.º 1, 1920, p. 8.

Distribución. — Costa S. de América del Sur desde Chile (Talcahuano hasta el Archipiélago de Magallanes), bordeando la costa E. (Patagonia) hasta el Brasil (Río Grande do Sul), Islas Malvinas.

SUPERORDEN NEOGNATHAE

ORDEN COLYMBIFORMES

Familia **Colymbidae** (*Macáes y zambullidores*)

14. COLYMBUS Linné, 1758

37. **Colymbus rolland rolland** (Quoy et Gaimard) Macacito de las Malvinas.

Podiceps Rolland Quoy et Gaimard, Voy. «Uranie» 1824, p. 133, pl. 36. Argentina (Islas Malvinas).

Podiceps Rollandi Dabbene, An. Mus. Nac. His. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 199.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

* 38. **Colymbus rolland chilensis** (Lesson) Macá común.

Podiceps chilensis (Garnot M. S.) Lesson, Man. d' Orn., Vol. 2, 1828, p. 358. Chile (Concepción).

Podiceps americanus Dabbene, An. Mus. Nac. His. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 199.

Distribución. — S. Perú, Bolivia, Chile (Valparaíso al Estrecho de Magallanes), Uruguay, Argentina (En todo el territorio excepto el N. E.).

- * 39. **Colymbus occipitalis occipitalis** (Garnot) Macá plateado del Sur.
Podiceps occipitalis Garnot, Ann. Sci. Nat., Vol. 7, 1826, p. 50. Argentina (Islas Malvinas).
Podiceps calipareus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 199.
 Distribución. — Chile (Atacama al Estrecho de Magallanes), Uruguay y Argentina (Islas Malvinas, Tierra del Fuego, hasta Santa Fe y Tucumán).
- * 40. **Colymbus occipitalis juninensis** (Berlepsch et Stolzmann) Macá plateado del Norte.
Podiceps callipareus juninensis Berlepsch et Stolzmann, Ibis, 1894, p. 112. Perú (Lago Junín).
Colymbus occipitalis juninensis A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, N° 1, 1935, p. 105.
 Distribución. — Perú, Bolivia, Chile (Antofagasta y Tarapacá), Argentina (Salta y Jujuy).
- * 41. **Colymbus dominicus brachyrhynchus** Chapman Macá mediano.
Colymbus dominicus brachyrhynchus Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. His., Vol. 12, Dec. 23, 1899, p. 255. Brasil (Matto Grosso, Chapada).
Podiceps dominicus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 199. *P. d. brachyrhynchus*, Ibid. p. 410.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Chapada), Paraguay, Uruguay, Argentina, (Misiones, Santa Fe, Buenos Aires hasta Tierra del Fuego).

15. AECMOPHORUS Coues, 1862

- * 42. **Aechmophorus major** (Boddaert) Macá grande.
Colymbus major Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 24. «Cayenne» (error).
Aechmophorus major Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 200.
 Distribución. — N. Perú, Brasil (Amazonas, y Bahía hasta Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (Coquimbo al Estrecho de Magallanes), Argentina (en todo el territorio excepto el relieve ardino).

16. PODILYMBUS Lesson, 1831

- * 43. **Podilymbus podiceps antarcticus** (Lesson) Macacito.
Podiceps antarcticus Lesson, Rev. Zool. 1842, p. 209. Chile (Valparaíso).
Podilymbus podiceps Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 200.
 Distribución. — Sud América, Colombia, Brasil hasta el Uruguay y Chile (Coquimbo hasta Llanquihué), Argentina (Córdoba, Tucumán hasta Tierra del Fuego).

ORDEN PROCELLARIIFORMES

Familia Diomedidae (Albatros)

17. DIOMEDEA Linné, 1758

- * 44. **Diomedea exulans exulans** Linné Albatros, Carnero del Cabo.

Diomedea exulans Linné, Syst. Nat. 10 th. ed. Vol. 1, 1758, p. 132. (Cabo de Buena Esperanza).

Diomedea exulans exulans Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 333.

Distribución. — Entre la Lat. 65° S. y el trópico de Capricornio, Océano Antártico.

Localidad de reproducción. Islas de Tristán da Cunha y Gough, Océano Atlántico Austral.

Subgénero RHOTHONIA Murphy, 1917

- * 45. **Diomedea epomophora longirostris** Mathews Albatros real.

Diomedea epomophora longirostris Mathews, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 54, p. 112, 1934. Océano Atlántico Austral.

Diomedea epomophora Subesp. (?) Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 340.

Distribución. — Este de Sud América, desde el Trópico de Capricornio al Cabo de Hornos.

Localidad de reproducción. — Desconocida.

18. THALASSARCHE Reichenbach, 1852

- * 46. **Thalassarche melanophris melanophris** (Temminck) Albatros menor común.

Diomedea melanophris Temminck et Laugier, Planch. Color. d' Ois. 76^e. livr. (Vol. 4) Pl. 456, 1828. Cabo de Buena Esperanza.

Thalassarche melanophris Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 330.

Distribución. — Del Trópico de Capricornio hasta los 63° Lat. S.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas, Georgia del sur, Océano Atlántico Austral; Isla Kerguelén (Océano Indico).

19. THALASSOGERON Ridgway, 1884

- * 47. **Thalassogeron chrysostoma chrysostoma** (Forster) Albatros de cabeza gris.

Diomedea chrysostoma Forster, Mém. Math. Phys. (Paris), Vol. 10. pl. 14, 1785. p. 571. Cabo Seas.

Thalassogeron chrysostoma chrysostoma Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 326.

Distribución. — En general entre 40° y 60° de lat. S., Océano Indico y Atlántico Austral desde el O. Australia hasta El Cabo.

Localidad de reproducción. — Isla Kerguelén, Océano Indico, Isla Georgia del Sur, Cabo de Hornos, Océano Atlántico Austral.

20. NEALBATRUS Mathews, 1912

- * 48. **Nealbatrus chlororhynchus chlororhynchus** (Gmelin) Albatros de pico amarillo y negro.

Diomedea chlororhynchus Gmelin; Syst. Nat. Vol. 1, pt. 2, p. 568, 1789. Cabo Seas.
Thalassogeron chlororhynchus chlororhynchus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 327.

Distribución. — Océano Antártico, Indico y Atlántico Austral, accidentalmente al O. de Australia.

Localidad de reproducción. — Isla Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

21. DIOMEDELLA Mathews, 1912

- * 49. **Diomedella cauta atlantica** Mathews Albatros del Plata

Diomedella cauta atlantica Mathews, Bull. Brit. Orn. Club. Vol. 53, p. 213, 1933. Océano Atlántico austral, Lat. 35° 44' S.; Long. 53° O. (Lat. Buenos Aires). Argentina.

Distribución. — Océano Atlántico Austral, Costa Sudamericana, desde Uruguay hasta Cabo de Hornos.

Localidad de reproducción. — Desconocida.

22. PHOEBETRIA Reichenbach, 1853

- * 50. **Phoebetria palpebrata murphyi** Mathews et Iredale Albatros de dorso y vientre gris.

Phoebetria palpebrata murphyi Mathews et Iredale, Man. Bds. Austr., p. 50, 1921, en texto (Georgia del Sur) nuevo nombre por *antarctica* Mathews, 1912.

Phoebetria palpebrata Murphyi Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 321.

Distribución. — Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Isla Georgia del sur, Océano Atlántico Austral.

51. **Phoebetria (palpebrata) fusca** (Hilsenberg) Albatros obscuro.

Diomedea fusca Hilsenberg, in Friep's Notizen, Vol. 3, N° 5, (49), p. 74, 1822. Canal de Mozambique.

Phoebetria fusca fusca Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 320.

Distribución. — Océano Atlántico austral y O. del Océano Indico, en las regiones templadas.

Localidad de reproducción. — Isla de Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

Super familia **Procellarioidea**

Familia **Procellariidae** (*Petrelas*)

Sub-familia **Fulmarinae**

23. MACRONECTES Richmond, 1905

- * 52. **Macronectes giganteus giganteus** (Gmelin) Petrel gigante, Quebranta huesos.

Procellaria gigantea Gmelin, Syst. Nat. Vol., 1 pt. 2, 1789, p. 563. Argentina (Isla de los Estados).

Macronectes giganteus giganteus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 138.

Distribución. — En general, Región S. de los tres océanos, desde el trópico de Capricornio hasta el continente antártico, Australia, lejos de la costa.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas, Shetland y Georgia del Sur, Tristán da Cunha, y Gough, Océano Atlántico austral. Islas Kerguelén y Crozet, Océano Indico.

24. DAPTION Stephens, 1826

* 53. **Daption capensis capensis** (Linné) Petrel común, Damero del Cabo.

Procellaria capensis Linneo, Syst. Nat., ed. 10, p. 132, 1785. Cabo de Buena Esperanza.

Daption capensis capensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 147.

Distribución. — Abarca a todas las regiones antárticas y subantárticas de los océanos del hemisferio austral excepto el S. Australia y Nueva Zelandia.

Localidad de reproducción. — Islas Kerguelen y Heard, Océano Indico; Reina María, Adelia y Rey Jorge V, Antártica.

25. PRIOCELLA Hombron et Jacquinot, 1844

* 54. **Priocella antarctica** (Stephens) Petrel gris plateado.

Fulmarus antarcticus Stephens in Shaw's, Gen. Zool., Vol. 13, pt. 1, 1826, p. 236. Cabo Seas.

Priocella antarctica antarctica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 142.

Distribución. — Todos los océanos del hemisferio austral, costeano el Continente Antártico.

Localidad de reproducción. — Islas Reina María, Adelia y Shetland del Sur.

26. THALASSOICA Reichenbach, 1853

55. **Thalassoica antarctica** (Gmelin) Petrel antártico, Damero obscuro.

Procellaria antarctica Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, p. 565, 1789. Dentro del círculo polar antártico.

Thalassoica antarctica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 145.

Distribución. — Regiones Antárticas, habiendo sido señalado en el cuadrante australiano hasta los 78° de Lat. S.

Localidad de reproducción. — Isla Reina María, Adelia y Shetland del Sur.

Sub-familia **Bulweriinae**

27. PAGODROMA Bonaparte, 1856

* 56. **Pagodroma nivea** (Forster) Petrel de las nieves.

Procellaria nivea Forster, Voy. Round World, Vol. 1, pp. 96-98, 1777. Círculo Antártico; aut. Math., Birds Austr., Vol. 2, 1912, p. 175.

Pagodroma nivea novaegeorgica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 13.

Distribución. — Del polo sur hasta Victoria en Australia, Océanos Pacífico y Atlántico.

Localidad de reproducción. — Islas Reina María, Victoria y Georgia del Sur.

28. PTERODROMA Bonaparte, 1856

57. **Pterodroma macroptera macroptera** (Smith) Petrel de pico corto.
Procellaria macroptera Smith, Illustr. Zool. South Africa, p. 2, pl. 52, 1840. Cabo Seas.
Pterodroma macroptera macroptera Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 20.
 Distribución. — Región oriental del Atlántico austral, Océano Indico y los mares de Australia y Nueva Zelandia. Atlántico Oriental desde Sud América a Sud Africa.
 Localidad de reproducción. — Tristán da Cunha, Isla de Crozet y Kerguelén.
- * 58. **Pterodroma lessonii lessonii** (Garnot) Petrel de cabeza blanca.
Procellaria lessonii Garnot, Ann. Sci. Nat. Paris, Vol. 7, p. 54, 1826. Argentina (Islas Malvinas).
Pterodroma Lessoni Lessoni Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 16.
 Distribución. — Océano Atlántico austral, Océano Indico.
 Localidad de reproducción. — Argentina (Islas Malvinas), Océano Atlántico, Islas Kerguelén, Océano Indico.
- * 59. **Pterodroma incerta** (Schlegel) Petrel obscuro y blanco.
Procellaria incerta Schlegel, Mus. Pays-Bas. Vol. 6, Procell. 1863, p. 9. Cabo de Buena Esperanza.
Pterodroma incerta Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 18.
 Distribución. — Océano Atlántico Austral, en particular en las regiones templadas; Océano Indico Sur.
 Localidad de reproducción. — Isla Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.
60. **Pterodroma brevisrostris** (Lesson) γ Petrel apizarrado obscuro.
Procellaria brevisrostris Lesson, Traité d'Orn., livr. 8 p. 611, 1833. Isla Kerguelén.
Pterodroma brevisrostris Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 19.
 Distribución. — Océano Atlántico e Indico Austral, desde el O. de Australia a Sud América.
 Localidad de reproducción. — Kerguelén. Océano Indico.
61. **Pterodroma mollis mollis** (Gould) Petrel de plumaje blando.
Procellaria mollis Gould, Ann. & Mag. Nat. Hist. Vol. 13, p. 363, 1844. Océano Atlántico Austral.
Pterodroma mollis mollis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, 1923, p. 16.
 Distribución. — Océano Atlántico e Indico Austral hasta el O. de Australia.
 Localidad de reproducción. — Islas de Tristán da Cunha y Gough, Océano Atlántico, Islas de Nueva Amsterdam y St. Paul, S. Océano Indico.
62. **Pterodroma externa tristani** Mathews Petrel de Tristán da Cunha.
Pterodroma externa tristani Mathews, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 52, p. 631, 1931.
 Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.
 Distribución. — Isla Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.
 Localidad de reproducción. — Isla Tristán da Cunha (?), Océano Atlántico Austral.

Sub Familia **Pachyptilinae**

29. HALOBAENA Bonaparte, 1856

63. **Halobaena caerulea** (Gmelin) . Petrel azulado.

Procellaria caerulea Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, p. 560, 1789. Southern Ocean, 47° a 48° S.

Halobaena caerulea Murphyi Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, p. 126, 1923.

Distribución. — En general entre los 40° y 60° S.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas y Georgia, del Sur, Océano Atlántico Austral y Kerguelén en el Océano Indico.

30. PACHYPTILA Illiger, 1811

64. **Pachyptila vittata keyteli** (Mathews) Petrel azul de pico ancho.

Prion vittatus keyteli Mathews, Birds Austr., Vol. 2, pt. 2, p. 210, 1912. Tristan da Cunha, Océano Atlántico Austral.

Pachyptila vittata Keyteli Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, p. 133, 1933.

Distribución. — Islas de Tristán da Cunha y Gough, Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Islas de Tristán da Cunha y Gough, Océano Atlántico Austral.

31. ATTAPRION Mathews, 1933

* 65. **Attaprion desolatus banksi** (Smith) Petrel paloma.

Pachyptila banksi Smith, Illustr. Zool. Sud Africa, Aves, pt. 11, p. 155, 1840. Cabo Seas.

Heteroprion desolatus Banksi Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, p. 136, 1923.

Distribución. — Atlántico Austral desde 0° a 20° de Long. E. y 55° de lat. S.

Localidad de reproducción. — Isla Bouvet (?).

66. **Attaprion desolatus georgia** (Mathews) Petrel de Georgia del Sur.

Heteroprion desolatus georgia Mathews, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 52, p. 147, 1932. Georgia del Sur.

Distribución. — Océano Atlántico, desde la Isla Georgia y Shetland del Sur hasta los 40° S.

Localidad de reproducción. — Isla Georgia del Sur, Océano Atlántico Austral.

32. HETEROPRION Mathews, 1912.

67. **Heteroprion belcheri** Mathews Petrel azul de pico delgado.

Heteroprion belcheri Mathews, Birds Austr., Vol. 2, pl. 2 p. 224, 1912. Geelong, Victoria, Australia.

Heteroprion belcheri Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, p. 135, 1923.

Distribución. — Australia y Nueva Zelandia, Océano Atlántico Austral, Islas Malvinas y desde Tierra del Fuego hasta Montevideo.

Localidad de reproducción. — Archipiélago Australiano (?), Islas Malvinas. Océano Atlántico Austral.

Sub Familia **Procellariinae**33. **PROCELLARIA** Linné, 1758

- * 68. **Procellaria aequinoctialis aequinoctialis** Linné Petrel de barba blanca.

Procellaria aequinoctialis Linné, Syst. Nat., 10 th. ed. p. 132, 1758. Cabo Seas.

Procellaria aequinoctialis aequinoctialis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3. N° 1, p. 5. 1923.

Distribución. — Océano Atlántico, desde el Trópico de Capricornio hasta el Continente Antártico y accidentalmente por la costa Sur del Brasil, Angola y Mozambique, en Africa.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas y Georgia del Sur, Océano Atlántico Austral. Kerguelén. Océano Indico.

34. **ADAMASTOR** Bonaparte, 1856

69. **Adamastor cinerea** (Gmelin) Petrel gris.

Procellaria cinerea Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2. p. 563, 1789. (intra circulum antarcticum).

Priofinus cinereus cinereus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, p. 7. 1923.

Distribución. — Océano Antártico.

Localidad de reproducción. — Islas de Nueva Zelandia (?), Kerguelén, Tristán da Cunha (?).

35. **ARDENNA** Reichenbach, 1852

- * 70. **Ardenna gravis** (O' Reilly) Petrel pardo.

Procellaria gravis O' Reilly, Voyage Greenland. Adj. Seas, p. 140 pl. 12, f. 1, 1818. Cabo Farewell y Staten Hook to Newfoundland.

Ardenna gravis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, p. 12, 1923.

Distribución. — Océano Atlántico, entre la lat. 60° N. y 50° S.

Localidad de reproducción. — Isla Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.

36. **ALPHAPUFFINUS** Mathews, 1914

- * 71. **Alphapuffinus assimilis elegans** (Giglioli et Salvadori) Petrel azulado de pico largo.

Puffinus elegans Giglioli et Salvadori, Ibis, p. 68, 1869. Océano Atlántico Austral. lat. 43°54' S., Long. 9°20' E.

Puffinus assimilis elegans Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, p. 11, 1923.

Distribución. — Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Islas de Gough y Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.

37. **PARANECTRIS** Iredale, 1930

- * 72. **Paranectris griseus chilensis** (Bonaparte) Petrel obscuro del Sur.

Nectris chilensis Bonaparte, Consp. Gen. Avium, Vol. 2. p. 202, 1857. Chile.

Puffinus griseus chilensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, p. 9, 1923.

Distribución. — O. de la Costa Sud Americana, desde Chile hasta las Islas Kurile.

Localidad de reproducción. — Isla Wollaston, Chile, 15 millas al Norte del Cabo de Hornos.

- * 73. **Paranectris griseus stricklandi** (Ridgway) Petrel obscuro del Norte.

Puffinus stricklandi Ridgway, in Baird, Brewer and Ridgway, Mem. Mus. Comp. Zool. Vol. 13, p. 390, 1884. Océano Atlántico Norte.

Puffinus griseus chilensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 1, p. 9, 1923.

Distribución. — Costas del Océano Atlántico Austral hasta Inglaterra, recorriendo por Fernando Po hasta Angola.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas, Océano Atlántico Austral.

Familia **Thalassidromidae** (*Petreles o Golondrinas de las tormentas*)

Sub-Familia **Oceanitinae**

38. OCEANITES Keys et Blasius, 1840

- * 74. **Oceanites oceanicus oceanicus** (Kuhl) Petrel de las tormentas.

Procellaria oceanica Kuhl, Beitr. Zool. vergl. Anat. Zweite Abt. p. 136, 1820. Océano Atlántico Austral.

Oceanites oceanicus oceanicus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 3, p. 243, 1922.

Distribución. — Océano Atlántico desde Inglaterra hasta Canadá, emigrando hasta las regiones Australes.

Localidad de reproducción. — Islas Georgia y Shetland del Sur.

39. PELAGODROMA Reichenbach, 1852

- * 75. **Pelagodroma marina marina** (Latham) Petrel de las tormentas cara blanca.

Procellaria marina Latham, Index Ornith., Vol. 2, p. 826, 1790. Océano Atlántico Austral.

Pelagodroma marina marina Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 246, 1922.

Distribución. — Océano Atlántico Austral por debajo del Trópico de Capricornio.

Localidad de reproducción. — Isla de Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

40. GARRODIA Forbes, 1881

76. **Garrodia nereis chubbi** (Mathews) Petrel de las tormentas lomo gris.

Oceanites nereis chubbi Mathews, Birds Austr. Vol. 2, pt. 1, p. 18, 1912. Argentina (Islas Malvinas).

Garrodia nereis Chubbi Dabbene, EL HORNERO, Vol 2, N° 3, p. 245, 1922.

Distribución. — Océano Atlántico hacia las costas Sud Americanas.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas y Georgia del Sur. Océano Atlántico Austral.

41. FREGETTA Bonaparte, 1855

77. **Fregetta tropica melanogaster** (Gould) Petrel de las tormentas flancos blancos.

Thalassidroma melanogaster Gould, Ann. & Mag. Nat. Hist., Vol. 13, p. 367, 1844. Océano Indico Austral.

Fregetta tropica (?) *melanogaster* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2. N° 3, p. 247, 1922.

Distribución. — Océano Indico Austral hasta el O. Australia y Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Isla Kerguelén, Océano Indico, Islas Malvinas, Georgia y Orkneys Sur, Océano Atlántico Austral.

* 78. ***Fregetta leucogaster leucogaster*** (Gould) Petrel de las tormentas pecho blanco.

Thalassidroma leucogaster Gould, Ann. & Mag. Nat. Hist., Vol. 13, p. 367. Lat. 36° S. Long. 6°47' E.

Fregetta leucogaster Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 3, p. 248, 1922.

Distribución. — Océanos Atlántico, Indico y Pacífico, por debajo de los 37° S.

Localidad de reproducción. — Desconocida.

42. FREGETTORNIS Mathews, 1912

79. ***Fregettornis grallaria tristanensis*** Mathews Pequeño petrel de Tristán da Cunha.

Fregettornis grallaria tristanensis Mathews, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 52, p. 123, 1932. Isla de Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

Fregetta leucogaster Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 3, p. 248, 1922.

Distribución. — Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

80. ***Fregettornis melanoleuca*** (Salvadori) Pequeño petrel blanco y negro.

Fregetta melanoleuca Salvadori, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 21, p. 79, 1908. Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

Fregetta leucogaster Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 3, p. 248, 1922.

Distribución. — Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Tristán da Cunha (?) Océano Atlántico Austral.

Familia **Pelecanoideidae** (*Petrelas zambullidores*)

43. PELECANOIDES Lacépède, 1799

* 81. ***Pelecanoides urinatrix berard*** (Gaimard) Petrel zambullidor de las Malvinas.

Procellaria Berard Gaimard, Bull. Gén. et Univ. Ann. et Nouv. Sci., Vol. 3, N° 7. p. 53, 1923. Argentina (Islas Malvinas), Océano Atlántico Austral.

Pelecanoides urinatrix berard Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 236, 1924. Océano Atlántico Austral.

Distribución. — Islas Malvinas y E. de la Costa Sud Americana, hasta Bahía Blanca.

Localidad de reproducción. — Islas Malvinas, Océano Atlántico Austral.

82. ***Pelecanoides urinatrix dacunhae*** Nicoll Petrel zambullidor de Tristán da Cunha.

Pelecanoides dacunhae Nicoll, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 16, p. 103, 1906, 10 th. Tristán da Cunha. Océano Atlántico Austral.

Pelecanoides urinatrix dacunhae Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 337, 1924.

Distribución. — Islas de Tristán da Cunha y Gough. Océano Atlántico Austral.

Localidad de reproducción. — Tristán da Cunha, Océano Atlántico Austral.

83. **Pelecanoides urinatrix coppingeri** Mathews Petrel zambullidor de Magallanes.

Pelecanoides urinatrix coppingeri Mathews, Birds Austr., Vol. 25, pt. 3, 1912, p. 238.
Estrecho de Magallanes.

Pelecanoides (Porthmornis) magellani Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 231, 1924.

Distribución. — Costa de Chile, y Estrecho de Magallanes.
Localidad de reproducción. — Canal de Trinidad (?). Chile.

44. PORTHMORNIS Murphy et Harper, 1921

84. **Porthmornis magellani** (Mathews) Petrel zambullidor.

Puffinuria garnotii magellani Mathews, Birds, Austr. Vol. 2, pt. 3, p. 239, 1912. Estrecho de Magallanes.

Pelecanoides (Porthmornis) magellani Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 231, 1924.

Distribución. — Costa Sur de Sud América, Chile y Patagonia, Cabo de Hornos.
Localidad de reproducción. — Archipiélago de Cabo de Hornos, Hermite.

45. PELAGODYPTES Murphy et Harper, 1921

* 85. **Pelagodyptes georgicus** (Murphy et Harper) Petrel zambullidor de Georgia del sur.

Pelecanoides georgica Murphy et Harper, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. 35, art. 7, 1916, p. 66. Cumberland Bay, Georgia del Sur.

Pelecanoides (Pelagodyptes) georgicus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 3, p. 234, 1924.

Distribución. — Georgia del Sur, Islas Macquarie Australia (?).
Localidad de reproducción. — Georgia del Sur, Océano Atlántico Austral.

ORDEN PELECANIFORMES

SUBORDEN PELECANI

Superfamilia Suloidea

Familia **Phalacrocoracidae** (*Cormoranes o viguaes*)

46. PHALACROCORAX Brisson, 1760

* 86. **Phalacrocorax olivaceus olivaceus** (Humboldt) Vigüá común.

Pelecanus olivaceus Humboldt, in Humboldt et Bonpland «Rec. d' Observ. Zool. et d' Anat. Comp.» 1805, p. 6. Colombia (Bancos del río Magdalena, Lat. 8° 55' N.).

Phalacrocorax vigua Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 236.

Distribución. — Colombia, Brasil, hasta el Cabo de Hornos, Argentina (Jujuy, Salta, Misiones, hasta Tierra del Fuego).

* 87. **Phalacrocorax magellanicus** (Gmelin) Vigüá de cabeza y cuello negro.

Pelecanus magellanicus Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 576. basado en «Shag Magellanic» Latham, Gen. Syn. Birds, Vol. 3, (2), p. 604. Argentina (Tierra del Fuego e Islas de los Estados).

Phalacrocorax magellanicus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 236.

Distribución. — Chile (Valdivia al Estrecho de Magallanes), Argentina (Costa de Santa Cruz hasta Tierra del Fuego e Islas de los Estados), accidentalmente en la costa de Bs. Aires.

* 88. *Phalacrocorax gaimardi* (Lesson et Garnot) Vigüá de patas rojas.

Carbo gaimardi Lesson et Garnot, Voy. Coquille, Zool., Atlas, livr. 7, pl. 48, 1828. Perú (Isla Lorenzo, alejado del P. Callao).

Phalacrocorax Gaimardi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 236.

Distribución. — Costa de América del Sur, desde el N. Perú hasta Tierra del Fuego, Argentina (Costa de la Patagonia, desde el P. Deseado hasta Tierra del Fuego).

* 89. *Phalacrocorax atriceps atriceps* King Vigüá de Magallanes.

Phalacrocorax atriceps King, Zool. Jour., Vol. 4, p. 102, 1828. Estrecho de Magallanes. Dabbene, An. Mus. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 236.

Distribución. — Chile (Valdivia al Estrecho de Magallanes), Argentina (Tierra del Fuego, Islas de los Estados, S. Santa Cruz).

* 90. *Phalacrocorax albiventer albiventer* (Lesson) Vigüá blanco común.

Carbo albiventer Lesson, Traité d' Orn., livr. 8, 1831, p. 604. Argentina (Islas Malvinas).

Phalacrocorax albiventer Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 237.

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas, Tierra del Fuego hasta las costas de Buenos Aires y Delta del Paraná).

91. *Phalacrocorax (albiventer) georgicus* Lönnberg Vigüá de Georgia.

Phalacrocorax atriceps georgicus Lönnberg, Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl., Vol. 40, N° 5, 1906, p. 69. Georgia del Sur.

Phalacrocorax atriceps georgicus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1900, p. 237.

Distribución. — Georgia y Orcadas del Sur.

Familia *Anhingidae* (Vigüas de cuello largo)

47. ANHINGA Brisson, 1760

* 92. *Anhinga anhinga* (Linné) Vigüá víbora, Aninga.

Plotus anhinga Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 218. Brasil.

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 237.

Distribución. — Méjico, Cuba, Centro y Sud América hasta el SE. del Brasil. Argentina (Jujuy, Misiones, Chaco hasta Entre Ríos).

Familia **Sulidae** (*Piqueros*)

48. SULA Brisson, 1760

- * 93. **Sula variegata** (Tschudi) Piquero.

Dysporus variegatus Tschudi, Fauna Per. Orn., 1845, p. 313. Islas alejadas de la costa del Perú.

Distribución. — Perú, Chile y Argentina Tierra del Fuego (observ. J. Mogensen).

Superfamilia **Pelecanoidea**Familia **Pelecanidae** (*Pelicanos*)

49. PELECANUS Linné, 1758

- * 94. **Pelecanus thagus** Molina Pelicano.

Pelecanus thagus Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili, 1782. p. 240. Chile.

Pelecanus thagus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 238.

Distribución. — Perú, Chile y Argentina, Tierra del Fuego; Buenos Aires (?).

ORDEN **CICONIIFORMES**SUBORDEN **ARDEAE**Familia **Ardeidae** (*Garzas y mirasoles*)Subfamilia **Ardeidae**

50. ARDEA Linné, 1758

- * 95. **Ardea cocoi** Linné Garza mora.

Ardea cocoi Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 237. Guayana Francesa (Cayena).

Ardea cocoi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 223.

Distribución. — En la mayor parte de Sudamérica, desde las Guayanas hasta la Argentina, (Chubut, ocasionalmente en las Islas Malvinas).

51. BUTORIDES Blyth, 1849

- * 96. **Butorides striatus striatus** (Linné) Garcita azulada.

Ardea striata Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 238. Brasil (Surinam).

Butorides striata Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 164.

Distribución. — SE. del Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina (Salta, Jujuy, Misiones hasta la Pampa).

52. CASMERODIUS Gloger, 1842

- * 97. **Casmerodius albus egretta** (Gmelin) Garza blanca grande.

Ardea egretta Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 629. Guayana Francesa (Cayena).

Casmerodius albus egretta Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 164.

Distribución. — S. de los EE. UU. de Norte América, Méjico, Grandes Antillas, Centro y Sud América hasta la Patagonia.

53. EGRETTA Forster, 1817

- * 98. *Egretta thula thula* (Molina) Garcita blanca.

Ardea thula Molina, Sagg. Stor. Nat. Chile, 1782, p. 237. Chile.

Leucophoyx candidissima Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 224.

Distribución. — S. de los EE. UU. de Norte América, New Jersey, Méjico, Centro y Sud América hasta Chile, Uruguay y Argentina (del N. hasta La Pampa).

54. SYRIGMA Ridgway, 1878

- * 99. *Syrigma sibilatrix* (Temminck) Chiflón.

Ardea sibilatrix Temminck, Planches Col., Livr. 46, 1824, pl. 271. Brasil y Paraguay.

Syrigma cyanocephalum Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 224. *S. sibilatrix*, Ibid. p. 412.

Distribución. — S. Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina (Salta, Misiones hasta Buenos Aires).

55. NYCTICORAX Forster, 1817

- * 100. *Nycticorax nycticorax tayazu-guira* (Vieillot) Bruja, Pájaro bobo.

Ardea tayazu-guira Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, p. 437, 1817. Paraguay.

Nycticorax nycticorax naevius Dabbene, en Pereyra, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 164.

Distribución. — Norte, Centro y Sud América hasta Uruguay, Chile y Argentina (de las Provincias nortenas hasta el N. Chubut).

- * 101. *Nycticorax nycticorax obscurus* Bonaparte Cachi, Pájaro yaguá.

Nycticorax obscurus Bonaparte, Consp. Av., Vol. 2, 1857, p. 141. Chile.

Nycticorax cyanocephalus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 224.

Distribución. — O. de América del Sur, desde el S. de Perú hasta el S. de Chile y Argentina (Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas).

56. TIGRISOMA Swainson, 1828

- * 102. *Tigrisoma lineatum marmoratum* (Vieillot) Hocó, Garza roja.

Ardea marmorata Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14, 1817, p. 415. Paraguay.

Tigrisoma marmoratum Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 225.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso), Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina (Salta, Tucumán, Misiones hasta Buenos Aires).

103. **Tigrisoma lineatum bolivianum** (Lönningberg) Hocó de Bolivia.

Heterocnus bolivianum Lönningberg, Ibis, 1903, p. 462. Bolivia (Tatarenda).

Tigrisoma bolivianum Wetmore, EL HORNERO, Vol. 2, N° 4, 1922, p. 292.

Distribución. — Bolivia, (Tatarenda); Argentina, (Corrientes).

- * 104. **Tigrisoma fasciatum** (Such) Hocó negro.

Ardea fasciata Such, Zoól. Journ., Vol. 2, 1825, p. 117. Brasil.

Tigrisoma fasciatum A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, N° 1, p. 106.

Distribución. — Brasil (S. E); Argentina (Misiones, Bonpland).

Subfamilia **Botaurinae**

57. **IXOBRYCHUS** Billberg, 1828

- * 105. **Ixobrychus involucris** (Vieillot) Garcita, mirasol.

Ardea involucris Vieillot, Tabl. Encyc. Méth., Vol. 3, 1823, p. 1127. Paraguay.

Ixobrychus involucris Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 2, 1918, p. 92.

Distribución. — Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul) Paraguay, Uruguay, Chile (Santiago o Llanquihué), Argentina (del N. hasta Patagonia excepto el relieve Andino).

58. **BOTAURUS** Stephens, 1819

- * 106. **Botaurus pinnatus** (Wagler) Mirasol grande.

Ardea pinnata Wagler, Isis, 1829, col. 662. Brasil (Bahía).

Botaurus pinnatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 225.

Distribución. — América del Sur, desde Colombia y Guayanas hasta Uruguay y Argentina (Tucumán, Córdoba, Buenos Aires).

SUBORDEN **CICONIAE**

Superfamilia **Ciconioidea**

Familia **Ciconiidae** (Cigüeñas)

Subfamilia **Mycteriinae**

59. **MYCTERIA** Linné, 1758

- * 107. **Mycteria americana** Linné Cigüeña de cabeza pelada, Tuyuyú.

Mycteria americana Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 140. América (Brasil).

Tantalus americanus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 225.

Distribución. — Centro y Sud América, hasta el S. Brasil y Argentina (Stgo. del Estero, Chaco, Misiones).

Subfamilia **Ciconiinae**60. **EUXENURA** Ridgway, 1878

- * 108. **Euxenura maguari** (Gmelin) Cigüeña común*

Ardea maguari Gmelin, Syst. Nat., N° 1, 1789, p. 623. Brasil.

Euxenura maguari Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 225.

Distribución. — Sud América, Guayanas, hasta Chile y Argentina (Misiones, Salta hasta Chubut).

61. **JABIRU** Hellmayr, 1906

- * 109. **Jabiru mycteria** (Lichtenstein) Cigüeña de cuello pelado, Juan grande.

Ciconia mycteria Lichtenstein, Abh. K. Akad. Wiss. Berlin, Phys. Kl., 1816-1817 (1819), p. 163. Brasil.

Mycteria mycteria Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 226.

Distribución. — Méjico, Centro y Sud América hasta el Uruguay y Argentina (Tucumán, Córdoba, Chaco, Buenos Aires).

Superfamilia **Threskiornithoidea**Familia **Threskiornithidae** (*Bandurrias, Cuervillos, Espátulas*)Subfamilia **Threskiornithinae**62. **HARPIPRION** Wagler, 1832

- * 110. **Harpiprion caerulescens** (Vieillot) Bandurria mora, Chumuco.

Ibis caerulescens Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., éd. Vol. 16, 1817, p. 18. Paraguay*

Molybdophanes caerulescens Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 226.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso) Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina (Salta, Chaco, Tucumán), ocasionalmente en Bs. Aires.

63. **THERISTICUS** Wagler, 1832

- * 111. **Theristicus caudatus caudatus** (Boddaert) Bandurria de verano.

Scolopax caudatus Boddaert, Tabl. Pl. enlum., 1783, p. 57. Guayana Francesa (Cayena).

Theristicus caudatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 226. Ibid. p. 412.

Distribución. — Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil hasta el Uruguay y Argentina (Salta, Córdoba, Chaco, Buenos Aires).

- * 112. **Theristicus caudatus melanopsis** (Gmelin) Bandurria de invierno.

Tantalus melanopsis Gmelin, Syst. Nat. 1, pt. 2, 1789, p. 653. («In insula Novi Adri»).

Theristicus melanopis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 226.

Distribución. — Chile, Argentina (Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán).

64. MESEMBRINIBIS Peters, 1930

113. *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin) Hablador, Tuyuyú.

Tantalus cayennensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 652. Guayana Francesa (Cayena).

Harpiprion cayennensis Dabbene, Physis, Vol. 1, 1915, p. 532.

Distribución. — Sud América hasta el N. Argentina.

65. PHIMOSUS Wagler, 1832

* 114. *Phimosus infuscatus infuscatus* (Lichtenstein) Cuervo de frente pelada.

Ibis infuscata Lichtenstein, Verz. Doubl., 1823, p. 75. Brasil.

Phimosus nudifrons Azarae Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 163.

Distribución. — Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina (Salta, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires).

66. PLEGADIS Kaup, 1829

* 115. *Plegadis (falcinellus) guarauna* (Linné) Cuervo de cañada.

Scolopax guarauna Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 242. Brasil.

Plegadis guarauna Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 227.

Distribución. — Norte, Centro y Sud América hasta Chile y Argentina (de las provincias nortefías hasta Tierra del Fuego).

116. *Plegadis ridgwayi* (Allen) Cuervo de Bolivia.

Falcinellus Ridgwayi Allen, Bull. Mus. Comp. Zool. Vol. 3, 1876, p. 355. Bolivia (Lago Titicaca).

Plegadis Ridgwayi Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 260.

Distribución. — Bolivia, Perú, NO. Argentina (Salta, Jujuy).

Subfamilia **Plataleinae**

67. AJAJA Reichenbach, 1852

* 117. *Ajaja ajaja* (Linné) Espátula rosada.

Platalea ajaja Linné, Syst. Nat. ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 140. Isla Jamaica, Brasil.

Ajaja ajaja Dabbene, EL HORNERO, Vol. 4, N° 1, 1927, p. 25.

Distribución. — Norte América, Antillas, Centro y Sud América, hasta Chile (Valparaíso, Colchagua, Santiago) y Argentina (Salta, Stgo. del Estero, Misiones, Bs. Aires).

SUBORDEN PHOENICOPTERI

Familia **Phoenicopteridae** (*Flamencos*)

68. PHOENICOPTERUS Linné, 1758

- * 118. **Phoenicopterus ruber chilensis** Molina Flamenco común.

Phoenicopterus chilensis Molina, Sagg. Stor. Nat. Chile, 1782, p. 242. Chile.

Phoenicopterus chilensis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 234.

Distribución. — Perú (Lago Junín), Brasil (Río Grande do Sul), Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile (Antofagasta al Estrecho de Magallanes), Argentina (en todo el territorio).

69. PHOENICOPARRUS Bonaparte, 1856

- * 119. **Phoenicoparrus andinus** (R. A. Philippi) Parina.

Phoenicoparrus andinus R. A. Philippi, An. Univ. Chile, 1854, p. 337. Chile, Atacama.

Phoenicoparrus andinus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 237.

Distribución. — Chile (Tarapacá, Atacama) Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán), ocasionalmente en Buenos Aires ? (observ. Pedro Serié).

- * 120. **Phoenicoparrus jamesi** (Sclater) Flamenco de los Andes.

Phoenicoparrus jamesi Slater, Proc. Zool. Soc. London, 1886, p. 399, pl. 36. Chile (Tarapacá).

Phoenicoparrus jamesi Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 294.

Distribución. — Chile (Tarapacá), Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy).

ORDEN ANSERIFORMES

SUBORDEN ANHIMAE

Familia **Anhimidae** (*Chajá*)

70. CHAUNA Illiger, 1811

- * 121. **Chauna torquata** Oken Chajá.

Chauna torquata Oken, Lehrb. Naturg., Vol. 3, pt. 2, 1816, p. 639. Paraguay y Argentina.

Dabbene, en Pereyra, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 174.

Distribución. — Brasil (S. E., Minas Geraes) Paraguay, Uruguay y Argentina (N. y NE. hasta La Pampa).

SUBORDEN ANSERES

Familia **Anatidae** (*Cisnes, avutardas, gansos, patos*)Subfamilia **Cygninae**71. **CYGNUS** Bechstein, 1803.

- * 122. **Cygnus melancoriphus** (Molina) Cisne de cuello negro.

Anas melancoripha Molina, Sagg. Stor, Nat. Chili, 1782, p. 234. Chile.

Cygnus melanocoriphus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 227.

Distribución. — S. E. Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (de Valparaíso al Estrecho de Magallanes) y Argentina (excepto el N. O.).

Subfamilia **Anserinae**72. **CHLOËPHAGA** Eyton, 1838

- * 123. **Chloëphaga melanopectera** (Eyton) Avutarda de alas negras, Guayata, Piquen.

Anser melanopecterus Eyton, Monogr. Anat., 1838, p. 93. Bolivia (Lago Titicaca).

Chloëphaga melanopectera Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 229.

Distribución. — S. Perú, O. Bolivia, Chile (Tacna, Tarapacá, hasta Curicó), Argentina (N. O. desde Salta hasta Mendoza).

- * 124. **Chloëphaga leucopectera** (Gmelin) Avutarda de Magallanes.

Anas leucopectera Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 505. Argentina (Islas Malvinas).

Chloëphaga leucopectera Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 236-237.

Distribución. — S. Chile, Argentina (S. Buenos Aires y Neuquén, Patagonia hasta el Cabo de Hornos, Islas Malvinas).

- * 125. **Chloëphaga picta** (Gmelin) Avutarda de pecho rayado.

Anas picta Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, (2), 1789, p. 504. Argentina (Isla de los Estados).

Chloëphaga dispar Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 236-237.

Distribución. — S. Chile y Argentina (Patagonia, Tierra del Fuego, Isla de los Estados).

- * 126. **Chloëphaga poliocephala** Selater Avutarda de cabeza gris.

Chloëphaga poliocephala Selater, Proc. Zool. Soc. London, 1857, p. 128 (ex pl. 165 in Gray, Gen. Bds.). Chile (Isla Chiloé).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 229.

Distribución. — S. Chile y Argentina hasta el Cabo de Hornos.

- * 127. **Chloëphaga rubidiceps** Selater Avutarda colorada.

Chloëphaga rubidiceps Selater, Proc. Zool. Soc. London, 1860, p. 387, pl. 173. Argentina (Islas Malvinas).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 229.

Distribución. — SE. de Argentina, (Patagonia, Islas Malvinas).

- * 128. **Chloëphaga hybrida hybrida** (Molina) Avutarda blanca común.

Anas hybrida Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili. 1872, p. 241. Chile (Isla Chiloe).

Chloëphaga hybrida Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 229.

Distribución. — Chile (de los 42° a los 55°32' de lat. S) Argentina (Patagonia).

129. **Chloëphaga hybrida malvinarum** Philippi Avutarda blanca de las Malvinas.

Chloëphaga hybrida malvinarum, Philippi, Auk, Vol. 33, 1916 p. 423. Argentina (Puerto Stephens, Islas Malvinas).

Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).

Subfamilia **Dendrocygninae**

73. DENDROCYGNA Swainson, 1837

- * 130. **Dendrocygna viduata** (Linné) Suiriri.

Anas viduata Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 205. Colombia (Cartagena).

Dendrocygna viduata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 230.

Distribución. — Panamá y Región Tropical de América del Sur, Argentina (de las Provincias Norteñas hasta La Pampa).

- * 131. **Dendrocygna bicolor bicolor** (Vieillot) Pato silbón.

Anas bicolor Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat. Vol. 5, 1816, p. 136. Paraguay.

Dendrocygna bicolor Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 237.

Distribución. — Colombia, hasta Chile y Argentina (Tucumán hasta Bs. Aires); Mejico (California) S. Africa, Madagascar, India y Ceylán.

- * 132. **Dendrocygna autumnalis discolor** Selater et Salvin Pato silbón de vientre negro.

Dendrocygna discolor Selater et Salvin, Nomencl. Av. Neotr., 1873, p. 161. Venezuela y Brasil.

Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 237.

Distribución. — Región Tropical de la América del Sur, desde Colombia y Brasil recorriendo solamente por el O. de Ecuador, Bolivia y O. de la Argentina (Salta y Jujuy).

Subfamilia **Anatinae**

74. SARKIDIORNIS Eyton, 1838

- * 133. **Sarkidiornis sylvicola** Ihering Pato crestón.

Sarkidiornis sylvicola Ihering Cat. F. Braz., Vol. 1, 1907, p. 72. (Brasil: nomen novum pro *Anas carunculata* Lichtenstein, no de Vieillot).

Sarkidiornis sylvicola Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 228.

Distribución. — Región Tropical de la América del Sur; Venezuela y Brasil, Paraguay y Argentina (Salta, Tucumán, Chaco y Formosa).

75. NEOCHEN Oberholser, 1918

- * 134. **Neochen jubata** (Spix) Oca de monte.

Anser jubatus Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, p. 84, pl. 108. («Ad. ripam fl. Solimoens in insula Praya das Oncas»).

Alopochen jubatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 230.

Distribución. — Guayanas, Brasil, E. Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Orán).

76. CAIRINA Fleming, 1822

- * 135. **Cairina moschata** (Linné) Pato criollo.

Anas moschata Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 124. Brasil.

Cairina moschata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 228.

Distribución. — Desde N. Méjico, Centro América, O. América del Sur, Argentina (Salta, Tucumán, hasta Buenos Aires).

77. COSCOROBA Reichenbach, 1852

- * 136. **Coscoroba coscoroba** (Molina) Ganso, Cisne blanco.

Anas coscoroba Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili, 1782, p. 234. Chile.

Coscoroba coscoroba Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910 p. 228.

Distribución. — Chile (Antofagasta, hasta el Cabo de Hornos) Paraguay, Uruguay y Argentina (en todo el territorio, Islas Malvinas).

78. ANAS Linné, 1758

- * 137. **Anas specularis** King Pato espejo.

Anas specularis King, Zool. Journ. Vol. 4. 1828, p. 98. Estrecho de Magallanes.

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 230.

Distribución. — Chile (Región Cordillerana) Argentina (de los 40° S. hasta el Estrecho de Magallanes).

- * 138. **Anas cristata cristata** Gmelin Pato crestón del sur.

Anas cristata Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, p. 1789, p. 540. Argentina (Isla de los Estados).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18. 1910, p. 230.

Distribución. — Chile y Argentina (desde Santiago y Neuquén hasta el Cabo de Hornos) Islas Malvinas.

- * 139. **Anas cristata alticola** Ménégauz Pato crestón del norte.
Anas cristata alticola Ménégauz, Bull. Soc. Philom. Paris, Vol. 1, 1909, p. 224. Bolivia (Lago Poopó).
Anas cristata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 230.
 Distribución. — Chile (desde Atacama hasta Tarapacá), Bolivia, Perú y Argentina (O. Mendoza hasta Jujuy).
79. **NETTION** Stephens, 1824
- * 140. **Nettion leucophrys** (Vieillot) Pato de collar.
Anas leucophrys Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 156. Paraguay.
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 239.
 Distribución. — S. E. Bolivia, Paraguay, Brasil (Matto Grosso y Río Grande do Sul) Uruguay y Argentina (N. E. Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe).
- * 141. **Nettion brasiliense** (Gmelin) Pato portugués.
Anas brasiliensis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 517. Brasil.
Nettion brasiliense Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 231.
 Distribución. — E. de América del Sur; Perú, Brasil (Goyaz, Paraná, Río Grande do Sul y Matto Grosso), Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina (Chaco, Misiones hasta Buenos Aires).
- * 142. **Nettion flavirostre flavirostre** (Vieillot) Pato barcino común.
Anas flavirostris Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 107. Argentina, (Bs. Aires).
Nettion flavirostre Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 231.
 Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul) Paraguay, Uruguay, Chile (de Santiago hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (excepto el N. O. en todo el territorio, incluyendo la región andina).
- * 143. **Nettion flavirostre oxypterum** (Meyen) Pato barcino de Salta.
Anas oxyptera Meyen, Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol., Vol. 16, 1834, p. 121, pl. 26. Perú (Lago Titicaca).
Nettion oxypterum Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 231.
 Distribución. — Chile (Región de la Puna al N., desde Tacna a Antofagasta), Bolivia, S. Perú y Argentina (Salta Jujuy y Tucumán).
- * 144. **Nettion georgica** (Gmelin) Pato de Georgia del Sur.
Anas georgica Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 1789, p. 516. Isla Georgia del Sur.
Nettion georgicum Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 231.
 Distribución. — Isla Georgia del Sur.

80. QUERQUEDULA Stephens, 1824

- * 145. *Querquedula cyanoptera cyanoptera* (Vieillot) Pato colorado.

Anas cyanoptera Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 104. Argentina (Bs. Aires, La Plata).

Querquedula cyanoptera Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 232.

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta el Estrecho de Magallanes), Paraguay, Uruguay, Brasil (Río Grande do Sul), Argentina (en todo el territorio, Islas Malvinas). Llega hasta América del Norte.

- * 146. *Querquedula versicolor versicolor* (Vieillot) Pato argentino.

Anas versicolor Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 109. Paraguay.

Querquedula versicolor Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 232.

Distribución. — Chile (de Santiago hasta el Estrecho de Magallanes), S. Bolivia, Paraguay, Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (en todo el territorio, Islas Malvinas).

81. PAECILONITTA Eyton, 1838

- * 147. *Paecilonitta bahamensis rubrirostris* (Vieillot) Pato gargantilla.

Anas rubrirostris Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 108. Argentina (Bs. Aires).

Paecilonetta bahamensis rubrirostris Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 237.

Distribución. — Chile (Santiago, Curicó), S. Brasil, Paraguay, Uruguay, S. Bolivia, Argentina (de La Pampa hasta las provincias Norteñas, excepto la región andina).

- * 148. *Paecilonitta spinicauda* (Vieillot) Pato maicero.

Anas spinicauda Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 135. Argentina (Bs. Aires).

Dafila spinicauda Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 231.

Distribución. — S. Perú, S. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia Chile, Argentina (desde las Provincias Norteñas hasta el Estrecho de Magallanes, Islas Malvinas).

82. MARECA Stephens, 1824

- * 149. *Mareca sibilatrix* (Poeppig) Pato overo.

Anas sibilatrix Poeppig, Froriep's Notizen, Vol. 25, 1829, col. 10. Chile.

Mareca sibilatrix Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 231.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Chile (Coquimbo al Estrecho de Magallanes), Argentina (en todo el territorio excepto el Relieve Andino).

83. SPATULA Boie, 1822

- * 150. *Spatula platalea* (Vieillot) Pato pico cuchara.

Anas platalea Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 157. Paraguay.

Spatula platalea Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 232.

Distribución. — Perú, Bolivia, Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Misiones hasta Santa Cruz).

84. HETERONETTA Salvadori, 1895

- * 151. *Heteronetta atricapilla* (Merrem) Pato de cabeza negra.

Anas atricapilla Merrem, in Ersch et Gruber's Encyc., sect. 1, Vol. 35, 1841, p. 26. Argentina (Buenos Aires).

Heteronetta atricapilla Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 232.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Chile (Santiago, Valdivia), Paraguay, Uruguay, Argentina (Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, hacia el N.).

Subfamilia Nyrocinae

85. METOPIANA Bonaparte, 1856.

- * 152. *Metopiana peposaca* (Vieillot) Pato picazo.

Anas peposaca Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 132. Paraguay y Argentina (Buenos Aires).

Metopiana peposaca Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 233.

Distribución. — Chile (Santiago, Valdivia), Paraguay, Uruguay, S. Brasil, Argentina (Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, hasta el N.).

86. TACHYERES Owen, 1875

- * 153. *Tachyeres brachypterus* (Latham) Pato vapor grande.

Anas brachyptera Latham, Ind. Orn., Vol. 2, 1790, p. 834. Argentina (Islas Malvinas).

Tachyeres cinereus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 233.

Distribución. — Chile (Valdivia al Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- * 154. *Tachyeres patachonicus* (King) Pato vapor volador.

Oidemia patachonica King, Zool. Journ., Vol. 4, 1828, p. 100. Estrecho de Magallanes.

Tachyeres patachonicus Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 238.

Distribución. — Chile (Isla Chiloé, al Estrecho de Magallanes), Argentina (Tierra del Fuego, Isla de los Estados, Santa Cruz).

Subfamilia **Oxyurinae**87. **ERISMATURA** Bonaparte, 1832

- * 155. **Erismatura ferruginea** (Eyton) Pato zambullidor de pico ancho.
Erismatura ferruginea Eyton, Monogr. Anat., 1838, p. 170. Chile.
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 20, 1928, p. 239.
 Distribución. — Perú, Bolivia, Chile (Antofagasta a Llanquihué), Argentina (Neuquén a Tucumán, ocasionalmente en Salta).
- * 156. **Erismatura vittata** Philippi Pato zambullidor común.
Erismatura vittata Philippi, Arch. Naturg., Vol. 26, Band, 1, 1860, p. 26. Chile.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 233.
 Distribución. — Chile (Valparaíso, Valdivia), Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chubut hasta las provincias nortefías).

88. **NOMONYX** Ridgway, 1880

- * 157. **Nomonyx dominicus** (Linné) Pato fierro.
Anas dominica Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 201. Santo Domingo.
Nomonyx dominicus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 233.
 Distribución. — Grandes Antillas, América del Sur, hasta Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy hasta Buenos Aires).

Subfamilia **Merganettinae**89. **MERGANETTA** Gould, 1841

- * 158. **Merganetta armata armata** Gould Pato tortuga del sur.
Merganetta armata Gould, Proc. Zool. Soc. London, 1841, p. 95. Chile (Región Andina).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 234.
 Distribución. — Chile (Coquimbo a Llanquihué), Argentina (Río Negro, Mendoza).
- * 159. **Merganetta armata berlepschi** Hartert Pato tortuga del norte.
Merganetta berlepschi Hartert, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 244. Argentina (Tucumán 1.800 mts.).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 234.
 Distribución. — Argentina (Tucumán, Salta).

Subfamilia **Merginae**90. **MERGUS** Linné, 1758

- * 160. **Mergus octosetaceus** Vieillot Pato pico serrucho.
Mergus octosetaceus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 14, 1817, p. 222. Brasil.
Merganser octosetaceus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 234.
 Distribución. — Brasil (Santa Catharina, São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

ORDEN FALCONIFORMES

SUBORDEN CATHARTAE

Familia *Cathartidae* (*Condores, buires, cuervos*)

91. VULTUR Linné, 1758

- * 161. *Vultur gryphus* Linné Cóndor.

Vultur gryphus Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 83. Chile.

Sarcorhamphus gryphus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 238.

Distribución. — O. de América del Sur, desde Venezuela y Colombia hasta el Estrecho de Magallanes, Argentina (Relieve Andino, S. Buenos Aires; Bahía Blanca, N. Río Negro).

92. SARCORAMPUS Duméril, 1806

- * 162. *Sarcoramphus papa* (Linné) Cóndor real.

Vultur papa Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 86. Brasil.

Gypagus papa Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 238.

Distribución. — Méjico, Centro y Sud América; hasta el N. O. de Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán; accidentalmente Corrientes).

93. CORAGYPS Geoffroy, 1853

- * 163. *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein) Iribú, Cuervo.

Cathartes foetens Lichtenstein, Verz. Ausgest. Säug. und Vogel, 1818, p. 30. Paraguay.

Catharista atratus brasiliensis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 239.

Distribución. — América del Sur, hasta los 40° lat. S. Chile (Coquimbo hasta la Isla Chiloe), Argentina (Tucumán y Salta hasta Río Negro, Bs. Aires, Misiones, Formosa).

94. CATHARTES Illiger, 1811

- * 164. *Cathartes aura jota* (Molina) Oripopo, Jote.

Vultur jota Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili, 1782, p. 265. Chile (Santiago).

Cathartes aura Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 239.

Distribución. — O. de América del Sur, desde Colombia y Perú hasta el N. O. de Chile y Argentina (desde Salta y probablemente alcanza el límite N. de Mendoza).

- * 165. *Cathartes aura ruficollis* Spix Cuervo de cabeza y cuello rojo.

Cathartes ruficollis Spix, Av. Bras., Vol. 1, 1824, p. 2. Brasil (Bahía).

Cathartes aura Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 239.

C. a. aura, Ibid, p. 413.

Distribución. — Venezuela y Brasil (Pará, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), Guayanas, Paraguay, Uruguay y Argentina (N. E. Formosa hasta Bs. Aires).

- * 166. **Cathartes aura falklandica** (Sharpe) Cuervo de las Malvinas.

Catharista falklandica Sharpe, Ann. and Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 11, 1873, p. 133. Argentina (Islas Malvinas).

Cathartes falklandica Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 239. *C. a. falklandica* Ibid. p. 413.

Distribución. — Costas de Chile, desde Concepción hasta el Estrecho de Magallanes, Argentina (Tierra del Fuego e Islas Malvinas).

- * 167. **Cathartes urubitinga** Pelzeln Sapatiba, Iribúpirái.

Cathartes urubitinga Pelzeln, Sitzungsab. K. Akad. Wien, Vol. 44, 1861, p. 7. Brasil. Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 239.

Distribución. — E. de América del Sur, Venezuela, Guayanas, Brasil hasta el Paraguay y Uruguay, Argentina (Chaco, Misiones y Formosa).

SUBORDEN FALCONES

Superfamilia Falconoidea

Familia Accipitridae (*Aguilas, Aguiluchos, Gavilanes*)

Subfamilia Elaninae

95. ELANUS Savigny, 1809

- * 168. **Elanus leucurus leucurus** (Vieillot) Halcón blanco.

Milvus leucurus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 20, 1818, p. 563. Paraguay.

Elanus leucurus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 248.

Distribución. — América del Sur, Venezuela, Brasil, Chile (Santiago hasta Cautín), Uruguay y Argentina (N. La Pampa hasta Salta, Jujuy, Misiones).

Subfamilia Perninae

96. ELANOIDES Vieillot, 1818

- * 169. **Elanoides forficatus yetapa** Vieillot Halcón tijereta, Taguato-yetapá

Elanoides yetapa Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 3, 1823, p. 1205. Paraguay.

Elanoides forficatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 247.

Distribución. — Centro y Sud América hasta N. E. Argentina (Misiones, Chaco, hasta Bs. Aires).

97. ODONTRIORCHIS Kaup, 1844

170. **Odontriorchis palliatus palliatus** (Temminck) Gavilán.

Falco palliatus "P. Max" Temminck, Pl. Col. livr. 23, 1822 pl. 204. Brasil (Bahía, Río Peruhype; según Hellmayr).

Leptodon palliatus Dabbene, Physis, Vol. 2, 1916, p. 291.

Distribución. — Méjico, Isla Trinidad, Centro y Sud América, hacia el E. Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina (Misiones: Loreto).

98. CHONDROHIERAX LESSON, 1843

171. **Chondrohierax uncinatus** (Temminck) Halcón plumizo.

Falco uncinatus «Illiger» Temminck, Pl. Col., Livr. 18, 1822, pl. 103, 104, 115. Brasil.
Chondrohierax uncinatus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, 1926, N° 4, p. 394.

Distribución. — Méjico, Pequeñas Antillas, América del Sur, hasta el N. E. Argentina (Misiones).

172. **Chondrohierax megarhynchus** (Des Murs) Halcón manchado.

Regerhinus cymidis megarhynchus «Kaup» Des Murs, in Castelnau, Voyage, Vol. 1. 1855, Ois. p. 9, pl. 1. (Ecuador Sarayacu ?).

Chondrohierax megarhynchus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 393.

Distribución. — Centro y Sud América, Venezuela, Ecuador hasta el N. O. Argentina (Tucumán).

Subfamilia **Milvinae**

99. HARPAGUS VIGORS, 1824

* 173. **Harpagus diodon** (Temminck) Halcón azulado del Brasil.

Falco diodon Temminck, Pl. Col., Livr. 34, 1823, pl. 198. Brasil (Bahía, Río Peruhype).
Harpagus diodon Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 304.

Distribución. — Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Bahía), Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Misiones).

100. ICTINIA Vieillot, 1816

* 174. **Ictinia plumbea** (Gmelin) Halcón azulado.

Falco plumbeus Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 283. Guayana Francesa (Cayena).
Ictinia plumbea Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 249.

Distribución. — Centro y Sud América hasta N. Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Santa Fe).

101. ROSTRHAMUS LESSON, 1830

* 175. **Rostrhamus sociabilis sociabilis** (Vieillot) Caracolero.

Herpetotheres sociabilis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 18, 1817, p. 318. Argentina (Corrientes y Río de la Plata).

Rostrhamus sociabilis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 247.

Distribución. — Panamá a través de América del Sur, hasta Uruguay y Argentina (Bs. Aires, Isla Martín García, Córdoba hacia el N.).

Subfamilia **Accipitrinae**102. **ACCIPITER** Brisson, 1760

- * 176. **Accipiter pileatus** (Temminck) Esparvero, Azulejo.
Falco pileatus Temminck, Pl. Col. Livr. 35, 1823, pl. 205. Brasil, Bahía.
Accipiter pileatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 243.
 Distribución. — S. E. Brasil (Maranhão, Bahía, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Salta, Tucumán, Misiones, Chaco).
- * 177. **Accipiter chilensis** Philippi et Landbeck Halcón, Peuquito
Accipiter chilensis Philippi et Landbeck, Arch. Naturg., Vol. 30, t. 1, 1864, p. 43.
 Chile.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 243.
 Distribución. — Chile (Aconcagua hasta el Estrecho de Magallanes)? Argentina (La Rioja?, Chubut, Lago Gral. Paz, Santa Cruz, Tierra del Fuego, hasta el Cabo de Hornos).
- * 178. **Accipiter erythronemius erythronemius** (Kaup) Esparvero rojizo.
Nisus vel. *Accipiter erythronemius* Gray, Kaup, in Jardine, Contr. Ornith. 1850. pt. 3, p. 64. Bolivia.
Accipiter erythrocnemis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 242.
 Distribución. — América del Sur, S. E. del Brasil, E. de Bolivia, Uruguay y Argentina (Salta, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones).
- * 179. **Accipiter guttifer** Hellmayr Esparvero pardo.
Accipiter guttifer Hellmayr, Verhandl. Orn. Ges. Bayern, Vol. 13, 1917 p. 200. Bolivia.
Accipiter guttatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 243.
 Distribución. — Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, La Rioja, Tucumán, Chaco).
- * 180. **Accipiter poliogaster** (Temminck) Gavilán de Misiones.
Falco poliogaster Temminck, Pl. Col. livr. 45, 1824, pl. 264. Brasil (São Paulo).
Cooperastur poliogaster Dabbene, Physis, Vol. 2, 1916, p. 291.
 Distribución. — S. E. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones: Santa Ana).
181. **Accipiter superciliosus superciliosus** (Linné) Gavilán.
Falco superciliosus Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 128. Surinam.
Accipiter tinus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 414.
Accipiter superciliosus Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 300.
 Distribución. — Venezuela y Guayanas hasta el S. Paraguay y Argentina (Misiones).

103. **HETEROSPIZIAS** Sharpe, 1874

- * 182. **Heterospizias meridionalis australis** Swann Aguila colorada.
Heterospizias meridionalis australis Swann, Auk, Vol. 38, 1921, p. 359. Argentina (Tucumán, Laguna de Malima).

Heterospizias meridionalis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 243.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Formosa hasta Bs. Aires).

Subfamilia **Buteoninae**

104. GERANOÆTUS Kaup, 1844

- * 183. **Geranoætus melanoleucus melanoleucus** (Vieillot) Aguila blanca.

Spizaëtus melanoleucus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 32, 1819, p. 57. Paraguay.

Geranoætus melanoleucus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 243.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay y Argentina (Formosa, Chaco hasta Bs. Aires).

- * 184. **Geranoætus melanoleucus australis** Swann Aguila escudada.

Geranoætus melanoleucus australis Swann, Syn. Accip. ed. 2, 1922, p. 67. Argentina (Chubut, Valle del Lago Blanco).

Geranoætus melanoleucus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 243.

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (N. O. y S. Tucumán, Mendoza hasta Tierra del Fuego).

105. BUTEO Lacépède, 1799

- * 185. **Buteo albicaudatus albicaudatus** Vieillot Aguilucho rojo, Aguila de cola blanca.

Buteo albicaudatus Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 4, 1816, p. 477. Brasil (Río de Janeiro).

Tachytriorchis albicaudatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 243.

Distribución. — América del Sur, Brasil (Bahía), Bolivia Paraguay, Uruguay y Argentina (en todo el Territorio).

- * 186. **Buteo poecilochrous** Gurney Yauayacu, Aguilucho de cola roja.

Buteo poecilochrous Gurney, Ibis, 1879, p. 176. Ecuador (Yauayacu).

Chapman, Bull. An. Mus. Nac. Hist., Vol. 55, 1926, p. 230.

Distribución. — Región Andina del Ecuador, Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).

- * 187. **Buteo polyosoma polyosoma** (Quoy et Gaimard) Aguila de pecho blanco.

Falco polyosoma Quoy et Gaimard, Voy. «Uranie», Zool. pt. 1, 1824, p. 92, pl. 14. Argentina (Islas Malvinas).

Buteo polyosoma Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 244.

Distribución. — Chile (Tarapacá hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Catamarca, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y por toda la Patagonia; Islas Malvinas).

- * 188. **Buteo swainsoni** Bonaparte Aguila langostera.
Buteo Swainsoni Bonaparte, Geogr. Comp. List. 1838, p. 3. En la vecindad del Río Columbia).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 244.
 Distribución. — América, desde Alaska hasta los 39° Lat. S., Argentina (Buenos Aires, Mendoza hacia las provincias del N.).
106. RUPORNIS Kaup, 1844
- * 189. **Rupornis magnirostris magniplumis** (Bertoni) Gavilán del Paraguay.
Potamolegus superciliaris magniplumis Bertoni, An. Cient. Paraguayos (1), N° 1, 1901, p. 157. Paraguay (Río Mondaih).
Rupornis magnirostris Nattereri Dabbene, An. Mus. Nac. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución. — Brasil (Minas Geraes, São Paulo, Río Grande do Sul, Paraná), E. Paraguay, N. E. Argentina (Misiones: Santa Ana).
- * 190. **Rupornis magnirostris superciliaris** (Vieillot) Gavilán de cejas blancas.
Sparvius superciliaris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 10, 1817, p. 328. Paraguay.
Rupornis magnirostris Pucherani = *Rupornis magnirostris Nattereri* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución. — S. O. Paraguay, Argentina (Chaco, Formosa).
- * 191. **Rupornis magnirostris gularis** (Schlegel) Gavilán de Buenos Aires.
Asturina gularis Schlegel, Mus. Pays-Bas., Vol. 2, 1862, Asturinae, p. 4. Argentina (Buenos Aires).
Rupornis magnirostris Pucherani = *Rupornis magnirostris Nattereri* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución — Uruguay, Argentina (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro).
- * 192. **Rupornis magnirostris saturata** (Sc Slater et Salvin) Gavilán de Bolivia.
Asturina saturata Sc Slater et Salvin, Proc. Zool. Soc. London, 1876, p. 357. Bolivia (Apolo y Tilotilo).
Rupornis magnirostris saturata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución. — Bolivia, Perú, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).
- * 193. **Rupornis leucorrhoea** (Quoy et Gaimard) Gavilán de rabadilla blanca.
Falco leucorrhous Quoy et Gaimard, Voy. de l'«Uranie», Zool., pt. 1, 1824, p. 91, pl. 13. Brasil.
Rupornis leucorrhoea Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución. — América del Sur, Colombia, Venezuela hasta el Paraguay, Argentina (Tucumán, Chaco, Formosa).

107. BUTEOLA Bonaparte, 1855

- * 194. **Buteola brachyura** (Vieillot) Gavilán de la costa.
Buteo brachyurus Vieillot, Nouv. Dic. Hist. Nat., Vol. 4, 1816, p. 477. Guayana Francesa (Cayena).
Buteola brachyurus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 244.
 Distribución. — E. Méjico y Florida, Centro y Sud América; Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Misiones, Tucumán).

108. PARABUTEO Ridgway, 1874

- * 195. **Parabuteo unicinctus unicinctus** (Temminck) Gavilán mixto.
Falco unicinctus Temminck, Pl. Col., liv. 53, 1824, pl. 313. Brasil (Río Grande do Sul).
Parabuteo unicinctus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 242.
 Distribución. — América del Sur; Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile (Santiago) y Argentina (desde el Norte hasta Buenos Aires, La Pampa).

109. ASTURINA Vieillot, 1818

- * 196. **Asturina nitida nitida** (Latham) Halcón grande.
Falco nitidus Latham, Ind. Orn., Vol. 1, 1790, p. 41. Guayana Francesa (Cayena).
Asturina nitida Dabbene, Physis, t. 2, N° 12, 1916, p. 428.
 Distribución. — Trínidad, América del Sur; Panamá, hacia el E. por el Brasil hasta Paraguay y Argentina (Chaco, Formosa).

110. LEUCOPTERNIS Kaup, 1847

197. **Leucopternis (albicollis ?) polionota** (Kaup) Halcón de vientre blanco y lomo negro.
Asturina (Leucopternis) polionota Kaup, Isis, 1847, col. 212. Brasil (São Paulo).
Leucopternis palliata Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 302.
 Distribución. — Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

111. HYPOMORPHNUS Cabanis, 1844

- * 198. **Hypomorphnus urubitinga azarae** (Swann) Aguila pescadora.
Urubitinga urubitinga azarae Swann, Monogr. Birds Prey, pt. 8, 1930, p. 453. Argentina (Tucumán).
Urubitinga urubitinga Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 246.
 Distribución. — Paraguay, Argentina (Chaco, Formosa, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy).

112. BUTEOGALLUS Lesson, 1830

- * 199. **Buteogallus aequinoctialis** (Gmelin) Halcón de cabeza negra.
Falco aequinoctialis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 1, 1788, p. 267. Guayana Francesa (Cayena).
Buteogallus aequinoctialis Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 302.
 Distribución. — Guayanas, Brasil (Matto Grosso, Pará, Maranhao, Piauí hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

113. BUSARELLUS Lafresnaye, 1842

- * 200. **Busarellus nigricollis australis** Swann Aguila pampa.
Busarellus nigricollis australis Swann, Syn. Accip., ed. 2, 1922, p. 95. Argentina (Chaco).
Busarellus nigricollis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 245.
 Distribución. — Paraguay, Argentina (Chaco, Misiones).

114. HARPYHALIAETUS Lafresdaye, 1842

- * 201. **Harpypaliaetus coronatus** (Vieillot) Aguila coronada, Aguila de la flecha.
Harpypaliaetus coronatus Vieillot, Nouv. Dict. Hist., Nat., Vol. 14, 1817, p. 237. Paraguay.
Harpypaliaetus coronatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 246.
 Distribución. — Brasil, (Mato Grosso, Goyaz, São Paulo, Paraná), Paraguay, Bolivia (?), Chile, Argentina (Tucumán, Córdoba hasta Río Negro).

115. MORPHNUS Dumont, 1816

202. **Morphnus guianensis** (Daudin) Urubitinga.
Falco guianensis Daudin, Traité, d'Orn., Vol. 2, 1800, p. 78. Guayana Francesa (Cayena).
Morphnus guianensis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 246.
 Distribución. — Honduras, Panamá, Guayanas, E. Brasil, E. Perú, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco).

116. HARPIA Vieillot, 1816

- * 203. **Harpia harpyja** (Linné) Uracú, Harpía.
Vultur harpyja Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 86. México.
Thrasypetus harpyja Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 246.
 Distribución. — N. México hasta S. Bolivia, Brasil, Paraguay, N. E. Argentina (Misiones).

117. SPIZASTUR Gray, 1841

- * 204. **Spizastur melanoleucus** (Vieillot) Aguila viuda, blanca y negra.
Buteo melanoleucus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 4, 1816, p. 482. Guayanas.

Spizastur melanoleucus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 247.

Distribución. — México (Vera Cruz, Oaxaca) hasta el Paraguay y N. E. Argentina (Misiones).

118. SPIZAËTUS Vieillot, 1816

- * 205. **Spizaëtus ornatus** (Daudin) Aguila coronada, Esparvero calzado.

Falco ornatus Daudin, *Traité d'Orn.*, Vol. 2, 1800, p. 77. Guayana Francesa (Cayena).
Spizaëtus ornatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 247.

Distribución. — N. México, Perú hasta el S. E. Brasil, Paraguay y Argentina (Misiones, Formosa).

- * 206. **Spizaëtus tyrannus** (Wied) Aguila negra.

Falco tyrannus Wied, *Reise Brasilien*, Vol. 1, 1820, p. 360. Brasil (Bahía, Río Belmonte, Quartel dos Arcos).

Spizaëtus tyrannus Dabbene, *Physis*, Vol. 2, 1916, p. 428.

Distribución. — S. Méjico, desde Vera Cruz a Sud América, hacia el E. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones: Bonpland).

Subfamilia *Circinae*

119. *Circus* Lacépède, 1799

- * 207. ***Circus cinereus*** Vieillot Gavilán, Ladrón de pollos.

Circus cinereus Vieillot, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, Vol. 4, 1816, p. 454. Paraguay.

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 241.

Distribución. — América del Sur; Perú, E. Bolivia, raramente en Colombia y Ecuador (Chapman) y por migración alcanzan hasta el Cabo de Hornos e Islas Malvinas y por ende en todo el territorio de Chile, Uruguay y Argentina.

- * 208. ***Circus buffoni*** (Gmelin) Aguila de los campos.

Falco Buffoni Gmelin, *Syst. Nat.*, Vol. 1, 1788, p. 277. Paraguay.

Circus maculosus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 241.

Distribución. — América del Sur, Colombia, Guayanas hasta Uruguay, Chile, Argentina (en todo el territorio desde Tierra del Fuego hasta Salta y Misiones, excepto el relieve andino).

120. GERANOSPIZA Kaup, 1847

- * 209. ***Geranospiza caerulescens flexipes*** Peters Gavilán plumizo.

Geranospiza caerulescens flexipes Peters, *Proc. Biol. Soc. Wash.*, Vol. 48, 1935, p. 72. Argentina (Chaco, Resistencia).

Geranospiza caerulescens Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 242.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul, Paraná), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Formosa, Catamarca, Tucumán, Buenos Aires).

Subfamilia **Pandioninae**

121. PANDION Savigny, 1809

- * 210. **Pandion haliaetus carolinensis** (Gmelin) Aguila americana, Sangual.
Falco carolinensis Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1, 1788, p. 263. Carolina (?).
Pandion haliaetus carolinensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 395.
 Distribución. — Alaska, EE. UU. de N. América, Méjico, Centro y Sud América hasta Chile, Argentina (Salta, Tucumán).

Familia **Falconidae** (*Chimangos, halcones, caranchos*).Subfamilia **Herpetotherinae**

122. HERPETOTHERES Vieillot, 1817

- * 211. **Herpetotheres cachinnans queribundus** Bangs et Penard Pájaro guaicurú.
Herpetotheres cachinnans queribundus Bangs et Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 63, 1919, p. 23. Brasil (Pernambuco).
Herpetotheres cachinnans Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 247.
 Distribución. — Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Formosa, Misiones).

123. MICRASTUR Gray, 1841

- * 212. **Micrastur semitorquatus semitorquatus** (Vieillot) Gavilán chouf.
Sparvius semitorquatus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 10, 1817, p. 322. Paraguay.
Micrastur semitorquatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 241.
 Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa hasta Buenos Aires (?)).
- * 213. **Micrastur ruficollis ruficollis** (Vieillot) Gavilán de cuello rojizo.
Sparvius ruficollis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 10, 1817, p. 322. Brasil.
Micrastur ruficollis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires. Vol. 18, 1910, p. 241. *M. gilvicollis*, Ibid. p. 241 y 414.
 Distribución. — Brasil, (Matto Grosso, Minas Geraes) Paraguay, Argentina (Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco).

Subfamilia **Polyborinae**

124. MILVAGO Spix, 1824

- * 214. **Milvago chimachima chimachima** (Vieillot) Chimachima.
Polyborus chimachima Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 5, 1816, p. 259. Paraguay.

Milvago chimachima Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 241.

Distribución. — Perú, Brasil (Amazonas hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Bolivia, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe).

* 215. **Milvago chimango chimango** (Vieillot) Chimango.

Polyborus chimango Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 5, 1816, p. 260. Paraguay y Argentina.

Milvago chimango Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 241.

Distribución. — Chile (Atacama hasta Concepción), Bolivia, Paraguay, Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (en todo el territorio, Islas Malvinas).

125. PHALCOBOENUS D'Orbigny, 1834

* 216. **Phalcoboenus australis** (Gmelin) Caracara.

Falco australis Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 1, 1788, p. 259. Argentina (Isla de Los Estados),

Ibycter australis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 240.

Distribución. — Argentina (Tierra del Fuego, Isla de Los Estados, Islas del Cabo de Hornos, Malvinas).

* 217. **Phalcoboenus albogularis** Gould Carancho.

Polyborus (Phalcoboenus) albogularis Gould. Proc. Zool. Soc. London, 1837, p. 9. Argentina (Santa Cruz).

Ibycter albogularis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 240.

Distribución. — Argentina (Mendoza, Neuquén, hasta Santa Cruz, Río Gallegos).

* 218. **Phalcoboenus megalopterus** (Meyen) Matamico.

Aguila megaloptera Meyen, Nova Acta. Acad. Caes. Leop. Carol., Vol. 16, supl. 1, 1834, p. 64, pl. 7, Chile. (Región Andina).

Ibycter megalopterus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 240. *Phalcoboenus megalopterus*, Ibid. p. 414.

Distribución. — Ecuador, Perú, Bolivia, Chile (Tacna hasta Colchagua), Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).

126. POLYBORUS Vieillot, 1816

* 219. **Polyborus plancus plancus** (Miller) Carancho, Caracará, Iraro.

Falco plancus Miller, Icon. Anim., 1777, lp. 17. Argentina (Tierra del Fuego).

Polyborus tharus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 240.

Distribución. — Paraguay, Uruguay, Chile (Copiapó al Estrecho de Magallanes), Argentina (en todo el territorio).

Subfamilia **Polihieracinae**127. **SPIZIAPTERYX** Kaup, 1851

- * 220. **Spizapteryx circumcinctus** (Kaup) Halconcito gris.
Harpagus circumcinctus Kaup, Proc. Zool. Soc. London, 1851, p. 43. Chile, error = N. O. Argentina
Spizapteryx circumcinctus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 249.
 Distribución. — Argentina (Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa).

128. **GAMPSONYX** Vigors, 1825

- * 221. **Gampsonyx swainsonii swainsonii** Vigors Halcón de Swainson.
Gampsonyx Swainsonii Vigors, Zool. Journ., Vol. 2, 1825, p. 69. Brasil (Bahía).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 248.
 Distribución. — Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Tucumán, Salta, Formosa).

Subfamilia **Falconinae**129. **FALCO** Linné, 1758Subgénero **RHYNCHODON** Nitzsch, 1824

- * 222. **Falco peregrinus anatum** Bonaparte Halcón viajero.
Falco anatum Bonaparte, Georg. et Comp. List. Birds Eur. and. N. América, 1838, p. 4. (Egg. Harbor, New Jersey).
Falco peregrinus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 250.
F. p. anatum, Ibid. p. 415.
 Distribución. — N. C. y Sud América hasta Chile (Aconcagua, Valdivia), Argentina (Salta, Tucumán, Bs. Aires al Estrecho de Magallanes).
- * 223. **Falco peregrinus cassini** Sharpe Halcón de Cassin.
Falco Cassini Sharpe Ann. Mag. Nat. Hist., Vol. 11, 1873, p. 221. Chile y Argentina. Estrecho de Magallanes.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 250. *F. p. Cassini*, Ibid. p. 415.
 Distribución. — Chile (Valdivia, Cautín, Santiago), Argentina (Patagonia).
- * 224. **Falco deiroleucus** Temminck Halcón de pecho anaranjado.
Falco deiroleucus Temminck, Pl. Col., Livr. 50. 1825, pl. 348. Brasil.
Hypotriorchis aurantius Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 249.
 Distribución. — Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Tucumán, Salta, Chaco).

Subgénero FALCO Linné, 1758

- * 225. **Falco rufigularis pax** Chubb Halcón de gargante rojiza.
Falco rufigularis pax Chubb, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 39, 1918, p. 22. Bolivia.
Hypotriorchis rufigularis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910,
 p. 249.
 Distribución. — Bolivia, Brasil (Matto Grosso (?)), Argentina (Tucumán, Sgo.
 del Estero, Formosa).

Subgénero RHYNCHOFALCO Ridgway, 1873

- * 226. **Falco fusco-caerulescens fusco-caerulescens** Vieillot Halcón azuado.
Falco fusco-caerulescens Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 11, 1817, p. 90. Paraguay.
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2, 1923, p. 165.
 Distribución. — América del Sur, Colombia, Guayanas hasta Chile (Tarapacá al
 Estrecho de Magallanes, Uruguay, Argentina (en todo el territorio)).

130. CERCHNEIS Boie, 1826

- * 227. **Cerchneis sparverius cinnamominus** (Swainson) Halconcito.
Falco cinnamominus Swainson, Anim. Menag. 1838, p. 281. Chile.
Cerchneis sparverius australis Dabbene, en Pereyra, EL HORNERO, Vol. 3, N° 2,
 1923, p. 165.
 Distribución. — Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile (Atacama al Estrecho
 de Magallanes), Argentina (en todo el territorio).

ORDEN GALLIFORMES

SUBORDEN GALLI

Superfamilia Cracoidea

Familia Cracidae (*Pavas de monte, charatas*)

131. CRAX Linné, 1758

- * 228. **Crax sclateri sclateri** Gray Muitá.
Crax sclateri Gray, List. Bds. Brit. Mus. Gallinae, 1867. p. 14. Méjico.
 Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 85, 1934, p. 124.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, São Paulo), al Sur del Paraguay,
 Argentina (Chaco entre Pilcomayo y Bermejo, raramente más al Sur).

132. PENELOPE Merrem, 1786

- * 229. **Penelope nigrifrons** Dabbene Pava de monte de Calilegua.
Penelope nigrifrons Dabbene, Physis, Vol. 4, 1918, p. 102. Argentina, Jujuy (Cerro
 Calilegua).
 Distribución. — S. Bolivia y NO. Argentina (Jujuy).

- * 230. **Penelope obscura bridgesi** Gray Pava de monte de Bolivia.

Penelope bridgesi Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1860, p. 270. Bolivia.

Penelope obscura bridgesi Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 84, 1934, p. 106.

Distribución. — S. Bolivia y NO. Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero).

- * 231. **Penelope obscura obscura** Temminck Pava de monte del Paraguay.

Penelope obscura «Illiger» Temminck, Hist. Nat. Fig. et Gall., Vol. 3, 1815, p. 68. Paraguay.

Penelope obscura Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 84, 1934, p. 106.

Distribución. — S. E. Brasil (desde Río de Janeiro a San Pablo), N. Uruguay, Paraguay, Argentina (Chaco, Misiones, Corrientes).

- * 232. **Penelope superciliaris major** Bertoni Yacupeba.

Penelope purpurescens (sic) Bertoni, An. Cient. Paraguayos N° 1, 1901, p. 16. Paraná.

Penelope superciliaris Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 84, 1934, p. 105.

Distribución. — S. E. Brasil, Paraguay y Argentina (Misiones).

133. **ORTALIS** Merrem, 1786

- * 233. **Ortalis canicollis canicollis** (Wagler) Charata.

Penelope canicollis Wagler, Isis von Oken, Vol. 23, 1830, col. 1112. Paraguay.

Ortalis canicollis Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 85, 1934, p. 124.

Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso), Paraguay y N. Argentina (Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

134. **PIPILE** Bonaparte, 1856

- * 234. **Pipile jacutinga** (Spix) Yacutinga.

Penelope jacutinga Spix, Av. Brasil, Vol. 2, 1825, p. 53, pl. 70. Brasil (entre Bahía y Río de Janeiro).

Pipile jacutinga Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 84, 1934, p. 105.

Distribución. — Brasil (Bahía, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 235. **Pipile cumanensis grayi** (Pelzen) Pava de Gray.

Penelope gray Pelzeln, Orn. Bras., Ab. th. 3, 1870, p. 284 (error = Perú).

Pipile cumanensis grayi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 190.

Distribución. — Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina (Salta, Jujuy, Chaco).

Superfamilia **Phasianoidea**Familia **Phasianidae** (*Perdices de California, Urús*)Subfamilia **Odontophorinae**

135. ODONTOPHORUS Vieillot, 1816

* 236. **Odontophorus capueira** (Spix) Urú, Capoeira.

Perdix capueira Spix, Avi. Bras., Vol. 2, 1825, p. 59, pl. 76a. Brasil (Río de Janeiro).

Odontophorus capueira Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 84, 1934, p. 124.

Distribución. — S. E. Brasil (Río de Janeiro, Minas Geraes), Paraguay, Argentina (Misiones).

136. LOPHORTYX Bonaparte, 1838

* 237. **Lophortyx californica brunnescens** Ridgway Perdiz de California.

Lophortyx californicus brunnescens Ridgway, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 2, 1884, p. 94. EE. UU. de Norte América, California.

Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, N° 86, 1934, p. 12.

Distribución. — Norte América (Oregón, Santa Cruz, California), introducida en América del Sur, Chile (Coquimbo, Talca, Islas Juan Fernández), Argentina.

(Continuará).