

EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de las aves argentinas

Zotta, A. R.; Da Fonseca, S.
1936

Cita: Zotta, A. R.; Da Fonseca, S. (1936) Lista sistemática de las aves
argentinas. *Hornero* 006 (02) : 343-364

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

LISTA SISTEMATICA DE LAS AVES ARGENTINAS

ELABORADA POR LA SECCIÓN ORNITOLÓGICA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

(Continuación de la pág. 196)

ORDEN GRUIFORMES

SUBORDEN GRUES

SUPERFAMILIA GRUIDES

Familia Aramidae (*Caraos*)

137. ARAMUS Vieillot, 1816

- * 238. **Aramus scolopaceus caraú** Vieillot Carao, Viuda loca.

Aramus caraú Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 8, 1817, p. 300. Paraguay.

Aramus scolopaceus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 222.

Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Bolivia (Tarija), Uruguay, Argentina (Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, La Rioja).

SUPERFAMILIA RALLIDES

Familia Rallidae (*Gallinetas, Pollas de agua, Gallaretas*)

Subfamilia Rallinae

138. RALLUS Linné, 1758

239. **Rallus limicola antarcticus** King Gallineta antártica.

Rallus antarcticus King, Zool. Journ., Vol. 4, 1828, p. 95. Estrecho de Magallanes. Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 195.

Distribución. — Chile (Santiago, Talca, Linares, Concepción, hasta el Estrecho de Magallanes y Archipiélago del Cabo de Hornos, Isla Hermite), Argentina (Buenos Aires, por la Patagonia hasta el Estrecho de Magallanes).

- * 240. **Rallus sanguinolentus sanguinolentus** Swainson Gallineta de pico rojo y azul.

Rallus sanguinolentus Swainson, Anim. in Ménag., 1837, p. 335, Brasil, Chile.

Limnopardalus rytirhynchus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 195.

Distribución. — S. Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Salta, La Rioja, Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos hasta Río Negro).

- * 241. **Rallus sanguinolentus luridus** Peale Gallineta antártica grande.
Rallus luridus Peale, U. S. Expl. Exp., Vol. 8, 1848, p. 223. Chile (Magallanes; O-range).
Limnopardalus rythirhynchus vigilantis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 195.

Distribución. — Chile (Magallanes; Cabo de Hornos, Islas Madre de Dios, Año Nuevo, Hermite, Canal Trinidad), Argentina (Tierra del Fuego, Isla de los Estados).

- * 242. **Rallus sanguinolentus landbecki** Hellmayr Gallineta andina. Patagónica.
Rallus sanguinolentus landbecki Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Publ. 308, Vol. 19, 1932, p. 351. Chile (Concepción).

Distribución. — Chile (Concepción, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, hasta Llanquihue) O. Argentina (Chubut, Santa Cruz y Río Negro).

- * 243. **Rallus nigricans nigricans** Vieillot Gallineta de pico verde.
Rallus nigricans Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 560. Paraguay.
Limnopardalus nigricans Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 195.

Distribución. — Sud América; Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil (Río Grande do Sul, Paraná), Paraguay, Argentina (Tucumán, Salta, Catamarca, Chaco Misiones).

- * 244. **Rallus maculatus maculatus** Boddaert Gallineta overa.
Rallus maculatus Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 48. Guayana Francesa (Cayena).
Limnopardalus maculatus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 195.

Distribución. — E. Sud América, Guayana Francesa, Brasil (Pará, Goyaz, Minas Geraes, Bahía hasta São Paulo y Paraná), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires).

139. ARAMIDES Pucheran, 1845

- * 245. **Aramides cajanea cajanea** (Müller) Gallineta rojiza, Chiricote.
Fulica Cajanea P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 119. Guayana Francesa (Cayena).

Aramides cajanea chiricote Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 196.

Distribución. — Costa Rica; Panamá; Sudamérica; desde Colombia, Ecuador hasta las Guayanás y desde el N. E. Brasil hasta Bolivia, Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Sgo. del Estero, Buenos Aires).

- * 246. **Aramides ypecaha** (Vieillot) Gallineta rojiza, Huáscara, Ypecahá.
Rallus ypecaha Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 568. Paraguay.
Aramides ypacaha Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 196.

Distribución. — Brasil (Bahía, Pernambuco, Minas Geraes, Río de Janeiro, Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 247. **Aramides saracura** (Spix) Gallineta mediana plomiza.

Gallinula saracura Spix, Avium Bras., Vol. 2, 1825, p. 75, pl. 98. Brasil.

Aramides saracura Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 196.

Distribución. — Brasil (Minas Geraes, Paraná, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

140. **PORZANA Vieillot**, 1816.

- * 248. **Porzana spiloptera** Durnford Gallinetita de los espartillares.

Porzana spiloptera Durnford, Ibis, 1877, p. 194, pl. 3. Argentina (Buenos Aires, Belgrano).

Porzana salinasi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 196.

Distribución. — Argentina (Buenos Aires, Santa Fé, San Luis, San Juan, La Rioja).

- * 249. **Porzana albicollis albicollis** (Vieillot) Gallinetita de garganta blanca.

Rallus albicollis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 561. Paraguay (Villa Curuguati).

Porzana albicollis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 166.

Distribución. — S. E. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Tucumán, Bs. Aires).

- * 250. **Porzana flaviventer flaviventer** (Boddaert) Gallinetita de cejas blancas.

Rallus flaviventer Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 52. Guayana Francesa (Cayena).

Porzana flaviventer Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 166.

Distribución. — N. de Sudamérica; Guayanás, S. E. de Colombia, hasta S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Tucumán, Buenos Aires).

141. **LATERALLUS** G. R. Gray, 1855

- * 251. **Laterallus melanophaius melanophaius** (Vieillot) Gallinetita, Burrito de patas verdes.

Rallus melanophaius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 549. Paraguay. *Creciscus melanophaius* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 167.

Distribución. — Brasil (Río de Janeiro, Santa Catharina, Río Grande do Sul, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 252. **Laterallus leucopyrrhus** (Vieillot) Gallinetita, Burrito de patas rojas.

Rallus leucopyrrhus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 550. Paraguay.

Creciscus leucopyrrhus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 167.

Distribución. — Brasil (Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

142. **COTURNICOPS** G. R. Gray, 1854

- * 253. **Coturnicops notata notata** (Gould) Gallineta enana.

Zapornia notata Gould, in Darwin's Zool., Voy. «Beagle» 1841, p. 132, pl. 48. Argentina (Río de la Plata).

Ortygops notata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 167.

Distribución. — Uruguay, Argentina (Córdoba, Buenos Aires, hasta Patagonia).

143. NEOCREX Sclater et Salvin, 1868

* 254. *Neocrex erythrops erythrops* (Sclater) Gallineta pico rojo, Cocha polla.

Porzana erythrops Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 1867, p. 343, pl. 21. Perú (Lima).

Neocrex erythrops Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 197.

Distribución. — Perú, S. O. Brasil, Bolivia, Argentina (Tucumán).

144. PORPHYRIOPS Pucheran, 1845

* 255. *Porphyriops melanops melanops* (Vieillot)

Gallineta de escudete verde, Polla de agua.

Rallus melanops Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 28, 1819, p. 553. Paraguay.

Porphyriops melanops Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 197.

Distribución. — E. Brasil (Bahía, Río de Janeiro, Paraná), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires).

Subfamilia **Gallinulinae**

145. GALLINULA Brisson, 1760

* 256. *Gallinula chloropus galeata* (Lichtenstein)

Gallineta, Polla de agua grande.

Crex galeata Lichtenstein, Verz. Säugeth. und Vög. Berliner Mus., 1818, p. 36. Paraguay.

Gallinula galeata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 197.

Distribución. — Isla Trinidad, Guayanas, Brasil (Bahía, Minas Geraes, Pará, Matto Grosso, São Paulo), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza).

* 257. *Gallinula chloropus garmani* Allen Gallineta, Polla de agua de las Sierras.

Gallinula garmani Allen, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 3, 1876, p. 357. Perú (Lago Titicaca).

Gallinula chloropus garmani Hellmayr, Field. Mus. Nat. Hist., Publ. 308, Zool. Series, Vol. 19, 1932, p. 361.

Distribución. — Perú, Bolivia, Chile (Tarapacá), Argentina (Jujuy).

146. IONORNIS Reichenbach, 1852

* 258. *Ionornis martinica* (Linné) Gallineta azulada, Polla sultana.

Fulica martinica Linne, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 259. Antillas (Isla Martinica).

Ionornis martinica Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — S. EE. UU., Méjico, Centro y Sudamérica; desde las Guayanás, Venezuela y Brasil, hasta Bolivia, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Tucumán, Buenos Aires).

- * 259. **Ionornis parva** (Boddaert) Gallineta azulada menor.

Fulica parva Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 54. Guayana Francesa (Cayena).
Ionornis parva Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — Brasil (Amazonas, Goyaz, Minas Geraes, Matto Grossos, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa).

Subfamilia **Fulicinae**

147. **FULICA** Linné, 1754

- * 260. **Fulica armillata** Vieillot Gallareta de escudete rojizo.

Fulica armillata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 12, 1817, p. 47. Paraguay.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — Brasil (São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Chile (Tarapacá hasta el Estrecho de Magallanes), Uruguay, Argentina (muy difundida, excepto los cordones montañosos; en las provincias norteñas, por todo el territorio hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- * 261. **Fulica leucoptera** Vieillot Gallareta de escudete verde y amarillo.

Fulica leucoptera Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 12, 1817, p. 48. Paraguay.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Chile (Tacna, hasta el Estrecho de Magallanes), Uruguay, Argentina (igual a la anterior, La Rioja, excepto las Islas Malvinas).

- * 262. **Fulica rufifrons** Philippi et Landbeck Gallareta de escudete grande rojizo.

Tulica (sic) *rufifrons* Philippi et Landbeck, An. Univ. Chile, Vol. 19, 1861, p. 507. Chile.

Fulica rufifrons Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — Brasil (São Paulo), Paraguay, Chile (Coquimbo hasta Arauco), Uruguay, Argentina (igual a la anterior, Islas Malvinas).

- * 263. **Fulica gigantea** Eydoux et Souleyet Gallareta gigantea.

Fulcia (sic) *gigantea* Eydoux et Souleyet, Voy. «La Bonite» Zool., Vol. 1, 1841, p. 102, Atlas, Ois., pl. 8. Perú.

Distribución. — Perú (Junín), Bolivia, Chile (Tarapacá, Tacna), Argentina? (Los Andes).

En el Museo Argentino existe un casal de esta especie que no ha sido mencionado. Fué cazado por el Sr. Emilio Budín en «Lago Taxara», Bolivia, 4000 ms. alt.

Es probable que se halle también en la región de la Puna del Noroeste Argentino.

- * 264. **Fulica cornuta** Bonaparte Gallareta cornuda, Choika.

Fulica cornuta Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. París, Vol. 37, 1853, p. 925. Bolivia (Potosí).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 198.

Distribución. — En los cordones montañosos (3000 a 5000 ms.); Bolivia (Oruro, Lago Titicaca), Chile (Antofagasta), Argentina (Tucumán, Salta).

* 265. **Fulica ardesiaca** Tschudi

Gallareta cenicienta.

Fulica ardesiaca Tschudi, Arch. f. Naturg., Vol. 9, Bds. 1, 1843, p. 389. Perú (Lago Junín).

Dabbene, El Hornero, Vol. 2, N° 4, 1922, p. 290.

Distribución. — En los cordones montañosos (3000 a 5000 ms.), Ecuador, Perú, Bolivia, Chile (Tarapacá, Antofagasta), Argentina (Los Andes).

SUBORDEN HELIORNITHES

Familia **Heliornithidae** (*Aves del sol*)148. **HELIORNIS** Bonnaterre, 1791* 266. **Heliornis fulica** (Boddaert)

Ave del sol, Picapara.

Columbus fulica Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 54. Guayana Francesa (Cayena).*Heliornis fulica* Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 256.

Distribución. — Centro América; N. Honduras a Panamá; Sud América; Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil (Matto Grosso, São Paulo), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones).

SUBORDEN CARIAMAE

Familia **Cariamidae** (*Chuñas*)149. **CARIAMA** Brisson, 1760* 267. **Cariama cristata** (Linné)

Chuña de patas rojas.

Palamedea cristata Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 232. Brasil.*Cariama cristata* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 223.

Distribución. — Brasil (Piauhí, Bahía, Minas Geraes, Paraná), Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina (Tucumán, Salta, Sgo. del Estero, Chaco, La Pampa).

150. **CHUNGA** Hartlaub, 1860* 268. **Chunga burmeisteri** (Hartlaub)

Chuña de patas negras.

Dicholophus burmeisteri Hartlaub, Proc. Zool. Soc. London, 1860, p. 335. Argentina (entre Tucumán y Catamarca).*Chunga burmeisteri* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 223.

Distribución. — Argentina (Sgo. del Estero, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Catamarca, La Pampa).

ORDEN CHARADRIIFORMES

SUBORDEN CHARADRII

Superfamilia **Jacanides**Familia **Jacanidae** (*Gallitos de agua*)151. **JACANA** Brisson, 1760* 269. **Jacana spinosa jacana** (Linné)

Gallito de agua, Jacana, Aguapeazó.

Parra jacana Linné, Syst. Nat., ed., 12, Vol. 1, 1766. Guayana Holandesa.*Jacana jacana* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 222.

Distribución. — Isla Trinidad; Sudamérica; Guayanas, Brasil (Maranhao, Pará, Minas Geraes, Matto Grosso, Río Grande do Sul), Bolivia (Santa Cruz, Potosí), Chile (Quillota, Valparaiso), Paraguay, Uruguay, Argentina (Mendoza, San Luis, Buenos Aires hasta las provincias nortefinas, Formosa, Misiones, Chaco).

Superfamilia **Charadridae**

Familia **Rostratulidae** (*Agachonas*)

152. **NYCTICRYPHES** Wetmore et Peters, 1923.

- * 270. **Nycticryphes semicollaris** (Vieillot) Agachona.

Totanus semi-collaris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 6, 1816, p. 402. Paraguay.
Rostratula semicollaris Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910,
p. 221.

Distribución. — Chile (Coquimbo, Arauco), Paraguay, Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Río Negro, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires, hasta Tucumán, Formosa, Misiones).

Familia **Haematopodidae** (*Ostreros*)

153. **HAEMATOPUS** Linné, 1758.

- * 271. **Haematopus ostralegus pitanay** Murphy Ostrero, Pitanay.

Haematopus ostralegus pitanay Murphy, Am. Mus. Nov., Nº 194, 1925, p. 1. Perú
(Bahía Pisco).

A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, Nº 2, 1936, p. 289.

Distribución. — Sud América; costa del Pacífico, Ecuador (Guayaquil) hasta Chile (Isla Chiloé), Argentina (Mendoza).

- * 272. **Haematopus ostralegus durnfordi** Sharpe Ostrero blanco.

Haematopus durnfordi Sharpe, Cat. Birds, Brit. Mus., Vol. 24, 1896, p. 107 (en clave),
p. 117, pl. 6. Argentina (Chubut, Boca del río Chubut).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 215.

Distribución. — Costa Oeste del Océano Atlántico Austral; Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz).

- * 273. **Haematopus leucopodus** Garnot Ostrero overo, Tero de mar.

Haematopus leucopodus Garnot, An. n. Sci. Nat., Vol. 7, 1826, p. 47. Argentina (Islas Malvinas).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 215.

Distribución. — Chile (Isla Chiloé, Arauco hasta el Archipiélago del Cabo de Hornos, Argentina (Islas Malvinas, de los Estados, Tierra del Fuego, Santa Cruz).

- * 274. **Haematopus ater** Vieillot et Oudart Ostrero negro.

Haematopus ater Vieillot et Oudart, Gal. Ois., Vol. 2, 1825, p. 88; Vol. 1, pl. 230. (Estrecho de Magallanes ?).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 215.

Distribución. — Costas Sudamericanas (desde la Lat. 10° S. al O° hasta 43° S. al E.) Perú, Chile (en toda su extensión), Argentina (Islas Malvinas, de los Estados, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut).

Familia Charadriidae (*Teros, Chorlos*)

Subfamilia Vanellinae

154. BELONOPTERUS Reichenbach, 1852

- * 275. **Belonopterus cayennensis lampronotus** (Wagler) Tero, Teru-Teru.

Charadrius Lampronotus Wagler, Syst. Av., sp. 48, Genus *Charadrius*, 1827. Brasil (S. E.).

Belonopterus cayennensis grisescens Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 2, 1918, p. 89.

Distribución. — Brasil (S. Amazonas, Bahía, Piauhí, Maranhão, Matto Grosso, São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa).

- * 276. **Belonopterus cayennensis occidentalis** (Harting) Tero del oeste.

Vanealus occidentalis Harting, Proc. Zool. Soc. London, 1874, p. 450. Chile (Patagonia y Argentina (Islas Malvinas).

Belonopterus chilensis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 216.

Distribución. — Chile (Atacama, hacia el S. hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Mendoza, San Juan, Chubut (Valle del Lago Blanco), Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

155. PTILOSCELYS Bonaparte, 1856

- * 277. **Ptiloscelys resplendens** (Tschudi) Tero serrano, Lico-lico.

Charadrius resplendens Tschudi, Arch. f. Naturg., Vol. 9, Bd. 1, 1843, p. 388. Perú (Región Andina).

Ptiloscelys resplendens Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 216.

Distribución. — Ecuador, Perú, Bolivia, N. Chile (Tarapacá, Antofagasta), Argentina, (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán).

156. HAPLOXYPTERUS Bonaparte, 1856

- * 278. **Haploxypterus cayanus** (Latham) Chorlo de espolón.

Charadrius cayanus Latham, Ind. Orn., Vol. 2, 1790, p. 749. Guayana Francesa (Cayena).

Haploxypterus cayanus Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 258.

Distribución. — S. Venezuela, Guayanás, Ecuador, E. Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil (Bahía, Minas Geraes, Amazonas, Goyaz, Matto Grosso, Paraná), (Uruguay), Argentina (Misiones, Chaco).

Subfamilia Charadriinae

157. CHARADRIUS Linné, 1758

- * 279. **Charadrius semipalmatus** Bonaparte Chorlo semipalmado, Batuira.

Charadrius semipalmatus Bonaparte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., Vol. 5, 1825, p. 98, E. E. U. U. (Nueva Jersey).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 124.

Distribución. — Costa Artica de Norte América; Canadá, E. E. U. U. Méjico, Grandes y Pequeñas Antillas (Santo Domingo, Haití; Trinidad), Archipiélago de las Galápagos, Centro y Sud América; por ambas Costas hasta Brasil (São Paulo, Santa Catharina), Chile (Coquimbo a Llanquihué), Argentina (Jujuy, Buenos Aires, Santa Cruz).

- * 280. **Charadrius falklandicus** Latham Chorlo de doble collar.

Charadrius falklandicus Latham, Ind. Orn., Vol. 2, 1790, p. 747. Argentina (Islas Malvinas).

Aegialitis falklandicus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 217.

Distribución. — Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos; Isla Hermite, Isla Chiloé, hasta Coquimbo, Antofagasta), Uruguay, Argentina (Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Catamarca).

- * 281. **Charadrius alticola** (Berlepsch et Stolzmann) Chorlo de las sierras.

Aegialitis alticola Berlepsch et Stolzmann, Proc. Zool. Soc. London, Vol. 2, 1902, p. 51. Perú (Junín, Ingapirca).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 260.

Distribución. — Perú, Bolivia (Oruro), Chile (Tarapacá, Antofagasta), Argentina (Catamarca, Salta, Jujuy).

- * 282. **Charadrius collaris collaris** Vieillot Chorlo de collar.

Charadrius collaris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 27, 1818, p. 136. Paraguay.

Aegialitis collaris Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 217.

Distribución. — Méjico, Nicaragua, Islas Trinidad, Tobago, Guayanás, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil (Bahía, Minas Geraes, Goyaz, Matto Grosso, Río de Janeiro, São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Bolivia (Caiza, Santa Cruz, Reyes), Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos).

158. PLUVIALIS Brisson, 1760

- * 283. **Pluvialis dominicus dominicus** (Müller) Chorlo pampa, Chorlo dorado.

Charadrius Dominicus Müller, Natursyst. Suppl., 1776, p. 116. Grandes Antillas (Santo Domingo).

Pluvialis dominicus dominicus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 115.

Distribución. — Costa Artica de Norte América; E. E. U. U., Méjico, Grandes y Pequeñas Antillas; Centro y Sud América, por ambas costas hasta Chile (Pro-

vincias centrales, Arauco, Isla La Mocha), N. Brasil y alcanzando tierra adentro en Bolivia (Santa Cruz, Potosí), S. Brasil (Río Grande do Sul, Paraná), Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Córdoba, Tucumán, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires).

159. *OREOPHOLUS* Jardine et Selby, 1835

- * 284. *Oreopholus ruficollis* (Wagler) Chorlo cabezón.

Charadrius ruficollis Wagler, Isis von Oken, Vol. 22, 1829, col. 653. Uruguay (Canelones).

Oreopholus ruficollis Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 215.

Distribución. — Ecuador, Perú, Bolivia (Potosí), Chile (Tarapacá al Estrecho de Magallanes), Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, hasta el Estrecho de Magallanes, Islas de los Estados, Malvinas).

160. *ZONIBYX* Reichenbach, 1852

- * 285. *Zonibyx modestus* (Lichtenstein) Chorlo de pecho rojo y negro.

Charadrius modestus Lichtenstein, Verz. Doubl. Berl. Mus., 1823, p. 71. Uruguay (Montevideo).

Zonibyx modestus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 217.

Distribución. — Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos, Estrecho de Magallanes hasta Arauco, Valparaíso, Atacama), Uruguay, Argentina (Islas Malvinas, de los Estados, Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba). .

161. *PLUVIANELLUS* G. R. Gray, 1846

- * 286. *Pluvianellus sociabilis* G. R. Gray Chorlo de Magallanes.

Pluvianellus sociabilis ? «Hombron et Jacquinot» G. R. Gray, Gen. Bds, Vol. 3, 1846, p. [549]. Estrecho de Magallanes ?

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 217.

Distribución. — Chile (Archipiélago del cabo de Hornos), Argentina (Tierra del Fuego, S. Santa Cruz, Islas Malvinas).

162. *PHEGORNIS* G. R. Gray, 1846

- * 287. *Phegornis mitchellii* (Fraser) Chorlo, Becasina de las ciénagas.

Leptopus (Leptodactylus) mitchellii Fraser, Proc. Zool. Soc. London, Vol. 12, 1844, p. 157, pl. 63. Chile (Región Andina).

Phegornis Mitchellii Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 221.

Distribución. — Zona de la Puna; Chile (Colchagua a Tarapacá), Bolivia, Perú (Junín), Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Mendoza, Chubut).

Subfamilia Arenariinae

163. APHRIZA Audubon, 1839

288. **Aphriza virgata** (Gmelin) Chorlito del Pacífico.

Tringa virgata Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 654. Alaska (Príncipe William Sound).

Aphriza virgata Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 125.

Distribución. — Región Artica de Norte América hasta Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos) por la costa del Pacífico, Argentina (N. Tierra del Fuego).

164. ARENARIA Brisson, 1760

289. **Arenaria interpres morinella** (Linné) Chorlito, Playero turco.

Tringa Morinella Linné, Syst. Nat., Vol. 1, 1766, p. 249. Europa y Norte América.

Arenaria interpres morinella Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, p. 128.

Distribución. — Región Artica de Norte América, Centro y Sud América, Grandes y Pequeñas Antillas (Cuba, Haití), por ambas costas hasta Chile y Argentina (Misiones, Buenos Aires, Santa Cruz, Islas Malvinas).

Familia Scolopacidae (*Becasinas, Batitúes, Chorlos*)

Subfamilia Scolopacinae

165. CAPELLA Frenzel, 1801

- * 290. **Capella paraguaiae paraguaiae** (Vieillot) Becasina común, Canastita.

Scolopax Paraguaiae Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 3, 1816, p. 356. Paraguay.

Gallinago brasiliensis brasiliensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 2, 1918, p. 91.

Distribución. — Sudamérica; Guayanás, Colombia, Brasil, hasta Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza).

- * 291. **Capella paraguaiae magellanica** (King) Becasina del Sur.

Scolopax Magellanicus King, Zool. Journ., Vol. 4, 1828, p. 93. Estrecho de Magallanes.

Gallinago paraguaiae Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 221.

Distribución. — Chile (Copiapó al Estrecho de Magallanes, Archipiélago del Cabo de Hornos), Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Neuquén, La Pampa hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- * 292. **Capella paraguaiae andina** (Taczanowski) Becasina serrana.

Gallinago andina Taczanowski, Proc. Zool. London, 1874, (1875), p. 561, Perú (Lago Junín).

Capella paraguaiae andina A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, N° 2, 1936, p. 289.

Distribución. — Región Andina; Perú, Bolivia, Chile, Argentina (Catamarca, Lago Colorado, 3.400 ms.).

293. **Capella undulata gigantea** (Temminck) Becasina real.

Scolopax gigantea «Natterer» Temminck, Pl. Col., livr. 68, pl. 403. Brasil.

Gallinago gigantea Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, Vol. 18, 1910, p. 221.

Distribución. — Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, accidentalmente más al Sur, Islas Malvinas).

294. **Capella stricklandii** (G. R. Gray) Becasina grande.

Scolopax stricklandii G. R. Gray, Zool. Voy. «Erebus» et «Terror» Bds., 1845, pl. 23. Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos).

Gallinago stricklandii Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Vol. 18, 1910, p. 221.

Gallinago nobilis Dabbene, Ibid, p. 221.

Distribución. — Chile (Valdivia al Archipiélago del Cabo de Hornos), Argentina (Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

Subfamilia Numeniinae

166. **Bartramia** Lesson, 1831

- * 295. **Bartramia longicauda** (Bechstein) Batitú, Batuitú, Gordillo.

Tringa longicauda Bechstein, in Latham, Allgem. Ueb. Vög., Vol. 4, pt. 2, 1812, p. 453. Norte América.

Bartramia longicauda Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 119.

Distribución. — Alaska, EE. UU. por el Océano Atlántico hasta Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, hasta Mendoza, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires).

167. **Phaeopus** Cuvier, 1817

- * 296. **Phaeopus borealis** (J. R. Forster) Chorlo polar.

Scolopax borealis J. R. Forster, Philos. Trans., Vol. 62, 1772, p. 411, 431. Canadá (Bahía de Hudson).

Mesoscolopax borealis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 125.

Distribución. — Alaska, por ambas costas hasta Chile (Tacna, Isla Chiloé), Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Bs. Aires, Entre Ríos, hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

297. **Phaeopus hudsonicus** (Latham) Chorlo, Perdiz de mar.

Numenius hudsonicus Latham, Ind. Orn., Vol. 2, 1790, p. 712. Canadá (Bahía de Hudson).

Phaeopus hudsonicus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 124.

Distribución. — Región Artica de Norte América, por ambas costas hasta Chile (Atacama a Llanquihue), Brasil, Uruguay, Argentina (Tierra del Fuego).

168. **Actitis** Illiger, 1811

- * 298. **Actitis macularia** (Linné) Chorlito, Playero manchado.

Tringa macularia Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1766, p. 249. EE. UU. (Pennsylvania).

Actitis macularia Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 260.

Distribución. — Alaska, Canadá, por ambas costas hasta Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay (?), Argentina (Tucumán, Buenos Aires).

169. TRINGA Linné, 1758

- * 299. **Tringa solitaria solitaria** Wilson Chorlito solitario.

Tringa solitaria Wilson, Am. Orn., 1813, Vol. 7, p. 53, pl. 58, fig. 3. EE. UU. (Pennsylvania, Pocomo).

Helodromas solitaria Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 219.

Distribución. — Región Artica de Norte América, por ambas costas hasta Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina (Chaco, Formosa, Oeste del Territorio hasta Río Negro).

- * 300. **Tringa solitaria cinnamomea** (Brewster) Chorlito, Zarapico solitario.

Totanus solitarius cinnamomea Brewster, Auk, 7, 1890, p. 377. Méjico (Baja California, San José del Cabo).

Tringa solitaria cinnamomea Laubmann, Vögel, Deutschen Gran Chaco. Expedition, 1930, p. 55.

Distribución. — Región Artica de Norte América, por ambas costas hasta Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires).

170. TOTANUS Bechstein, 1803

- * 301. **Totanus flavipes** (Gmelin) Chorlo menor de patas amarillas.

Scolopax flavipes Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 659. EE. UU. (Nueva York).

Neoglottis flavipes Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 109.

Distribución. — Alaska, Canadá, por ambas costas hasta Chile (Tarapacá al Estrecho de Magallanes), Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Salta, hasta Tierra del Fuego).

- * 302. **Totanus melanoleucus** (Gmelin) Chorlo mayor de patas amarillas,
Chorlo real, Caballero chillón.

Scolopax melanoleucus Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, pt. 2, 1789, p. 659. Canadá (Lábrador, Bahía Chateau).

Neoglottis melanoleucus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 109.

Distribución. — Alaska, Canadá, por ambas costas hasta Chile (Tarapacá al Estrecho de Magallanes), Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Misiones hasta el Estrecho de Magallanes).

171. GLOTTIS Koch, 1816

303. **Glottis nebularius** (Gunnerus) Chorlo boreal.

Scolopax nebularia Gunnerus, in Leem, Beskr. Finm. Lapper, 1767, p. 251. Europa. Noruega (Trondhjem).

Glottis nebularia Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, p. 125.

Distribución. — Europa (Noruega, Rusia, Mar Mediterráneo), Asia (Siberia, India, China, Japón), África; Australia; Isla Filipinas; Argentina (Buenos Aires).

Subfamilia Calidrinae

172. CALIDRIS Merrem, 1804

- * 304. **Calidris canutus rufus** (Wilson) Chorlo rojizo.

Tringa rufa Wilson, Am. Orn., Vol. 7, 1813, p. 43, pl. 57, fig. 5. EE. UU. (Nueva Jersey).

Calidris canutus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 120.

Distribución. — Groenlandia, Canadá, por ambas costas hasta Perú, Brasil, Argentina (Buenos Aires hasta Tierra del Fuego).

173. PISOBIA Billberg, 1828

- * 305. **Pisobia fuscicollis** (Vieillot) Chorlito, Carachilla, Chululú-i de rabadilla blanca.

Tringa fuscicollis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 34, 1819, p. 461: Paraguay.

Pisobia fuscicollis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, 1920, p. 113.

Distribución. — Costa Artica de Norte América, por ambas costas hasta Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile (Antofagasta hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- * 306. **Pisobia bairdii** (Coues) Chorlito unicolor, Pollito de mar, Sacha-pollito.

Actodromas (Actodromas) bairdii Coues, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1861, p. 194. Canadá (Lago Slave).

Pisobia bairdii Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 114.

Distribución. — Costa Artica; Siberia; Alaska, Groenlandia, por ambas costas hasta Chile (Tarapacá a Valdivia), Bolivia, Uruguay, Argentina (Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Misiones, hasta Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- * 307. **Pisobia melanotos** (Vieillot) Chorlito manchado.

Tringa melanotos Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 34, 1819, p. 462. Paraguay.

Pisobia maculata Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 112.

Distribución. — Costa Artica; Siberia; Canadá, por ambas costas hasta Paraguay (Médanos), Uruguay (Colonia), Brasil (Matto Grosso, São Paulo), Argentina (Jujuy, Formosa, Misiones, hasta Santa Cruz).

174. EROLIA Vieillot, 1816

308. **Erolia testacea** (Pallas) Chorlito errante.

Scolopax testacea Pallas, in Vroeg's Cat., 1764, Adumbr., p. 5. Europa (Holanda).

Erolia ferruginea Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 125.

Distribución. — Costa Artica de Europa, Asia, América, hasta Sudáfrica, Madagascar, India, Australia; Argentina (E. Patagonia ?).

175. MICROPALAMA Baird, 1858

* 309. **Micropalama himantopus** (Bonaparte)

Chorlito semipalmado de pico largo.

Tringa himantopus Bonaparte, Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y., Vol. 2, 1826, p. 157. EE. UU. (Nueva Jersey).*Micropalama himantopus* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 119.

Distribución. — Costa Artica de Norte América, Canadá, E. E. U. U., Méjico, Centro y Sudamérica; hasta Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Buenos Aires).

176. EREUNETES Illiger, 1811

* 310. **Ereunetes pusillus** (Linné)

Chorlito enano.

Tringa pusilla Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 252. Grandes Antillas (Santo Domingo).*Ereunetes pusillus* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 125.

Distribución. — Costa Artica de Norte América; por ambas costas hasta Chile (Isla La Mocha a Arauco), Argentina (Valle del Chubut).

177. TRYNGITES Cabanis, 1856

* 311. **Tryngites subruficollis** (Vieillot)

Chorlito rojizo.

Tringa subruficollis Vieillot, Nouv. Dict. Nat., Vol. 34, 1819, p. 465. Paraguay.
Tryngites subruficollis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 121.

Distribución. — Costa Artica de Norte América, por el interior y costa oriental hasta el Brasil, Uruguay (Montevideo), Argentina (Formosa, Córdoba, Buenos Aires, Misiones).

178. LIMOSA Brisson, 1760

* 312. **Limosa haemastica** (Linné)

Becasa de mar.

Scolopax haemastica Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 147. Canadá (Bahía de Hudson).*Limosa haemastica* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 122.

Distribución. — Región Artica de Norte América, por ambas costas hasta Chile (Taena al Estrecho de Magallanes), Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

179. CROCETHIA Billberg, 1828

* 313. **Crocethia alba** (Pallas)

Chorlo blanco, Arenero.

Tringa (alba) Pallas, in Vroeg, Cat. Rais. d'Ois., Adumbr., 1764, p. 7. Europa (Holanda).*Crocethia alba* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 121.

Distribución. — Costa Artica; Siberia, Inglaterra, Groenlandia, Alaska, Japón, China, Archipiélago Malayo, hasta Australia, Sudáfrica y Sudamérica, Chile

(Tarapacá hasta Isla Chiloé), Brasil, Uruguay, Argentina (Misiones, Buenos Aires, Chubut).

Familia Recurvirostridae (*Terros reales*)

180. HIMANTOPUS Brisson, 1760

- * 314. **Himantopus himantopus melanurus** Vieillot Tero real, Zancudo.

Himantopus melanurus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 10, 1814, p. 42. Paraguay.
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 218.

Distribución. — Perú, Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina (Misiones, Chaco, Jujuy, hasta San Juan, Córdoba, Buenos Aires).

181. RECURVIROSTRA Linné, 1758

- * 315. **Recurvirostra andina** Philippi et Landbeck Tero real andino de pico corvo.

Recurvirostra andina Philippi et Landbeck, An. Univ. Chile, Vol. 19, 1861, p. 618.
Chile (Tacna, Laguna Parinacota).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 218.

Distribución. — Perú, Bolivia (Oruro), Chile, Argentina (Catamarca, Salta, Jujuy).

Familia Phalaropodidae (*Chorlos palmados*)

182. PHALAROPUS Brisson, 1760

- * 316. **Phalaropus fulicarius** (Linné) Chorlo de mar.

Tringa fulicaria Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1, 1758, p. 148. Canadá (Bahía de Hudson).

Phalaropus fulicarius Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 124.

Distribución. — Costa Artica, Canadá, Groenlandia, hasta la costa del continente Africano y Sudamericano, Chile, Argentina (Patagonia, Buenos Aires, Chaco).

183. STEGANOPUS Vieillot, 1818

- * 317. **Steganopus tricolor** Vieillot Chorlo blanco nadador.

Steganopus tricolor Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 32, 1819, p. 136. Paraguay.
Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 123.

Distribución. — Canadá, por ambas costas hasta Chile (Coquimbo a la Isla Chiloé), Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Islas Malvinas).

184. LOBIPES Cuvier, 1817

- * 318. **Lobipes lobatus** (Linné) Chorlo de mar de pies palmados.

Tringa tobata (sic) Linné, Syst. Nat., ed. 10, Vol. 1758, p. 148. Canadá (Bahía de Hudson).

Lobipes lobatus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, N° 2, 1920, p. 125.

Distribución. — Costa Artica de Siberia, Península Escandinava, Groenlandia, hasta Nueva Guinea, Sud Africa y Sud América, Perú, Bolivia, Argentina (Buenos Aires).

Superfamilia **Thinocorides**Familia **Thinocoridae** (*Chorlos aperdizados, Agachonas, etc.*)185. **ATTAGIS** Lesson, 1830* 319. **Attagis gayi gayi** Lesson Chorlo, Perdiz de la Cordillera, Agachona, Colano.*Attagis Gayi* Lesson, Cent. Zool., 1830, p. 135, pl. 47. Chile (Santiago).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 213.

Distribución. — Chile (Tarapacá a Colchagua), Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, San Juan, hasta Santa Cruz).

* 320. **Attagis malouinus** (Boddaert) Chorlo, Perdiz de la Patagonia, Toshti.*Tetrao Malouinus* Boddaert, Table Pl. enlum. 1783, p. 13. Argentina (Islas Malvinas).*Attagis malouinus* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 213.

Distribución. — Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos), Argentina (S. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Isla de los Estados, Malvinas).

186. **THINOCORUS** Eschscholtz, 1829* 321. **Thinocorus orbignyianus orbignyianus** Lesson

Chorlo, Puecupucu, Guancho, Pocoi.

Tinochorus (sic) *Orbignyianus* Lesson, Cent. Zool., 1831, pp. 137-139, pl. 48, 49. Chile (Santiago).*Thinocorys Orbignyianus* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 214.

Distribución. — Relieve Andino; Chile (Taena a Colchagua), Argentina (Tucumán, hasta Tierra del Fuego).

* 322. **Thinocorus rumicivorus boliviensis** Lowe Chorlo, Agachona del Norte.*Thinocorus rumicivorus boliviensis* Lowe, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 41, 1921, p. 109. Bolivia (Potosí, Uyuni 3.660 mts.).

A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 6, N° 2, 1936, p. 290.

Distribución. — Bolivia (Potosí), Argentina (Jujuy).

* 323. **Thinocorus rumicivorus rumicivorus** Eschscholtz

Chorlo, Agachona.

Thinocorus rumicivorus Eschscholtz, Zool. Atlas, Heft 1, 1829, p. 2, pl. 2. Chile (Bahía Concepción).*Thinocorys rumicivorus* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 214.

Distribución. — Chile (Atacama a Llanquihué), Uruguay, Argentina (Santa Fé, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén hasta S. Chubut).

* 324. **Thinocorus rumicivorus patagonicus** Reichenow

Chorlo, Agachona del Sur.

Thinocorus rumicivorus patagonicus Reichenow, Journ. f. Orn., Vol. 68, 1920, p. 88. Argentina (S. Patagonia).

Thinocorys rumicivorus Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 214.

Distribución. — Argentina (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

SUPERFAMILIA CHIONIDES

Familia Chionididae (*Palomas de mar*)

187. *CHIONIS* J. R. Forster, 1788

* 325 *Chionis alba* (Gmelin) Chorlo gigante, Paloma de mar.

Vaginalis alba Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 705, pt. 2. Argentina (Islas Malvinas).

Chionis alba Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 213.

Distribución. — Océano Atlántico Austral, al Sur del Continente Americano; Argentina (Islas Malvinas, Tierra del Fuego, S. Santa Cruz).

SUBORDEN LARI

Familia Stercorariidae (*Skuas o gaviotas negras*)

188. *CATHARACTA* Brünnich, 1764

* 326. *Catharacta skua chilensis* (Bonaparte) Gaviota acanelada.

Stercorarius antarcticus b. chilensis Bonaparte, Conspl. Gen. Avium, Vol. 2, 1857, p. 207. Chile.

Catharacta chilensis Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 218.

Distribución. — Chile (Costas de Arica al Estrecho de Magallanes), Perú, Brasil (Río de Janeiro), Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Patagonia).

327. *Catharacta skua antarctica* (Lesson) Gaviota parda de las Malvinas.

Lestrus antarctica Lesson, Traité d'Orn., livr. 8, p. 619. Argentina (Islas Malvinas).

Catharacta skua antarctica Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 218.

Distribución. — Regiones subantárticas; Islas de Gough, Tristán da Cunha, Argentina (Islas Malvinas, costas de la Patagonia).

* 328. *Catharacta skua clarkei* Mathews Gaviota parda antártica.

Catharacta lönnbergi clarkei Mathews, Bds. Austr., Vol. 2, 1913, p. 494. South Orkney.

Catharacta skua clarkei Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 218.

Distribución. — Regiones antárticas, Islas Orcadas y Georgia del Sur, Chile (Archipiélago del Cabo de Hornos), Argentina (Tierra del Fuego ?).

329. *Catharacta skua maccormicki* (Saunders) Gaviota parda de las Orcadas.

Stercorarius maccormicki Saunders, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 3, 1893, p. 12. Isla Victoria Land (lat. 71° 14' S., long. 171° 15' W.), al S. del Cont. Americano; Mar de Weddell.

Catharacta Maccormicki Wilsoni Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 218.

Distribución. — Mar de Weddell, Islas Orcadas (Laurie).

189. STERCORARIUS Brisson, 1760

- * 330. **Stercorarius parasiticus** (Linné) Gaviota de rapiña

Larus parasiticus Linné, Syst. Nat., 10 th. ed., Vol. 1, 1758, p. 136. Costas de Suecia.

Stercorarius parasiticus parasiticus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 4, 1919, p. 219.

Distribución. — Costas del Continente Europeo (Suecia), Asiático (Siberia), hasta Australia y África (Cabo de Buena Esperanza), emigra en invierno hacia las costas Sudamericanas; Brasil (Río de Janeiro, Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (Valparaíso al Estrecho de Magallanes), Argentina (Costas de la Patagonía, Buenos Aires).

Familia **Laridae** (*Gaviotas comunes, gaviotines*)Subfamilia **Larinae**

190. LEUCOPHAEUS Bruch, 1853

- * 331. **Leucophaeus scoresbii** (Traill) Gaviota del Sur.

Larus scoresbii Traill, Mem. Wern. Soc., Vol. 4, 1823, p. 514. Islas Shetland del Sur.

Leucophaeus Scoresbii Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 2, 1918, p. 56.

Distribución. — Regiones Antárticas al S. del Cabo de Hornos, Chile (Isla Chiloé, Costas de Llanquihué al Estrecho de Magallanes), Argentina (Islas Malvinas, Costas de la Patagonia).

191. LARUS Linné, 1758

- * 332. **Larus belcheri** Vigors Gaviota de Simeón.

Larus Belcheri Vigors, Zool. Journ., Vol. 4, N° 15, 1829, p. 358.

Daguerre, EL HORNERO, Vol. 5, N° 2, 1933, p. 214.

Distribución. — Costas del Perú (Isla de Hormigas, Lorenzo, P. Callao), Chile (en toda su extensión; desde la Costa de Tacna al Estrecho de Magallanes), Argentina (Costa de la Patagonia hasta la Prov. de Buenos Aires).

- * 333. **Larus dominicanus dominicanus** Lichtenstein Gaviota cocinera.

Larus dominicanus Lichtenstein, Verz. Doubl., 1823, p. 82. Brasil (Costa Atlántica).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 2, 1918, p. 56.

Distribución. — Costas Sudamericanas; Brasil (Alagoas, Bahía, Espírito Santo, hasta Río Grande do Sul), Perú, Chile (Tacna al Estrecho de Magallanes), Uruguay, Argentina (Costas de la Patagonia, Buenos Aires, Islas Malvinas, y en el interior del territorio hasta los lagos andinos, La Pampa, Neuquén).

- * 334. **Larus cirrhocephalus cirrhocephalus** Vieillot Gaviota de capucho gris.

Larus cirrhocephalus (sic) Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 21, 1818, p. 502. Brasil.

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 2, 1918, p. 56.

Distribución. — Costas del Brasil (Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Buenos Aires, ríos Paraná, Uruguay, Paraguay hasta Mato Grosso, Chaco, Salta, Jujuy), llegando a las costas del Perú por Bolivia.

- * 335. **Larus serranus** Tschudi Gaviota serrana.

Larus serranus Tschudi, Arch. Naturg., Vol. 10, (1), 1844. Perú (Región de la Puna).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 2, 1918, p. 56.

Distribución. — Costas de Ecuador, Lagos Andinos del Perú, Bolivia, Chile (Región cordillerana de Antofagasta hasta Tarapacá), Argentina (Cumbres Calchaquies; Tucumán, Salta, Jujuy).

- * 336. **Larus ridibundus maculipennis** Lichtenstein Gaviota de capucho negro.

Larus maculipennis Lichtenstein, Verz. Doubl., Berliner Mus., 1823, p. 83. Uruguay (Montevideo).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 2, 1918, p. 56. *Larus glaucodes*, Ibid. p. 56.

Distribución. — Costa Atlántica; Brasil (Alagoas hasta Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Costas de Buenos Aires, Patagonia, Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén, atravezando los Andes hasta Chile (Tarapacá hasta el Estrecho de Magallanes).

Subfamilia Sterninae

192. PHAETUSA Wagler, 1832

- * 337. **Phaetusa simplex chloropoda** (Vieillot) Gaviotín, Atí.

Sterna chloropoda Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 32, 1819, p. 171. Paraguay.

Phaetusa chloropoda Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 136.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina (Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

193. GELOCHELIDON Brehm, 1830

- * 338. **Gelochelidon nilotica grönvoldi** Mathews Gaviotín de pico y patas negras.

Gelochelidon nilotica grönvoldi Mathews, Bds. Austr., Vol. 2, 1912, p. 331. América del Sur (Loc. reproducción).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 136.

Distribución. — Casi cosmopolita; Océanos y mares de Europa, Asia, África, Australia, América: en este continente se extiende en la costa oriental salvo en Centro América, Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé).

194. STERNA Linné, 1758

- * 339. **Sterna hirundinacea** Lesson Gaviotín, Golondrina de mar.

Sterna hirundinacea Lesson, Traité d'Orn., 1831, p. 621. Brasil (Costas de Santa Catharina).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 138.

Distribución. — Costas Sudamericanas; Brasil (Bahía, Río de Janeiro, Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (Archipiélago del cabo de Hornos, Magallanes, hasta Taena), Perú, Argentina (Buenos Aires, Patagonia Islas Malvinas).

- * 340. **Sterna paradisaea** Brünnich Gaviotín, Golondrina ártica.
Sterna paradisaea Brünnich, Prn. Bor., 1764, p. 46.
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 138.
 Distribución. — Casi cosmopolita; océanos y mares de Europa, Asia, N. Norte América, emigrando en invierno a ambas costas de Sudamérica hasta el Continente Antártico, Argentina.
- * 341. **Sterna vittata georgiae** Reichenow Gaviotín antártico.
Sterna vittata georgiae Reichenow, Orn. Monatsb., Vol. 12, N° 3, 1904, p. 47. Georgia del Sur.
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 138.
 Distribución. — Océano Índico (Isla Kerguelén, St. Paul), Islas Subantárticas de Nueva Zelanda, Océano Atlántico Austral (Isla de Tristán da Cunha, Cabo de Buena Esperanza, Santa Elena, Costa S. Brasil (Río de Janeiro Paraná, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Patagonia, Islas Malvinas).
- * 342. **Sterna trudeaui** Audubon Gaviotín común.
Sterna Trudeaui Audubon, Bds. Amer., fol. ed. 4, 1838, pl. 409, f. 2. EE. UU. (Nueva Jersey).
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 138.
 Distribución. — América del Sur, Costa de América del Sur; Brasil (Río de Janeiro, Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (Arica a Valdivia), accidentalmente en Norte América (Loc. típica), Argentina (Buenos Aires, N. Patagonia).
343. **Sterna fuscata fuscata** Linné Gaviotín de dorso negro.
Sterna fuscata Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 228. Centro América (Isla de Santo Domingo).
Onychoprion fuscatus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 138.
 Distribución. — Costas Americanas desde Norte América; Florida, Luisiana, Texas, Antillas, a América del Sur; en invierno; Brasil, Uruguay, Argentina (Patagonia, Islas Malvinas), O. Costa Africana.
- * 344. **Sterna superciliaris** Vieillot Gaviotín de cejas blancas.
Sterna superciliaris Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. 32, 1819, p. 176. Paraguay.
Sternula superciliaris Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 139.
 Distribución. — Estuarios y ríos de Sudamérica, desde el Orinoco al Plata, Amazonas, Paraguay, Paraná, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).
195. **THALASSEUS** Boie, 1822
- * 345. **Thalasseus maximus maximus** (Boddaert) Gaviotín real.
Sterna maxima Boddaert, Table Pl. enlum., 1783, p. 58, Guayana Francesa (Cayena).
Thalasseus maximus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 137.
 Distribución. — Costas australes de E. E. U. U. Méjico, Antillas, Sudamérica; Brasil, Venezuela, Perú, hasta Uruguay y Argentina (Costas de la Patagonia, hasta Chubut, Buenos Aires).

346. Thalasseus eurygnatha (Saunders) Gaviotín del Brasil.

Sterna eurygnatha Saunders, Proc. Zool. Soc. London, 1876, p. 654, f. 1. Brasil (Santa Catharina).

Thalasseus eurygnathus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 137.

Distribución. — Océano Atlántico; costas de Sudamérica; desde Venezuela hasta la Argentina (Buenos Aires, Río Negro, Chubut, N. Santa Cruz).

347. Thalasseus sandvicensis acuflavidus (Cabot) Gaviotín de Méjico.

Sterna acuflavida Cabot, Proc. Zool. Soc. Nat. Hist., Vol. 2, 1847 (1848). Méjico (Yucatán).

Thalasseus sandvicensis acuflavidus Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 137.

Distribución. — Océano Atlántico; Costas de Norte, Centro y Sudamérica, Antillas, Azores, hasta las costas de Europa; mares Negro, Caspio, Golfo de Persia, O. de las costas de África, Argentina (Buenos Aires).

Familia **Rynchopidae** (*Rayadores o pico tijeras*)

196. **RYNCHOPS** Linné, 1758

* **348. Rynchos nigra cinerascens** Spix Rayador de pico y alas cortas.

Rynchos cinerascens Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, p. 80, pl. 102. Brasil (Río Amazonas).

Rynchos nigra cinerascens Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 214.

Distribución. — Antillas, Sudamérica; Costas y ríos de las Guayanas, Brasil, Colombia, hasta Uruguay, Chile, N. E. Argentina.

* **349. Rynchos nigra intercedens** Saunders Rayador de pico y alas largas.

Rynchos intercedens Saunders, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 4, 1895, p. 26. Brasil (São Paulo).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, Nº 3, 1918, p. 214.

Distribución. — Costas del Brasil (Pará a Río Grande do Sul, Matto Grosso), Paraguay, Uruguay, Argentina (Córdoba, Tucumán, La Rioja, Sgo. del Estero, ríos Paraná, Uruguay, La Plata).

(Continuará)