

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Lista sistemática de las aves argentinas Zotta, A. R. 1938

Cita: Zotta, A. R. (1938) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 007 (01) : 089-124

## LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES ARGENTINAS

ELABORADA POR LA SECCIÓN ORNITOLÓGICA DEL MUSEO ARGENTINO  
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

(Continuación de la pág. 554, Vol. VI)

### ORDEN TROGONIFORMES

Familia Trogonidae (*Surucuás*)

275. TROGONORUS Bonaparte, 1854

- \* 477. *Trogonorus variegatus behni* (Gould) Surucuá de pecho púrpura.  
*Trogon behni* Gould, Monogr. Trogon, 2 ed., 1875, pl. 20. Bolivia.  
*Trogon variegatus behni*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 270.  
Distribución. — Brasil (Matto Grosso, São Paulo, Río Grande do Sul, Paraná), Paraguay, Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco).
- \* 478. *Trogonurus surrucura* (Vieillot) Surucuá.  
*Trogon surrucura* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 8, 1817, p. 321. Paraguay.  
*Trogon surucura* (sic), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 271.  
Distribución. — Brasil (Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes).
- \* 479. *Trogonurus rufus chrysochlorus* (Pelzeln) Surucuá anaranjado.  
*Trogon chrysochlorus* Pelzeln, Sitz. Ak. Wien, Vol. 20, 1856, pp. 496, 505, Brasil (São Paulo, Ipanema).  
*Trogon aurantius*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 271. Ibid, *Trogon rufus*, p. 423.  
Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

### ORDEN CORACIIFORMES

SUBORDEN ALCEDINES

Superfamilia Alcedinoidea

Familia Alcedinidae (*Martín-pescadores*)

Subfamilia Cerylinae

276. MEGACERYLE Kaup, 1848

- \* 480. *Megaceryle torquata torquata* (Linné) Martín pescador grande, Matraca.  
*Alcedo torquata* Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 180. Méjico.  
*Streptoceryle torquata cyanea*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, N° 3, 1918, p. 162.

Distribución. — Desde el N. Méjico, a través de Centro América y gran parte de Sud América, Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, Córdoba, Misiones, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fé).

- \* 481. **Megaceryle torquata stellata** (Meyen) Martín pescador grande del sur.

*Alcedo stellata* Meyen, Nov. Act. Acad. Leop. Carol. Nat. Cur., Vol. 16, Suppl. 1, 1834, pl. 14, p. 98. Chile (Prov. San Fernando, Río Clado).

*Ceryle torquata stellata*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 261.

Distribución. — Chile (Concepción, hacia el Estrecho de Magallanes), Argentina (Tierra del Fuego, Patagonia occidental).

#### 277. CHLOROCERYLE Kaup, 1848

- \* 482. **Chloroceryle amazona** (Latham) Martín pescador mediano.

*Alcedo amazona* Latham, Index Orn., Vol. 1, 179, O. p. 257. Guayana Francesa (Cayena).

*Ceryle amazona*, Dabbene An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 261.

Distribución. — Centro y Sud América en casi toda su extensión, Guayanas, Colombia, Venezuela, Bolivia (Chiquitos, San Luis), Brasil (Matto Grosso, Bahía, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Tucumán, Misiones, Chaco, La Rioja, Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires).

- \* 483. **Chloroceryle americana mathewsi** Laubmann Martín pescador chico.

*Chloroceryle americana mathewsi* Laubmann, Verh. Ornith. Ges. Bayern, Vol. 17, 1927, p. 126. Nombre nuevo para *Alcedo viridis* Vieillot, nec Meusch en, 1787.

*Chloroceryle americana* subsp.? Dabbene, EL HORNERO Vol. 1, N° 3, 1918, p. 161.

Distribución. — Paraguay, Bolivia (Yacuiba, Santa Cruz), Uruguay (Dolores, San José), Argentina (Chaco, Formosa, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires).

#### Superfamilia Momotoidea

#### Familia Momotidae (*Burgos, Jeruwas*)

#### 278. MOMOTUS Brisson, 1760

- \* 484. **Momotus momota pilcomajensis** Reichenow Hulú, Burgo.

*Momotus pilcomajensis* Reichenow, Journ. f. Orn., 1919 p. 334. Bolivia (Tarija, Villa Montes).

*Momotus momotus Nattereri*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 262.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, São Paulo, Río Grande do Sul), S. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy).

#### 279. BARYPTHENGUS Cabanis et Heine, 1859

- \* 485. **Barypthengus ruficapillus** (Vieillot) Jeruva.

*Baryphonus ruficapillus* Vieillot, Nouv. Diet. Hist. Nat., Vol. 21. 1818. p. 315; Id., Gal. des Ois., Vol. 2. 1825. p. 319, pl. 190. Brasil.

*Baryphthengus ruficapillus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 421.

Distribución. — Brasil (Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, SO. Bolivia, Argentina (Misiones).

ORDEN PICIFORMES

SUBORDEN GALBULAE

Superfamilia GALBULOIDEA

Familia Galbulidae (*Jacamaras*)

280. GALBULA Brisson, 1760

- \* 486. **Galbula rufo-viridis** Cabanis Jacamara, Guainumbi-guassu.

*Galbula rufo-viridis* Cabanis, in Ersch. u. Gruber, « Allg. Enc. Wiss. und Künste », 1851, p. 308. Brasil.

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 279.

Distribución. — Brasil (Amazonas, Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, São Paulo, Paraná, Santa Catharina, N. Río Grande do Sul), E. Bolivia, Argentina (Misiones).

Familia **Bucconidae** (*Durmilies, Chacurús*)

281. NOTHARCHUS Cabanis et Heine, 1863

- \* 487. **Notharchus swainsoni** (Gray et Mitchell) Juan del monte.

*Bucco swainsoni* Gray et Mitchell, Gen. Bds., Vol. 1, 1846, p. 74, pl. 26. Brasil.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 322.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

282. NYSTALUS Cabanis et Heine, 1863

- \* 488. **Nystalus maculatus striatipectus** (Selater) Durmilí.

*Bucco striatipectus* Selater, P. Z. S. London, 1853, p. 123. Bolivia.

*Bucco maculatus striatipectus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 279.

Distribución. — Bolivia, SE. Brasil (Matto Grosso), Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Chaco).

- \* 489. **Nystalus chacuru chacuru** (Vieillot) Chacurú, Surucú.

*Bucco chacuru* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 1816, p. 239. Paraguay.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, pp. 245, 322.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Bahía hasta São Paulo), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones).

283. NONNULA Selater, 1853

- \* 490. **Nonnula rubecula rubecula** (Spix) Macurú.

*Bucco rubecula* Spix, Av. Bras., Vol. 1, 1824, p. 51, pl. 39, fig. 1. SE. Brasil (Malhada).

*Nonnula rubecula*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 323.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

Superfamilia **RAMPHASTOIDEA**Familia **Ramphastidae** (*Tucanos*)284. **RAMPHASTOS** Linné, 1758

- \* 491. **Ramphastos toco albigularis** Cabanis Tucán grande, Alcatraz.  
*Ramphastos albigularis* Cabanis, Journ. f. Orn., Vol. 10, N° 59, 1862, p. 334. Paraguay.  
*Ramphastos toco*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 4, N° 3, 1929, pp. 269, 270.  
 Distribución. — Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 492. **Ramphastos discolorus** Linné Tucán rojo y amarillo.  
*Ramphastos discolorus*, Linné, Syst. Nat., ed. 12, 1766, p. 152. SE. Brasil.  
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 4, N° 3, 1929, pp. 269, 270.

Distribución. — S. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco).

285. **BAILLONIUS** Cassin, 1867

- \* 493. **Bailloniuss bailloni** (Vieillot) Aracari banana.  
*Ramphastos bailloni* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 34, 1819, p. 283. S. Brasil.  
*Bailloniuss bailloni*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 4, N° 3, 1929, pp. 269, 271.  
 Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

286. **PTEROGLOSSUS** Illiger, 1811

- \* 494. **Pteroglossus castanotis australis** Cassin Aracari.  
*Pteroglossus castanotis australis* Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1867, p. 112, Río Paraná.  
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 4, N° 3, 1929, pp. 266, 271.  
 Distribución. — Brasil (desde Paraná, São Paulo hasta Amazonas), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones).

SUBORDEN **PICI**Familia **PICIDAE** (*Carpinteros*)Subfamilia **PICINAE**287. **COLAPTES** Vigors, 1825

- \* 495. **Colaptes campestris** (Malherbe) Carpintero campestre.  
*Geopicos (Colaptes Swainson) campestris* Malherbe, Rev. Mag. Zool., 1849, p. 541. SE. Brasil.  
*Colaptes campestris*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 323.

Distribución. — Brasil, SE. Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Río Negro).

- \* 496. **Colaptes cinereicapillus** Reichenbach      Carpintero de cabeza cenicienta.  
*Colaptes cinereicapillus* Reichenbach, Hand. Spec. Orn., Vol. 6, 1854, p. 416, pl. 680, figs. 4489-4490. Perú (Guayabamba).  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 48.  
 Distribución. — Perú, Bolivia ?, Argentina (Jujuy, Volcán).
- \* 497. **Colaptes (rupicola?) puna** Cabanis      Carpintero de nuca colorada, Yaca.  
*Colaptes puna* Cabanis, Journ. f. Ornith., 1883, p. 98. SE. Perú.  
*Colaptes (rupicola?) puna*, A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 49.  
 Distribución. — S. Perú, W. Bolivia, Argentina (Tucumán).
- \* 498. **Colaptes rupicola rupicola** d'Orbigny      Carpintero de las piedras.  
*Colaptes rupicola* d'Orbigny, Voy. Amér. Mérid., Ois., 1847, pl. 62, fig. 1, publ. anterior 1844, ídem, p. 377, 1847. Bolivia (Sicasica).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 274.  
 Distribución. — S. Bolivia, Chile (Tarapacá), Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).
- \* 499 **Colaptes pitius (cachinnans?)** Wetmore et Peters      Carpintero overo, Pitío.  
*Colaptes pitius cachinnans* Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 35, 1922<sup>4</sup> p. 43. Argentina (Río Negro, lago Nahuel Huapi Bariloche).  
*Colaptes pitius*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 247.  
 Distribución. — Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, a lo largo de los Andes patagónicos).

## 288. TRIPSURUS Swainson, 1837

- \* 500. **Tripsurus flavifrons** (Vieillot)      Carpintero de frente amarilla.  
*Picus flavifrons* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 26, 1818, p. 75. Brasil.  
*Melanerpes flavifrons*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 427.  
 Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

## 289. LEUCONERPES Swainson, 1837

- \* 501. **Leuconerpes candidus** (Otto)      Carpintero blanco, Tura.  
*Picus candidus* Otto, Buffon's Naturg. Vögel, Vol. 23, 1796, p. 191. Guayana Francesa (Cayena).  
*Leuconerpes candidus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275.  
 Distribución. — Guayanas, Brasil (desde el NE. hasta Río Grande do Sul), Bolivia (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija), Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos).

## 290. PICULUS Spix, 1824

- \* 502. **Piculus chrysochloros chrysochloros** (Vieillot)      Carpintero verde dorado.  
*Piculus chrysochloros* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 26, 1818, p. 98. Paraguay.

*Chloronerpes chrysochlorus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275

*Chloronerpes aurulentus*, Dabbene Ibid., p. 275 en part, Formosa, Chaco.

Distribución. — Brasil (Ceará, Piahuí hasta São Paulo, por el oeste hasta Matto Grosso), Bolivia (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija), O. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco).

\* 503. **Piculus chrysochlorus aurulentus** (Temminck)

Carpintero verde dorado de Misiones.

*Picus aurulentus* Temminck, Pl. Coll. Vol. 4, 1823, pl. 59, fig. 1. Paraguay.

*Chloronerpes aurulentus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275.

Distribución. — SE. Brasil, E. Paraguay, Argentina (Misiones).

\* 504. **Piculus rubiginosus tucumanus** (Cabanis) Carpintero de frente colorada.

*Chloronepes tucumanus* Cabanis, Journ. f. Ornith., 1883, p. 103. Argentina (Tucumán).

*Chloronerpes rubiginosus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275.

Distribución. — Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).

291. **CHRYSOPTILUS** Swainson, 1831

\* 505. **Chrysoptilus melanolaimus leucofrenatus** (Leybold) Carpintero real.

*Colaptes leucofrenatus* Leybold, Leopoldina, Vol. 8, 1873, p. 53. Argentina (Mendoza).

*Chrysoptilus cristatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275.

*Chrysoptilus nigroviridis* Grant, Ibis, 1911, p. 321. Paraguay (W. río Pilcomayo).

*Chrysoptilus melanolaimus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 245.

Distribución. — S. Bolivia, S. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, N. Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza).

\* 506. **Chrysoptilus melanolaimus (perplexus?)** Cory Carpintero real del litoral.

*Chrysoptilus melanolaemus perplexus* Cory, Field. Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 203. Vol. 13, 1919, p. 442. Argentina (Buenos Aires, Conchitas).

*Chrysoptilus cristatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 275.

*Chrysoptilus melanolaimus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 245.

Distribución. — Uruguay, Argentina (Entre Ríos, Buenos Aires).

\* 507. **Chrysoptilus melanolaimus patagonicus** Laubmann Carpintero real del sur.

*Chrysoptilus melanolaimus patagonicus* Laubmann, Verh. Orn. Cres. Bay., Vol. 20, 1934, pp. 302-303. Argentina (Neuquén, Río Limay).

Distribución. — Argentina (Neuquén, La Pampa).

\* 508. **Chrysoptilus melanochlorus melanochlorus** (Gmelin) Carpintero real verde.

*Picus melanochlorus* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 427. Brasil (Río de Janeiro).

*Chrysoptilus cristatus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 245.

Distribución. — Brasil (Río de Janeiro, São Paulo, Espiritu Santo, Paraná, Río Grande do Sul), S. Paraguay, Argentina (Misiones).

## 292. CELEUS Boie, 1831

509. **Celeus flavescens flavescens** (Gmelin) Carpintero de copete amarillo.

*Picus flavescens* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 427. Brasil.

*Celeus flavescens*, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 324.

Distribución. Brasil (Minas Geraës, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná), E. Paraguay, Argentina (Misiones ?).

- \* 510. **Celeus lugubris kerri** Hargitt Carpintero de copete blanco.

*Celeus kerri* Hargitt, Ibis, 1891, p. 605. Paraguay (Río Pilcomayo, Fortín Donovan).

*Celeus Kerri*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 277.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Corrientes).

## 293. CEOPHLOEUS Cabanis, 1862

- \* 511. **Ceophloeus lineatus lineatus** (Linné) Carpintero listado.

*Picus lineatus* Linné, Syst. Nat., ed. 12, Vol. 1, 1766, p. 174. Guayana Francesa (Cayena).

*Ceophloeus lineatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 278.

Distribución. — Por toda Sudamérica hasta Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Salta).

- \* 512. **Ceophloeus erythroptus** (Valenciennes) Carpintero de ojo colorado.

*Picus erythroptus* Valenciennes, Dict. Sci. Nat., Vol. 40, 1826, p. 178. Brasil.

*Ceophloeus erythroptus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 278.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 513. **Ceophloeus galeatus** (Temminck) Carpintero copetón.

*Picus galeatus* Temminck, Pl. Col., 1823, p. 171. Brasil.

*Ceophloeus galeatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 278.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

## 294. NEOPHLOEOTOMUS Dabbene, 1915

- \* 514. **Neophloeotomus schulzi** (Cabanis) Carpintero cimarrón.

*Phloeotomus schulzi* Cabanis, Journ. f. Ornith., 1883, p. 102. Argentina (Córdoba).

*Neophloeotomus schulzi*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 27, 1915, p. 78.

*Neophloeotomus schulzi major* Dabbene, Physis, Vol. 2, 1916, pp. 167-169. Argentina (Chaco, Resistencia).

Distribución. — Argentina (Córdoba, Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco, Misiones).

- \* 515. **Neophloeotomus shiptoni** Dabbene Carpintero tucumano.

*Neophloeotomus shiptoni* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 27, 1915, p. 79, pl. 1, fig. 1-2. Argentina (Tucumán, Vivos).

Distribución. — Argentina (Tucumán).



## 295. PHLOEOCEASTES Cabanis, 1862

- \* 516. **Phloeoceastes leucopogon** (Valenciennes) Carpintero negro de copete colorado.

*Picus leucopogon* Valenciennes, Dict. Sci. Nat., Vol. 40, 1826, p. 178. Brasil.

*Campephilus leucopogon*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 277.

Distribución. — Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Catamarca, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos).

- \* 517. **Phloeoceastes melanoleucus albirostris** (Vieillot) Carpintero de pico blanco.

*Picus albirostris* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., Vol. 26, 1818, p. 69. Paraguay.

*Scapanus melanoleucus*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 3, N° 4, 1926, p. 391.

Distribución. — Bolivia (Santa Cruz), Paraguay (Puerto Pinasco), Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Salta).

- \* 518. **Phloeoceastes robustus percoccineus** (Bonaparte) Carpintero gigante.

*Dryocopus percoccineus* Bonaparte, Comp. Gen. Av., Vol. 1, 1850, p. 134. Argentina

(Buenos Aires, probablemente por error; quizás sea Argentina (Misiones).

*Campephilus robustus percoccineus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 324-325.

Distribución. — Brasil (Paraná), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

## 296. IPOCRANTOR Cabanis et Heine, 1863

- \* 519. **Ipcrantor magellanicus** (King) Carpintero de Patagonia.

*Picus magellanicus* King, Zool. Journ., Vol. 3, N° 11, 1827, p. 430. Estrecho de Magallanes (Puerto Famine).

*Ipcrantor magellanicus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 278.

Distribución. — Chile (Colchagua al Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego a través de los Andes patagónicos).

## 297. TRICHOPICUS Bonaparte, 1854

- \* 520. **Trichopicus cactorum** (d'Orbigny) Carpintero de los cardones.

*Picus cactorum* d'Orbigny, Voy. Amér. Mérid., Ois., Vol. 4, 1835-1844, p. 378, pl. 62, fig. 2. Bolivia (Mizque).

*Melanerpes cactorum*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 276.

Distribución. — SE. Bolivia, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy).

## 298. VENILIORNIS Bonaparte, 1854

521. **Veniliornis fumigata fumigata** (d'Orbigny) Carpintero obscuro.

*Picus fumigatus* d'Orbigny, Voy. Amér. Mérid., Ois., 1844, pl. 65, fig. 1; ídem, op. cit. 1847, p. 380. Bolivia (Yungas).

*Veniliornis fumigatus*, Dabbene (ex d'Orbigny), Physis, Vol. 1, 1914, p. 324. Corrientes = error.

*Veniliornis fumigata fumigata*, Zimmer, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 282, Vol. 17, N° 7, 1930, p. 310.

Distribución. — Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy).

\* 522. **Veniliornis passerinus** subsp. nov.? Carpintero verdón.

*Picus olivinus* Malherbe, Mém. Soc. Roy. Sci. Liège, Vol. 2, 1845, p. 67. Brasil (Matto Grosso, Cuyabá).

*Veniliornis olivinus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 277.

Distribución. — S. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco Santa Fé) (1).

\* 523. **Veniliornis passerinus frontalis** (Cabanis) Carpintero, Biro.

*Chloronerypes (Campias) frontalis* Cabanis, Journ. f. Ornith., 1883, p. 110. Argentina (Tucumán).

*Veniliornis frontalis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 277.

Distribución. — Argentina (Jujuy, Tucumán, Chaco).

\* 524. **Veniliornis spilogaster** (Wagler) Carpintero manchado.

*Picus spilogaster* Wagler, Syst. Av., 1827, p. 33. Brasil y Paraguay.

*Veniliornis spilogaster*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 277.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).

#### 299. **DYCTIOPICUS** Bonaparte, 1854

\* 525. **Dyctiopicus mixtus mixtus** (Boddaert) Carpintero chico del litoral.

*Picus mixtus* Boddaert, Tabl. Pl. Enl., 1783, p. 47. Argentina (Buenos Aires, Ensenada) según Hellmayr.

*Dendrocopus mixtus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 276.

Distribución. — Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos).

\* 526. **Dyctiopicus mixtus malleator** Wetmore Carpintero chico del norte.

*Dyctiopus mixtus malleator* Wetmore, Journ. Wash. Acad. Sci., Vol. 12, 1922, p. 326. Argentina (Chaco, Las Palmas).

*Dendrocopus mixtus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 276.

Distribución. — Bolivia (Tarija), Paraguay (Puerto Pinasco), Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Santiago del Estero).

\* 527. **Dyctiopicus mixtus berlepschi** (Hellmayr) Carpintero chico del sur.

*Dryobates mixtus berlepschi* Hellmayr, Verh. Orn. Ges. Bayern, Vol. 12, 1915, p. 112. Argentina (Neuquén, Mangrullo).

*Dendrocopus mixtus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 276.

Distribución. — Argentina (Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis).

(1) Ver, Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 50.

- \* 528. **Dyctiopicus lignarius** (Molina) Carpintero chileno.  
*Picus Lignarius* Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, pp. 236, 343. Chile.  
*Dendrocopus lignarius*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 276.  
 Distribución. — Chile (Coquimbo al Estrecho de Magallanes), Argentina (Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Rioja).

Subfamilia **Picumninae**300. **PICUMNUS** Temminck, 1825

- \* 529. **Picumnus cirratus pilcomayensis** (Hargitt) Carpintero enano.  
*Picumnus pilcomayensis* Hargitt, Ibis, 1891, p. 606. Argentina (río Pilcomayo).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 279.  
*Picumnus cirratus* (sic), Ibid. p. 278.  
 Distribución. — Brasil (Matto grosso), Bolivia (Tarija), Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, N. Santa Fé, Tucumán, N. Corrientes, Sgo. del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy).
- \* 530. **Picumnus temminckii** Lafresnaye Carpinterito pardo.  
*Picumnus temminckii* Lafresnaye, Rev. Zool., 1845, pp. 6. Paraguay.  
 Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 325.  
 Distribución. — SE. Brasil, E. Paraguay, Argentina (Misiones).
531. **Picumnus d'orbignyianus** Lafresnaye Carpinterito salteño.  
*Picumnus d'orbignyianus* Lafresnaye, Rev. Zool., 1845, p. 7. Bolivia.  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 279.  
 Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta).
- \* 532. **Picumnus jelskii** Taczanowski Carpinterito jaspeado.  
*Picumnus jelskii* Taczanowski, Proc. Zool. Soc. Lond. 1882, p. 41, pl. 11, fig. 3. Perú (Chanchamayo).  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 51.  
 Distribución. — Perú, Bolivia?, Argentina (Salta).

ORDEN **PASSERIFORMES**SUBORDEN **Tyranni**Superfamilia **Furnarioidea**Familia **Dendrocolaptidae** (*Trepadores, Picapalos*)301. **DENDROCOLAPTES** Hermann, 1804

- \* 533. **Dendrocolaptes platyrostris platyrostris** Spix Arapassú.  
*Dendrocolaptes platyrostris* Spix, Av. Bras., Vol. 1, 1824, p. 87, pl. 89. Brasil (Río de Janeiro).  
*Dendrocolaptes picumnus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 335.  
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco).

- \* 534. **Dendrocolaptes picumnus pallescens** Pelzeln Tarefero, Ipecú.  
*Dendrocolaptes pallescens* Pelzeln, Orn. Bras., Vol. 1, 1868, p. 43, 61. Brasil (Matto Grosso, Engenho do Gama, Estiva).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 308.  
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, N. Paraguay (<sup>1</sup>), Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

## 302. XIPHOCOLAPTES Lesson, 1840

- \* 535. **Xiphocolaptes albicollis albicollis** (Vieillot) Trepador de cuello blanco.  
*Dendrocopus albicollis* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 117. Brasil (Río de Janeiro).  
*Xiphocolaptes albicollis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 305.  
*Xiphocolaptes argentinus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 334.  
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, Espírito Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes).
- \* 536. **Xiphocolaptes major major** (Vieillot) Trepador grande del Chaco.  
*Dendrocopus major* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 118. Paraguay.  
*Xiphocolaptes major*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 306.  
 Distribución. — Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, Córdoba, Santa Fé).

- \* 537. **Xiphocolaptes major castaneus** Ridgway Trepador grande de Salta.  
*Xiphocolaptes major castaneus* Ridgway, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 12, 1890, p. 16. Bolivia (Piedra Blanca).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 23, 1912, p. 318.  
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta).

## 303. LEPIDOCOLAPTES Reichenbach, 1853

- \* 538. **Lepidocolaptes squamatus falcinellus** (Cabanis et Heine) Trepador manchado.  
*Thripobrotus falcinellus* Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 38. Brasil (São Paulo).  
*Picolaptes falcinellus*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 266.  
 Distribución. — Brasil (São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).
- \* 539. **Lepidocolaptes fuscus fuscus** (Vieillot) Trepador oscuro.  
*Dendrocopus fuscus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 117. Brasil (Río de Janeiro).  
*Picolaptes fuscus koenigswaldianus*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 265.

(<sup>1</sup>) Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 64.

Distribución. — Brasil (Minas Geraés, Espíritu Santo, hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

\* 540. **Lepidocolaptes angustirostris praedatus** (Cherrie) Trepador del litoral.

*Picolaptes angustirostris praedatus* Cherrie, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. 35, 1916, p. 187. Argentina (Entre Ríos, Concepción del Uruguay).

*Picolaptes angustirostris angustirostris*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 307.

Distribución. — Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, E. Córdoba, Buenos Aires, San Luis, La Pampa).

\* 541. **Lepidocolaptes angustirostris chacoensis** Laubmann Trepador del Norte.

*Lepidocolaptes angustirostris chacoensis* Laubmann, Verh. Orn. Ges. Bay., Vol. 20, Part. 4, 1935, pp. 601-2. Argentina (Formosa, San José).

*Picolaptes angustirostris angustirostris*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 307.

Distribución. — S. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Santa Fé, W. Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza).

304. **CAMPYLORHAMPHUS** Berton, 1901

\* 542. **Campylorhamphus falcularius** (Vieillot) Picapalo de pico corto.

*Dendrocopus falcularius* Vieillot, Tabl. enc. méth., Vol. 2, livr. 91, 1822, p. 626. Brasil, (Río de Janeiro).

*Campylorhamphus falcularius*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 335.

Distribución. — Brasil (Minas Geraés, Espíritu Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

\* 543. **Campylorhamphus trochilirostris hellmayri** Laubmann

Picapalo de pico largo.

*Campylorhamphus trochilirostris hellmayri* Laubmann, « Vögel. », Gran Chaco Exped. 1930, p. 198. Argentina (Chaco, P. Bermejo).

*Xiphornis Lafresnayanus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 308.

Distribución. — S. Paraguay, Argentina (Salta, La Rioja, Tucumán, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos).

305. **DRYMORNIS** Eyton, 1852

\* 544. **Drymornis bridgesii** (Eyton)

Chincheró.

*Nasica bridgesii* Eyton, Contrib. Ornith., Vol. 2, 1849, p. 130, pl. 38. Argentina (Mendoza).

*Drymornis bridgesi*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 307, 431.

*Drymornis bridgesi meridionalis* Sztolcman, An. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., T. 5, 1926, p. 223. Argentina (La Pampa, Gral. Acha).

Distribución. — Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Tucumán, Sgo. del Estero, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Buenos Aires).

## 306. SITTASOMUS Swainson, 1827

- \* 545. **Sittasomus griseicapillus sylviellus** (Temminck) Verdón de Misiones.  
*Dendrocolaptes sylviellus* Temminck, Rec. Pl. col., livr. 12, 1821, pl. 72, fig. 1. Brasil (Río de Janeiro).  
*Sittasomus sylviellus sylviellus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 305.  
 Distribución. — Brasil (Goyaz, Minas Geraës hasta Río Grande do Sul), S. E. Paraguay, Argentina (Misiones).
- \* 546. **Sittasomus griseicapillus griseicapillus** (Vieillot) Verdón del Norte.  
*Dendrocopus griseicapillus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 119. Paraguay (Concepción del Paraguay).  
*Sittasomus sylviellus chapadensis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 305.  
 Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco y N. Santa Fé).

## 307. DENDROCINCLA Gray, 1840

- \* 547. **Dendrocinclá turdina enalincia** Oberholser Falso-zorzal.  
*Dendrocinclá enalincia* Oberholser, Proc. Ac. N. Sci. Phila., Vol. 56, 1904, p. 454. Brasil (São Paulo, Baurú).  
 Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 334.  
 Distribución. — S. Brasil (Goyaz, Espíritu Santo hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia **Furnariidae** (*Camineras, horneros, trepadores, etc.*).

Subfamilia **Furnariinae**

## 308. GEOSITTA Swainson, 1837

- \* 548. **Geositta cunicularia cunicularia** (Vieillot) Caminera del Este.  
*Alauda cunicularia* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 1, 1816, p. 369. Argentina (Prov. Buenos Aires).  
*Geositta cunicularia cunicularia*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 117.  
 Distribución. — SE. Brasil, Uruguay, E. Argentina (Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Buenos Aires hasta Tierra del Fuego).
- \* 549. **Geositta cunicularia hellmayri** Peters Caminera del Sur.  
*Geositta cunicularia hellmayri* Peters, Occas. Pap. Boston Soc. Nat. Hist., Vol. 5, 1925, p. 145. Argentina (Río Negro, Huanuluan).  
*Geositta cunicularia Frobeni*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, p. 1919, p. 123.  
 Distribución. — W. Argentina (San Juan, Mendoza hasta el N. de Chubut, a través de la región andina).

- \* 550. **Geositta cunicularia frobeni** (Philippi et Landbeck) Caminera del Norte.  
*Certhilauda Frobeni* Philippi et Landbeck, Anal. Univ. Chile, Vol. 25, Part. 2, 1864, p. 411. Chile (Tacna, Putre).  
*Geositta cunicularia Frobeni* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 123.  
 Distribución. — S. Perú, N. Chile, Bolivia (La Paz, Oruro, Cochabamba), Argentina (Jujuy, Tucumán ?).
- \* 551. **Geositta punensis** Dabbene Caminera de la Puna.  
*Geositta punensis* Dabbene, Physis, Vol. 3, 1917, p. 54. Argentina (Jujuy, La Quiaca).  
 Distribución. — Chile (Tacna hasta Atacama), Argentina (Jujuy, Salta, Los Andes, Catamarca).
- \* 552. **Geositta antarctica** Landbeck Caminera antártica.  
*Geositta antarctica* Landbeck, Arch. Naturg., Vol. 46, 1880, p. 274, pl. 12. Argentina (Tierra del Fuego).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 127.  
 Distribución. — Chile, W. Argentina (Tierra del Fuego, Santa Cruz hasta Mendoza).
- \* 553. **Geositta isabellina** (Philippi et Landbeck) Caminera negra.  
*Certhilauda isabellina* Philippi et Landbeck, Anal. Univ. Chile, Vol. 25, Part. 2, 1864, p. 412. Chile (Santiago, Valle Largo y Los Pinquenes).  
*Geositta isabellina* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 130.  
 Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Colchagua), Argentina (Mendoza, Catamarca, Jujuy).
- \* 554. **Geositta rufipennis rufipennis** (Burmeister) Sombreroero.  
*Geobamon rufipennis* Burmeister, Journ. f. Ornith., Vol. 8, 1860, p. 249. Argentina (Tucumán ?).  
*Geositta rufipennis Burmeisteri* Dabbene, Physis, Vol. 3, 1917, p. 55.  
 Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta, Los Andes, Catamarca, Tucumán).
- \* 555. **Geositta rufipennis** subsp.? Sombreroero de Patagonia.  
*Geositta rufipennis rufipennis* (no de Burmeister) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 132. Argentina, Chubut (Leleque).  
 Distribución. — W. Argentina (Chubut, Río Negro).
- \* 556. **Geositta rufipennis fasciata** (Philippi et Landbeck) Quesero.  
*Geibamon fasciatus* Philippi et Landbeck, Anal. Univ. Chile, Vol. 25, Part 2, 1864, p. 415. Chile (Santiago y Colchagua).  
*Geositta rufipennis* Reed, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 270.  
 Distribución. — Chile (Atacama hasta Colchagua y Curico), Bolivia (Oruro), Argentina (Mendoza).
- \* 557. **Geositta tenuirostris** (Lafresnaye) Agachadera de pico largo.  
*Alauda tenuirostris* Lafresnaye, Mag. Zool., Vol. 6, cl. 2, 1836, p. 7. Bolivia (Sicasica).

*Geositta tenuirostris* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 144.

Distribución. — S. Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).

309. FURNARIUS Vieillot, 1816

- \* 558. **Furnarius rufus rufus** (Gmelin) Hornero.

*Merops rufus* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1788, p. 465. Argentina (Buenos Aires).

*Furnarius rufus rufus* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 167.

Distribución. — SE. Brasil (Paraná, Santa Catharina, Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, N. La Pampa).

- \* 559. **Furnarius rufus paraguayae** Cherrie et Reichenberger Hornero del Chaco.

*Furnarius rufus paraguayae* Cherrie et Reichenberger, Amer. Mus. Novit., Vol. 27, 1921, p. 5. Paraguay (Puerto Pinasco).

*Furnarius rufus badius*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 288.

Distribución. — S. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del Estero).

- \* 560. **Furnarius cristatus** Burmeister Hornerito de copete.

*Furnarius cristatus* Burmeister, Ibis, Vol. 6, 1888, p. 495. (Nuevo nombre para *Furnarius tricolor* (no de Geibel 1868) Sclater et Hudson, Arg. Orn., Vol. 1, 1888, p. 170. Argentina (Córdoba).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 288.

Distribución. — Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, La Rioja, Córdoba y ocasionalmente en Entre Ríos).

310. CORYPHISTERA Burmeister, 1860

- \* 561. **Coryphistera alaudina alaudina** Burmeister Crestudo.

*Coryphistera alaudina* Burmeister, Journ. f. Ornith., Vol. 8, 1860, p. 251. Argentina. Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 299.

Distribución. — S. Bolivia?, Uruguay?, Argentina (Salta?, Tucumán, Formosa, Chaco hasta Entre Ríos, La Pampa, Mendoza).

311. CLIBANORNIS Sclater et Salvin, 1873

- \* 562. **Clibanornis dendrocolaptoides** (Pelzeln) Encuruchado.

*Anabates dendrocolaptoides* Pelzeln, Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien, math. naturw. Kl., Vol. 34, 1859, p. 104, 128. Brasil, Paraná (Curytiba, Villa de Castro).

*Clibanornis dendrocolaptoides* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1917, p. 37.

Distribución. — S. E. Brasil (São Paulo, Paraná), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

312. CINCLODES Gray, 1840

563. **Cinclodes antarcticus antarcticus** (Garnot) Piloto negro de Malvinas.

*Certhia antarctica* Garnot, Ann. Sci. Nat., Vol. 7, 1826, p. 45. Argentina (Islas Malvinas).



- Cinclodes antarcticus antarcticus* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 187.  
Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).
- \* 564. **Cinclodes antarcticus maculirostris** Dabbene      Piloto negro del Cabo de Hornos.  
*Cinclodes antarcticus maculirostris* Dabbene, Physis, Vol. 3, 1917, p. 59. Chile (Isla Hermite).  
A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 52.  
Distribución. — Chile (Islas del sud del Cabo de Hornos), Argentina (Isla de los Estados ? y Año Nuevo).
- \* 565. **Cinclodes patagonicus patagonicus** (Gmelin)      Piloto rayado.  
*Motacilla patagonica* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 957. Argentina (Tierra del Fuego).  
*Cinclodes rupestris* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 177.  
*Cinclodes patagonicus* Debbene, Ibid. p. 174.  
Distribución. — Chile (Tierra del Fuego e Islas del sud del Cabo de Hornos), Argentina (W. de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Isla de los Estados).
- \* 566. **Cinclodes patagonicus chilensis** (Lesson)      Remolinera.  
*Furnarius chilensis* Lesson, Man. d'Orn., Vol. 2, 1828, p. 17. Chile (Concepción).  
*Cinclodes rupestris* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 177.  
Distribución. — Chila (Aconcagua hasta Magallanes), W. Argentina (Mendoza, hasta Santa Cruz a través de la región andina).
- \* 567. **Cinclodes oustaleti oustaleti** Scott      Churrete.  
*Cinclodes oustaleti* Scott, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 10, 1900, p. 62. Chile (Valparaíso).  
*Cinclodes oustaleti oustaleti* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 183.  
Distribución: — Chile (Antofagasta hasta Chiloé), Argentina (Mendoza).
- \* 568. **Cinclodes oustaleti hornensis** Dabbene      Churrete del Sur.  
*Cinclodes oustaleti hornensis* Dabbene, Physis, Vol. 3, N° 13, 1917, p. 58. Chile (Isla Hermite).  
*Cinclodes oustaleti hornensis* Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 53.  
Distribución. — Chile (Islas del Cabo de Hornos), Argentina (Tierra del Fuego).
- \* 569. **Cinclodes fuscus fuscus** (Vieillot)      Meneacola.  
*Anthus fuscus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 490. Paraguay?.  
*Cinclodes fuscus fuscus* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 152.  
Distribución. — SE. Brasil, Uruguay, Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (desde Tucumán, Córdoba, Buenos Aires hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).

- \* 570. **Cinclodes fuscus albiventris** (Philippi et Landbeck) Kachirinquí.  
*Upucerthia albiventris* Philippi et Landbeck, An. Univ. Chile, Vol. 18, 1861, p. 731, Chile (Arica).  
*Cinclodes fuscus tucumanus* Chapman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., Vol. 41, 1919, p. 326. Argentina (Tucumán, Tafí del Valle).  
*Cinclodes fuscus rivularis* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 161.  
 Distribución. — Chile (Taena hasta Antofagasta), WS. Bolivia, Argentina (en las cumbres de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja).
- \* 571. **Cinclodes atacamensis atacamensis** (Philippi) Bandurrita de Atacama.  
*Upucerthia atacamensis* Philippi, Arch. Naturg., Vol. 23, 1857, p. 263. Chile (Atacama).  
*Cinclodes atacamensis* (subsp.?) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 169. parte, Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza.  
 Distribución. — Perú, Bolivia, Chile (Taena, Tarapacá, Antofagasta), Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Córdoba).
572. **Cinclodes atacamensis schocolatinus** Reichenow Bandurrita de Córdoba.  
*Cinclodes schocolatinus* Reichenow, Journ. f. Ornith., Vol. 68, 1920, p. 238. Argentina (Córdoba, Cuesta Copina).  
*Cinclodes atacamensis* (subsp.?) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 30, 1919, p. 169. parte, Córdoba, Sierra de Achala.  
 Distribución. — Argentina (Córdoba).
313. **UPUCERTHIA** Geoffroy Saint-Hilaire, 1832
- \* 573. **Upucerthia dumetaria dumetaria** Geoffroy Saint-Hilaire Bandurrita común.  
*Upucerthia dumetaria* Geoffroy Saint-Hilaire, Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. París, Vol. 1, 1832, p. 394. Argentina (Río Negro).  
*Upucerthia dumetaria* (sic), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 289.  
*Upucerthia propinqua* Dabbene, Ibid p. 289.  
 Distribución. — Argentina (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, por la Patagonia hasta Tierra del Fuego).
- \* 574. **Upucerthia dumetaria hypoleuca** Reichenbach Adivino.  
*Upucerthia hypoleuca* Reichenbach, Handb. Spez. Orn., Scansoriae, H. Sittinae, Livr. 4, 1853, p. 214, pl. 2566 [607, fig. 4072]. Chile.  
*Upucerthia Darwini* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 289.  
*Upucerthia Fitzgeraldi* Dabbene, Ibid p. 289.  
 Distribución. — Chile (Cochagua hasta Aconcagua), Argentina (Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Sgo. del Estero?).
- \* 575. **Upucerthia dumetaria hallinani** Chapman Bandurrita de los cerros.  
*Upucerthia dumetaria hallinani* (sic) Chapman, Bull. Amer. Mus. N. H., Vol. 41, 1919, p. 324. Chile (Coquimbo).  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 53.  
 Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Antofagasta), Argentina (Los Andes, Jujuy).

- \* 576. **Upucerthia (dumetaria?) saturatior** Scott Bandurrita negra.  
*Upucerthia saturatior* Scott, Bull. B. O. Cl., Vol. 10, 1900, p. 63. Chile.  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 54.  
 Distribución. — Chile (Valparaíso, Santiago hasta Cantirí), Argentina (Neuquén, Chubut).
- \* 577. **Upucerthia validirostris validirostris** (Burmeister) Bandurrita del suelo.  
*Ochetorhynchus validirostris* Burmesiter, Reise La Plata St., Vol. 2, 1861, p. 464. Argentina (Mendoza).  
*Upucerthia validirostris*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 289.  
*Upucerthia dabbenei* Chapman, Bull. Amer. Mus. N. 12, Vol. 41, 1919, p. 325. Argentina (Tucumán, Tafi Viejo).  
 Distribución. — Argentina (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, W. Córdoba ?).
- \* 578. **Upucerthia validirostris pallida** Taczanowski Bandurrita blancuzca.  
*Upucerthia pallida* Taczanowski, P. Z. S. Lond., 1883, p. 71. Perú (Junín).  
*Upucerthia validirostris pallida*, A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 56.  
 Distribución. — Perú (Cuzco, Puno, Ayacucho), Bolivia (Oruro, La Paz, Potosí), Chile (Tacna, Tarapacá), Argentina (Los Andes).
- \* 579. **Upucerthia andaecola** Lafresnaye et d'Orbigny Bandurrita de las piedras.  
*Upucerthia andaecola* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 8, 1838<sup>c</sup> cl. 2, p. 21. Bolivia (La Paz, Sicasica).  
*Upucerthia serrana*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 329.  
 Distribución. — Bolivia (La Paz, Cochabamba), Argentina (Jujuy, Catamarca).
- \* 580. **Upucerthia ruficauda** (Meyen) Bandurrita de cola castaña.  
*Ochetorhynchus ruficaudus* Meyen, Nov. Act. Acad. Leop. Carol., Vol. 16, 1834, pl. 11, p. 81. Chile (Santiago, Volcán Maipú).  
*Upucerthia ruficauda*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, pp. 289, 429.  
*Upucerthia Baeri*, Dabbene, Ibid, p. 289.  
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, Chile (Tacna hasta Santiago), Argentina (Tucumán, Catamarca, Mendoza hasta Chubut).
- \* 581. **Upucerthia certhioides certhioides** (Lafresnaye et d'Orbigny) Bandurrita enana.  
*Anabates certhioides* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 2, in Mag. Zool., Vol. 8, 1838, cl. 2, p. 15. Argentina (Corrientes).  
*Upucerthia lusciniá*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 289.  
 Distribución. — Argentina (Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos).
- \* 582. **Upucerthia certhioides lusciniá** (Burmeister) Ruiseñor.  
*Ochetorhynchus lusciniá* Burmeister, Journ. f. Ornith, Vol. 8, 1860, p. 249. Argentina (Mendoza).  
*Upucerthia lusciniá*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 289.  
 Distribución. — Argentina (Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Sgo. del Estero).

## 314. ENICORNIS Gray, 1840

- \* 583. **Enicornis phoenicurus** (Gould) Turco.

*Eremobius phoenicurus* Gould in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, 1839, p. 69, pl. 21. Argentina (Santa Cruz, Puerto Deseado).

*Henicornis wallisis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 291.

*Henicornis phoenicurus*, Dabbene, Ibid, p. 291.

Distribución. — Argentina (Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, ocasionalmente hasta La Rioja).

## 315. LIMNORNIS Gould, 1839

- \* 584. **Limnornis curvirostris** Gould Pajera pico curvo.

*Limnornis curvirostris* Gould in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, 1839, pl. 25, p. 81. Uruguay (Maldonado).

*Thryolegus curvirostris*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 300.

Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Entre Ríos, Buenos Aires).

## 316. LIMNOCTITES Hellmayr, 1925

- \* 585. **Limnoctites rectirostris** (Gould) Pajera pico recto.

*Limnornis rectirostris* Gould in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, 1839, pl. 26, p. 80. Uruguay (Maldonado).

*Limnoctites rectirostris*, Daguerre, EL HORNERO, Vol. 5, 1933, p. 213.

Distribución. — Uruguay (Maldonado), Argentina (Entre Ríos, Paranacito).

## Subfamilia Synallaxinae

## 317. SYLVIORTHORHYNCHUS Des Murs, 1847

- \* 586. **Sylviorthorhynchus desmuri** Des Murs Colilarga del sur.

*Sylviorthorhynchus desmuri* Des Murs in Gay, Hist. fis. pol. Chile, Zool., p. 316, 1847, Orn., pl. 3. Chile (Valdivia).

A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 5, 1935, pp. 104-5, 342.

*Sylviorthorhynchus desmursi*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1913, p. 245.

Distribución. — Chile (Valparaíso hasta Magallanes e islas adyacentes), Argentina (Santa Cruz hasta Río Negro a través de los valles cordilleranos).

## 318. APHRASTURA Oberholser, 1899

- \* 587. **Aphrastura spinicauda spinicauda** (Gmelin) Rayadito.

*Motacilla spinicauda* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 978. Argentina (Tierra del Fuego).

*Aphrastura spinicauda*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 292.

Distribución. — Chile (Valparaíso hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Isla de los Estados, Tierra del Fuego hasta Neuquén).

## 319. PHLEOCRYPTES Cabanis et Heine, 1859

- \* 588. **Phleocryptes melanops melanops** (Vieillot) Siete cuchillas.  
*Sylvia melanops* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 232.  
 Paraguay.  
*Phleocryptes melanops melanops*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 167.  
 Distribución. — Brasil (São Paulo, hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay,  
 Chile (Valparaíso hasta Llanquihué), Argentina (Tucumán, Sgo. del Estero,  
 Chaco, Misiones hasta Tierra del Fuego).
- \* 589. **Phleocryptes melanops schoenobaenus** Cabanis et Heine Siete cuchillas  
 del Perú.  
*Phleocryptes schoenobaenus* Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 26. Perú  
 (L. Titicaca).  
*Phleocryptes melanops schoenobaenus*, Zimmer, Amer. Mus. Nov., N° 860, 1936, pp. 10-11.  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 57.  
 Distribución. — Perú, N. Chile, Bolivia, Argentina (Los Andes).

## 320. LEPTASTHENURA Reichenbach, 1853

- \* 590. **Leptasthenura aegithaloides berlepschi** Hartert Siete colas.  
*Leptasthenura aegithaloides berlepschi* Hartert, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 210 Ar-  
 gentina (Jujuy, Augusto Pericheli)  
*Leptasthenura aegithaloides*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18,  
 1910, p. 293.  
 Distribución. — Chile (Antofagasta hasta Tacna), Bolivia (Oruro, La Paz), Ar-  
 gentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca).
- \* 591. **Leptasthenura aegithaloides pallida** Dabbene Arañero.  
*Leptasthenura aegithaloides pallida* Dabbene, EL HORNERO, Vol. 2, 1920, p. 135. Argen-  
 tina (Chubut, Puerto Burro, Maitén).  
 Distribución. — Argentina (La Rioja, San Juan hasta Santa Cruz a través de la  
 cordillera andina, por el este hasta La Pampa, San Luis y S. Buenos Aires).
- \* 592. **Leptasthenura platensis** Reichenbach Coludito copetón.  
*Leptasthenura platensis* Reichenbach, Handb. spez. Orn., Sittinae, 1853, p. 160. Argen-  
 tina (río de la Plata).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 292, 430.  
 Distribución. — Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy?, Catamarca, La Rioja, Tu-  
 cumán, Sgo. del Estero, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La  
 Pampa, Río Negro, Chubut).
- \* 593. **Leptasthenura fuliginiceps paranensis** Sclater Tijerita.  
*Leptasthenura paranensis* Sclater, P. Z. S. Lond., 1861, p. 377. Argentina (Mendoza).  
*Leptasthenura fuliginiceps paranensis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires,  
 Vol. 18, 1910, p. 293.  
 Distribución. — Argentina (Mendoza hasta Jujuy, por el este hasta Tucumán,  
 Córdoba, Entre Ríos).

321. *SCHOENIOPHYLAX* Ridgway, 1909

- \* 594. *Schoeniophylax phryganophila* (Vieillot) Choto, chotoy.

*Sylvia phryganophila* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 207. Paraguay.

*Synallaxis phryganophila*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 295.

*Schoeniophylax phryganophila*, Hellmayr, Nov. Zool., Vol. 28, 1921, p. 256.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Paraná, São Paulo), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

322. *SYNALLAXIS* Vieillot, 1818

- \* 595. *Synallaxis ruficapilla* Vieillot Curutié.

*Synallaxis ruficapilla* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 32, 1819, p. 310. Brasil (cerca de Río de Janeiro).

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 265.

Distribución. — Brasil (Espíritu Santo, Minas Geraës, S. Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).

- \* 596. *Synallaxis superciliosa* Cabanis Pijut.

*Synallaxis superciliosa* Cabanis, Journ. f. Orn., Vol. 31, 1883, p. 110. Argentina (Tucumán, San Javier).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 294.

Distribución. — S. Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).

- \* 597. *Synallaxis frontalis frontalis* Pelzeln Roraima.

*Synallaxis frontalis* Pelzeln, Sitz. Kl. Ak. Wiss. Wien, Vol. 34, 1859, p. 117. Brasil nuevo nombre para *Parulus ruficeps* ♀ de Spix (no *Sphenura ruficeps* Lichtens tein) Av. Bras., Vol. 1, 1824, p. 85, pl. 86, fig. 2, (Bahía, río Sao Francisco).

*Synallaxis frontalis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 293.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Pernambuco hasta São Paulo, Matto Grosso), Bolivia (E. Santa Cruz, Tarija), Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta ?, Tucumán, Formosa, Chaco, Mendoza, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

- \* 598. *Synallaxis frontalis fuscipennis* Berlepsch Roraima de Jujuy.

*Synallaxis fuscipennis* Berlepsch, Ornith., Vol. 14, p. 362, 1907. Bolivia, Santa Cruz.

*Synallaxis frontalis fuscipennis*, A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, 1938, p. 57.

Distribución. — Bolivia (SO. Santa Cruz, O. Tarija, Potosí), Argentina (Jujuy, Guenero).

599. *Synallaxis spixi spixi* Sclater Chichi.

*Synallaxis spixi* Sclater, P. Z. S. Lond., Vol. 24, 1856, p. 98. Brasil.

Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 167.

*Synallaxis spixi notius* Oberholser, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 25, 1902, p. 60. Argentina (Buenos Aires, Conchitas).

Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos).

- \* 600. **Synallaxis albescens australis** Zimmer Todavoz.

*Synallaxis albescens australis* Zimmer, Amer. Mus. Nov. N° 819, 1935, p. 2. Paraguay (Puerto Pinasco).

*Synallaxis albescens albescens*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 294.

Distribución. — SE. Bolivia, W. Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco hasta Buenos Aires, La Pampa, por el oeste hasta Mendoza, La Rioja y Tucumán).

- \* 601. **Synallaxis albescens albescens** Temminck Todavoz de Misiones.

*Synallaxis albescens* Temminck, Rec. Pl. col., livr. 38, 1823, pl. 227, fig. 2. Brasil (São Paulo, Cimiterio do Lombardi).

*Synallaxis albescens*, White, P. Z. S. Lond., 1802, p. 611, Misiones (San Javier).

Distribución. — Brasil (Maranhao, Piahui, Pernambuco hasta São Paulo, Matto Grosso), E. Paraguay, Argentina (Misiones ?).

- \* 602. **Synallaxis cinerascens** Temminck Pijuí ceniciento.

*Synallaxis cinerascens* Temminck, Rec. Pl. col., 1823, livr. 38, pl. 227, fig. 3. Brasil (São Paulo, Ypanema).

Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 329.

A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 58.

Distribución. — Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 603. **Synallaxis scutata whitii** Sclater Pijuí de corbata negra.

*Synallaxis whitii* Sclater, Ibis, Vol. 5, 1881, p. 600, pl. 17, fig. 2. Argentina (Salta, Orán).

*Synallaxis scutata whitii*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 294.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso), E. Bolivia, Argentina (Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca).

### 323. CERTHIAXIS Lesson, 1844

- \* 604. **Certhiaxis cinnamomea russeola** (Vieillot) Curutié.

*Sylvia russeola* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 217. Paraguay.

*Synallaxis cinnamomea russeola*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 295.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piahui, Ceará, hasta Río Grande do Sul, Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

### 324. CRANIOLEUCA Reichenbach, 1853

- \* 605. **Cranioleuca obsoleta** (Reichenbach) Ratonero.

*Leptoxyura obsoleta* Reichenbach, Handb. spez. Orn., Scansoriae, A, Sittinae, 1853, p. 171, pl. 164, fig. 3715. Brasil.

*Siptornis ruticilla*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 265.

Distribución. — Brasil (S. Minas Geraës, São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

\* 606. **Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia** (Vieillot) Trepadorcito.

*Dendrocopus pyrrhophius* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1918, p. 118. Argentina (Corrientes).

*Cranioleuca heterocerca*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 296. *Cranioleuca striaticeps*, Ibid., p. 296.

Distribución. — Uruguay, SE. Bolivia, Argentina (por todo el norte hasta Río Negro).

\* 607. **Cranioleuca sulphurifera** (Burmeister) Garganta amarilla.

*Synallaxis sulphurifera* Burmeister, P. Z. S. Lond., 1868, p. 636. Argentina (cerca de Buenos Aires).

*Cranioleuca sulphurifera*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 299.

Distribución. — Argentina (Entre Ríos, Buenos Aires hasta Río Negro).

325. **ASTHENES** Reichenbach, 1853

\* 608. **Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca** (Vieillot) Coludo.

*Sylvia pyrrholeuca* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 277. Paraguay.

*Synallaxis sordida*, Holland, Ibis, 1893, p. 487. Argentina (Entre Ríos, Santa Elena).

*Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca*, Hellmayr et Cory, Field. Mus. Nat. Hist. Zool. Series, Publ. 234, Vol. 13, 1925, p. 133.

Distribución. — Paraguay, Argentina (Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes, Chaco ?, Formosa).

\* 609. **Asthenes pyrrholeuca flavogularis** (Gould) Coludo del sur.

*Synallaxis flavogularis* Gould in Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, 1839, p. 78, pl. 24. Argentina (Buenos Aires, Bahía Blanca y Santa Cruz).

*Cranioleuca sordida*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 298. *Cranioleuca sordida flavogularis*, Ibid., p. 430.

Distribución. — Argentina (Buenos Aires hasta Santa Cruz).

\* 610. **Asthenes pyrrholeuca affinis** (Berlepsch) Coludo de gargantilla.

*Siptornis sordida affinis* Berlepsch, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 16, 1906, p. 98. Argentina (Tucumán, Los Vasquez).

*Cranioleuca sordida affinis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 430.

*Siptornis affinis*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 331.

Distribución. — Argentina (Mendoza, La Rioja, Salta, Los Andes, Tucumán, W. Córdoba ?).

\* 611. **Asthenes pyrrholeuca sordida** (Lesson) Coludo chileno.

*Synallaxis sordida* Lesson, Rev. Zool., Vol. 2, 1839, p. 105. Chile.

*Siptornis sordida sordida*, Peters, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 65, 1923, p. 317.

Distribución. — Chile (Aconcagua hasta Llanquihué), Argentina (Neuquén, Río Negro).



- \* 612. **Asthenes baeri** (Berlepsch) Coludo de garganta castaña.  
*Siptornis baeri* Berlepsch, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 16, 1906, p. 99. Argentina (Córdoba, Cosquín).  
*Cranioleuca baeri* Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 430.  
*Cranioleuca leptastenuroides*, Ibid., p. 298.  
 Distribución. — Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro).
- \* 613. **Asthenes patagonica** (d'Orbigny) Coludo de Patagonia.  
*Synallaxis patagonica* d'Orbigny, Voyage Amér. Mérid., Ois., 1839, p. 249. Argentina (Río Negro).  
*Cranioleuca patagonica*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 298.  
 Distribución. — Argentina (Mendoza, Río Negro, Chubut).
- \* 614. **Asthenes modesta australis** Hellmayr Coludo austral.  
*Asthenes modesta australis* Hellmayr, Field Mus. Nat., Zool. Ser., Vol. 13, Part 4, 1925, p. 138. Chile (Coquimbo, Baños del Toro).  
*Cranioleuca modesta*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 298.  
 Distribución. — Chile (Atacama hasta Colchagua), Argentina (Mendoza, Córdoba, S. Buenos Aires hasta Chubut y Santa Cruz).
- \* 615. **Asthenes modesta modesta** (Eyton) Coludo boliviano.  
*Synallaxis modestus* Eyton, Contrib. Orn. 1851, p. 159, pl. 81. Bolivia.  
*Cranioleuca hilereti*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 297.  
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
- \* 616. **Asthenes d'orbignyi d'orbignyi** (Reichenbach) Colilarga.  
*Bathmidura d'orbignyi* Reichenbach, Handb. spez. Orn., Scansoriae, A. Sittinae, 1853, p. 163, basado en *Synallaxis humicola* d'Orbigny, Voyage Amér. Mérid. Ois., pl. 17, fig. 2. Bolivia (Cochabamba, Ayupaya).  
*Synallaxis crassirostris*, Landbeck, in Leybold, An. Univ. Chile, Vol. 26, 1865, p. 713. Argentina (Mendoza, entre el río Tumuyán y Melocotón).  
*Synallaxis orbignii*, Sclater et Hudson, Arg. Orn., Vol. 1, 1888, p. 183.  
 Distribución. — E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Mendoza).
- \* 617. **Asthenes humicola humicola** (Kittlitz) Coludo obscuro.  
*Synallaxis* (sic) *humicola* Kittlitz, Mém. Ac. Sci. St. Petersb., Vol. 1, livr. 2, 1830, p. 185. Chile (cerca de Valparaíso).  
*Cranioleuca humicola*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 298.  
 Distribución. — Chile (Atacama hasta Curicó), Argentina (Mendoza).
- \* 618. **Asthenes steinbachi** (Hartert) Coludo de garganta blanca.  
*Siptornis steinbachi* Hartert, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 213. Argentina (Salta, Cachí).  
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 195.  
 Distribución — Argentina (Salta, Catamarca, Mendoza).

- \* 619. **Asthenes punensis lilloi** (Oustalet) Coludo rayado.  
*Siptornis lilloi* Oustalet, Bull. Mus. Hist. Nat. París, Vol. 10, 1904, p. 44. Argentina (Tucumán, La Lagunita).  
*Cranioleuca lilloi*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 297.  
*Cranioleuca dinellii*, Dabbene, Ibid., p. 297.  
 Distribución. — Argentina (Tucumán, La Rioja, Catamarca).
- \* 620. **Asthenes maluroides** (Lafresnaye et d'Orbigny) Coludo enano.  
*Synallaxis maluroides* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag., Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 22. Argentina (Buenos Aires).  
*Cranioleuca maluroides*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 299.  
 Distribución. — SE. Brasil, Uruguay, Argentina (Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires hasta Río Negro).
621. **Asthenes maculicauda** (Berlepsch) Espinero rayado.  
*Siptornis maculicauda* Berlepsch, Journ. f. Orn., Vol. 49, 1901, p. 92. Bolivia (La Paz, Iquico).  
 Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 264.  
 Distribución. — Bolivia, Argentina (Tucumán).
- \* 622. **Asthenes anthoides** (King) Canastero.  
*Synallaxis anthoides* King, Proc. Comm. Sci. & Corresp. Zool. Soc. Lond., Vol. 1, 1831, p. 30. Estrecho de Magallanes?.  
*Cranioleuca anthoides*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 299.  
 Distribución. — Chile (Valparaíso al Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén, Río Negro hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).
- \* 623. **Asthenes hudsoni** (Selater) Cola aguda.  
*Synallaxis hudsoni* Selater, P. Z. S. Lond., 1874, p. 25. Argentina (Buenos Aires, Conchitas).  
*Cranioleuca hudsoni*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 299, 430.  
 Distribución. — Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Córdoba hasta Chubut).
326. PHACELLODOMUS Reichenbach, 1853
- \* 624. **Phacellodomus rufifrons sincipitalis** Cabanis Espinero de frente roja.  
*Phacellodomus sincipitalis* Cabanis, Journ. f. Orn., Vol. 31, 1883, p. 109. Argentina (Tucumán).  
*Phacellodomus sincipitalis* (sic), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 300.  
 Distribución. — E. Bolivia, SW. Brasil, Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires).
- \* 625. **Phacellodomus striaticeps striaticeps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Espinero blanco.  
*Anumbius striaticeps* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 8, 1838, cl. 2, p. 19. Bolivia (Sicasica).

*Phacelodomus striaticeps*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 301.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones).

- \* 626. **Phacelodomus sibilatrix** Sclater Espinero chico.

*Phacelodomus sibilatrix* Sclater, P. Z. S. Lond., 1879, p. 461. Argentina (Córdoba).

*Phacelodomus sibilatrix*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 301.

Distribución. — Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba).

- \* 627. **Phacelodomus ruber** (Vieillot) Añumbí rojo.

*Furnarius ruber* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 12, 1817, p. 118. Paraguay.

*Phacelodomus ruber*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 300.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Goyaz, Matto Grosso), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires).

- \* 628. **Phacelodomus striaticollis striaticollis** (Lafresnaye et d'Orbigny) Leñatero.

*Anumbius striaticollis* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 8, 1838, p. 18. Argentina (Buenos Aires).

*Phaceloscenus striaticollis striaticollis*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 168.

Distribución. — SE. Brasil, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Buenos Aires).

- \* 629. **Phacelodomus striaticollis maculipectus** Cabanis Leñatero del Norte.

*Phacelodomus maculipectus* Cabanis, Journ. f. Orn., Vol. 31, 1883, p. 109. Argentina (Tucumán, San Javier).

*Phacelodomus maculipectus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 301.

Distribución. — E. Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Sgo. del Estero).

### 327. ANUMBIUS Lafresnaye et d'Orbigny, 1838

- \* 630. **Anumbius annumbi** (Vieillot) Chinchibirre, Añumbí.

*Furnarius annumbi* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 12, 1817, p. 117. Paraguay.

*Anumbius annumbi*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 167.

Distribución. — Brasil (Minas Geraës, São Paulo, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut).

### Subfamilia: Philydorinae

#### 328. PSEUDOSEISURA Reichenbach, 1853

- \* 631. **Pseudoseisura lophotes** (Reichenbach) Coperote, cacholote.

*Homorus lophotes* Reichenbach, Handbuch spez. Orn., Scansoriae, A. Sittinae, 1853, p. 172. Bolivia ?.

*Pseudoseisura lophotes*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 301.

Distribución. — Uruguay, Argentina (Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa hasta Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, y por el norte hasta Tucumán, Sgo. del Estero).

\* 632. ***Pseudoseisura gutturalis*** (Lafresnaye et d'Orbigny) Chorlote, Caserote.

*Anabates gutturalis* Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 8, 1838, p. 15. Argentina (Patagonia).

*Pseudoseisura gutturalis*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 302.

Distribución. — Argentina (Chubut, Río Negro, Neuquén hasta Buenos Aires por el este y a través de la zona andina hasta Salta).

### 329. XENOCTISTES Hellamyr, 1925

\* 633. ***Xenoctistes rufosuperciliatus acritus*** (Oberholser) Titirí del este.

*Xenicopsis acritus* Oberholser, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 14, 1901, p. 187. Paraguay (Sapucay).

*Xenicopsis rufosuperciliatus oleagineus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 302.

Distribución. — Brasil (Santa Catharina, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires).

\* 634. ***Xenoctistes rufosuperciliatus oleagineus*** (Selater) Titirí del oeste.

*Anabazenops oleagineus* Selater, P. Z. S. Lond., 1884, p. 654. Argentina (Catamarca, Sierra del Totoral)

*Xenicopsis rufosuperciliatus oleagineus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 302.

*Xenicopsis rufosuperciliatus cabanisi*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 23, 1912, p. 313.

Distribución. — S. Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires).

### 330. PHYLIDOR Spix, 1824

\* 635. ***Philydor atricapillus*** (Kuhl) Tico-tico.

*Anabates atricapillus* « Prince Maximil. M. S. »; Kuhl, Reise Bras., Vol. 2, 1821, p. 147. Brasil (Bahía, río Catolé).

*Philydor atricapillus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 333.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Goyaz hasta São Paulo, Paraná), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

\* 636. ***Philydor lichtensteini*** Cabanis et Heine Tico-tico de pico corto.

*Philydor lichtensteini* Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 29. Brasil.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 333.

Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro, São Paulo, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 637. **Philydor rufus rufus** (Vieillot) Tico-tico rojizo.  
*Dendrocopus rufus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat. nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 119.  
 Brasil (Río de Janeiro).  
*Philydor rufus*, Dabbene, Physis, Vol., 1914, p. 333.  
 Distribución. — Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso, São Paulo, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones).

## 331. AUTOMOLUS Reichenbach, 1853

- \* 638 **Automolus leucophthalmus leucophthalmus** (Kuhl) Arapassú colorado.  
*Anabates leucophthalmus* « Prince Maximil. M. S. »; Kuhl, Reise Bras., Vol. 2, 1821, p. 141. Brasil (Bahía, Río da Cachoeira).  
*Automolus leucophthalmus*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 332.  
 Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Goyaz, hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

## 332. HELIOBLETUS Reichenbach, 1853

- \* 639. **Heliobletus contaminatus** Berlepsch Pappa formigas.  
*Heliobletus contaminatus* (ex Lichtenstein N. S.) Berlepsch, Zeits. ges. Orn., Vol. 2, 1885, p. 144, nuevo nombre para *Heliobletus superciliosus* Burmeister (no de Lichtenstein), Syst. Ubers, Th. Bras., Vol. 3, 1856, p. 32. Brasil (Río de Janeiro, Novo Friburgo).  
*Heliobletus superciliosus*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 265.  
 Distribución. — Brasil (Río de Janeiro, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

## 333. XENOPS Illiger, 1811

- \* 640. **Xenops rutilus rutilus** Lichtenstein Pico lezna.  
*Xenops rutilus* Lichtenstein, Verz. Dubl. Berliner Mus., 1823, p. 17. Brasil (Bahía).  
*Xenops rutilus rutilus*, A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 58.  
 Distribución. — Brasil (Maranhao, Piahui, Goyaz, Matto Grosso, hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 641. **Xenops rutilus connectens** Chapman Pico lezna jaspeado.  
*Xenops rutilus connectens* Chapman, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 32, 1919, p. 259. Bolivia (Cochabamba, Todos Santos).  
*Xenops rutilus rutilus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 303.  
 Distribución. — E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

## 334. PYGARRHICUS Burmeister, 1837

- \* 642. **Pygarrhicus albogularis** (King) Falso carpintero.  
*Dendrocolaptes albo-gularis* King, Proc. Comm. Sci. & Corresp. Z. S. Lond., Vol. 1, 1831, p. 30. Estrecho de Magallanes.  
*Pygarrhicus albogularis* (sic), Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 303.

Distribución. — Chile (O'Higgins hasta Tierra del Fuego), Argentina (Mendoza, hasta Santa Cruz a través de la región andina).

Subfamilia **Sclerurinae**

335. **SCLERURUS** Swainson, 1827

- \* 643. **Sclerurus scansor scansor** (Ménétrières) Ogaraití.

*Oxypyga scansor* Ménétrières, Mém. Ac. Sci. St. Pétersb., Vol. 3, Part 2, 1835, p. 520, pl. 11. Brasil (Río de Janeiro y Minas Geraës).

*Sclerurus caudacutus scansor*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, pp. 303, 431.

Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

336. **LOCHMIAS** Swainson, 1827

- \* 644. **Lochmias nematura nematura** (Lichtenstein) Macuquinho.

*Myiothera nematura* Lichtenstein, Verz. Dubl. Berliner Mus., 1823, p. 43. Brasil (São Paulo).

*Lochmias nematura*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 291.

Distribución. — Brasil (Goyaz, Minas Geraës, Río Janeiro hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Entre Ríos).

Familia **Formicariidae** (*Comedores de hormigas*)

Subfamilia **Formicariinae**

337. **HYPOEDALEUS** Cabanis et Heine, 1859

- \* 645. **Hypoedaleus guttatus guttatus** (Vieillot) Choca grande.

*Thamnophilus guttatus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 315. Brasil (Río de Janeiro).

*Hypoedaleus guttatus rodriguezianus*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 263.

Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraës, Espiritu Santo hasta Santa Catharina), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

338. **BATARA** Lesson, 1831

- \* 646. **Batara cinerea cinerea** (Vieillot) Coluda de Misiones.

*Tamnophilus cinereus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819, p. 200. (= ♂) Brasil (Río de Janeiro).

*Batara cinerea*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 325.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, São Paulo hasta Río Grande do Sul), Argentina (Misiones).

- \* 647. **Batara cinerea argentina** Shipton Coluda de Salta.

*Batara cinerea argentina* Shipton, Physis, Vol. 4, N° 16, 1918, p. 106. Argentina (Jujuy, San Lorenzo).

*Batara cinerea*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 282.

Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta).

## 339. MACKENZIAENA Chubb, 1918

- \* 648. **Mackenziaena leachii** (Such) Borralhara.  
*Thamnophilus leachii* Such., Zool. Journ., Vol. 1, N° 4, 1825, p. 558. (= ♂) Brasil (Río de Janeiro, Goaytacazes).  
*Thamnophilus Leachi*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 282.  
 Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraés, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Argentina (Misiones).
- \* 649. **Mackenziaena severa** (Lichtenstein) Bulahura, Chiflador.  
*Lanius severus* Lichtenstein, Verz. Dobl. Berliner Mus., 1823, pp. 45, 46. Brasil (São Paulo).  
*Thamnophilus severus*, Dabbene Physis, Vol. 1, 1914, p. 326.  
 Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, São Paulo hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

## 340. TARABA Lesson, 1830

- \* 650. **Taraba major major** (Vieillot) Batara mayor.  
*Thamnophilus major* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 313. Paraguay.  
*Thamnophilus major major*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 283.  
*Taraba major kriegi* Laubmann, Vögel, Wiss. Ergebnisse Deutsche Gran Chaco-Exped., 1930. p. 172. Bolivia (Santa Cruz).  
*Taraba major albatus* Brodkorb, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 50, 1937, pp. 7-8. Paraguay (265 km. al W. P. Casado, Chaco paraguayayo).  
 Distribución. — Bolivia, Brasil, (Goyaz, Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, N. Córdoba).

## 341. THAMNOPHILUS Vieillot, 1816

- \* 651. **Thamnophilus schistaceus schistaceus** d'Orbigny Batara apizarrada.  
*Thamnophilus schistaceus* d'Orbigny, Voy. Amér. Mérid., Ois. 1838, p. 170, pl. 5, fig. 1. Bolivia (Yuracares).  
*Thamnophilus schistaceus schistaceus*, A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 59.  
 Distribución. — Perú (Chanchamayo, Junín, Puno), Bolivia, W. Brasil (Matto Grosso), Argentina (Salta, Tucumán).
- \* 652. **Thamnophilus doliatus radiatus** Vieillot Batara listado.  
*Thamnophilus radiatus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 315. Paraguay.  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 284.  
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, São Paulo), Bolivia, Paraguay, Argentina (N. Formosa?).

- \* 653. **Thamnophilus caerulescens caerulescens**. Vieillot **Batara negro** aplomado.  
*Thamnophilus caerulescens* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 311. (= ♂ ad.). Paraguay.  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 60.  
 Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro, São Paulo, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones, Puerto Segundo, Iguazú, Santa Ana).
- \* 654. **Thamnophilus gilvigaster gilvigaster** Pelzeln **Batara acanelada**.  
*Thamnophilus gilvigaster* Pelzeln, Orn. Bras. Vol. 2, 1868 p. 76. Brasil (Paraná, Curytiba).  
*Thamnophilus gilvigaster Dinellii*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, pp. 283, 428.  
*Thamnophilus caerulescens* (sic), Dabbene, Ibid, p. 283, en parte.  
*Thamnophilus caerulescens gilvigaster*, Hellmayr, Nov. Zool., Vol. 28, 1921, pp. 198, 199.  
 Distribución. — SE. Brasil (São Paulo, Paraná, Santa Catharina, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos).
- \* 655. **Thamnophilus gilvigaster dinellii** Berlepsch. **Batara chica**.  
*Thamnophilus dinellii* Berlepsch, Bull. B. O. C. Vol. 16, p. 99. Argentina (Sgo. del Estero, Isca Yacu).  
*Thamnophilus gilvigaster Dinelli*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 428.  
 Distribución. — Bolivia (Tarija), Argentina (N. Santa Fé, N. Córdoba, Sgo. del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy).
- \* 656. **Thamnophilus connectens** Berlepsch. **Batara listada**.  
*Thamnophilus connectens* Berlepsch, Orn. Bras., Vol. 14, 1907, p. 369. Bolivia (Samaipata).  
 A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, p. 61.  
 Distribución. — E. Bolivia (Valle Grande, Santa Cruz), Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa).
- \* 657. **Thamnophilus ruficapillus cochabambae** (Chapman) **Choca menor del oeste**.  
*Rhopochares cochabambae* Chapman, Amer. Mus. Novit., N° 2, 1921, p. 2. Bolivia (Cochabamba, Tujina).  
*Thamnophilus ruficapillus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 284.  
 Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).
- \* 658. **Thamnophilus ruficapillus ruficapillus** Vieillot **Choca menor del este**.  
*Thamnophilus ruficapillus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 318. Argentina (Corrientes).  
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 284.  
 Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, N. Buenos Aires).



342. *DYSITHAMNUS* Cabanis, 1847

659. *Dysithamnus mentalis tavaræ* Zimmer Burajára del oeste.

*Dysithamnus mentalis tavaræ* Zimmer, Amer. Mus. Nov., N° 558, 1932, pp. 7-8. Perú (río Tavara).

Distribución. — SE. Perú, NW. Bolivia, Argentina (Tucumán). Aún no señalado para la Argentina, hemos visto un ejemplar de Tucumán, de las colecciones del Instituto de Zoología de la Universidad Nacional de Tucumán, N° 1272.

- \* 660. *Dysithamnus mentalis mentalis* (Temminck) Burajára.

*Myothera mentalis* Temminck, Rec. Pl. col., Vol. 30, 1823, pl. 179, fig. 3. Brasil (Paraná, Curytiba).

*Dysithamnus mentalis mentalis*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 263.

Distribución. — SE. Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

343. *MELANOPAREIA* Reichenbach, 1853

- \* 661. *Melanopareia maximiliani argentina* (Hellmayr). Hormiguero de collar.

*Synallaxis maximiliani argentina* Hellmayr, Bull. Brit. Orn. Club, Vol. 19, 1907, p. 74. Argentina (Tucumán, Ñorco).

*Synallaxis maximiliani*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 295, 430.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Córdoba, Formosa, Chaco, N. Santa Fé).

344. *MYRMORCHILUS* Ridgway, 1909

- \* 662. *Myrmorchilus strigilatus suspicax* Wetmore. Hormiguero.

*Myrmorchilus strigilatus suspicax* Wetmore, Journ. Wash. Ac. Sci., Vol. 12, N° 14, 1922, p. 327. Argentina (Formosa, Riacho Pilaga, cerca de kilómetro 182).

*Formicivora strigilata*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 285.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso), Paraguay (Chaco), Argentina (Formosa, Jujuy, Salta).

345. *HERPSILOCHMUS* Cabanis, 1847

663. *Herpsilochmus pileatus atricapillus* Pelzeln Tiluchi.

*Herpsilochmus atricapillus* Pelzeln, Orn. Bras., Vol. 2, 1868, p. 80, 150. Brasil (Puerto del río Paraná).

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 327.

Distribución. — Brasil (Piauhi, Ceará, Pernambuco, hasta São Paulo, Matto Grosso), E. Bolivia, Argentina (Jujuy).

- \* 664. **Herpsilochmus rufimarginatus rufimarginatus** (Temminck) Tiluchi de alas canelas.

*Myothera rufimarginata* Temminck, Rec. Pl. col., livr. 22, 1822, pl. 132, fig. 1. (♂), 2 (♀). Brasil (Río de Janeiro).

*Herpsilochmus rufimarginatus*, Dabbene, (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 327.

Distribución. — Brasil (Bahía, hasta São Paulo), Paraguay, Argentina (Misiones).

346. DRYMOPHILA Swainson, 1825

- \* 665. **Drymophila ferruginea** (Temminck) Trovoada.

*Myothera ferruginea* Temminck, Rec. Pl. col., livr. 22, 1822, pl. 132, fig. 3. (♂ ad.). Brasil (Río de Janeiro).

*Formicivora ferruginea*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 264.

Distribución. — Brasil (Bahía hasta Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 666. **Drymophila malura** (Temminck). Trovoada bataraz.

*Myothera malura* Temminck, Rec. Pl. col., livr. 59, 1825, pl. 353, fig. 1. (♂), 2 (♀). Brasil (São Paulo, Ypanéma).

*Formicivora malura*, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 327.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

347. TERENCEA Cabanis et Heine, 1859

- \* 667. **Terenura maculata** (Kuhl) Piojito lomo colorado.

*Myiothera maculata* «Prince Maximil. M. S.»; Kuhl, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 1088. Brasil (Río de Janeiro).

*Terenura maculata*, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 177.

Distribución. — SE. Brasil (Espírito Santo hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

348. PYRIGLENA Cabanis, 1847

- \* 668. **Pyriglena leucoptera** (Vieillot) Renegrido lomo blanco.

*Turdus leucopterus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 272. Brasil (Río de Janeiro).

*Pyriglena leucoptera*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 264.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës hasta Santa Catharina), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

349. CHAMAEZA Vigors, 1825

- \* 669. **Chamaeza brevicauda brevicauda** (Vieillot) Továca.

*Turdus brevicaudus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 20, 1818, p. 239. Brasil (Río de Janeiro).

*Chamaeza brevicauda*, Dabbene Physis, Vol. 1, 1914, p. 328.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

Subfamilia **Myrmotherinae**

350. GRALLARIA Vieillot, 1816

- \* 670. **Grallaria varia imperator** Lafresnaye. Torón - torón.

*Grallaria imperator* Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 5, 1842, p. 555. Brasil (São Paulo).

*Grallaria varia imperator*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 264.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

- \* 671. **Grallaria ochroleuca** (Kuhl) Teguy.

*Myioturdus ochroleucus* « Prince Maximil. M. S. »; Kuhl, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 1032. Brasil (Bahía, Arrayal da Conquista).

*Grallaria ochroleuca*, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 328.

Distribución. — SE. Brasil (Ceará, Bahía hasta São Paulo), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia **Conopophagidae** (*Atrapamosquitos*)

351. CONOPOPHAGA Vieillot, 1816

- \* 672. **Conopophaga lineata vulgaris** (Ménétrières) Toco-toco.

*Conopophaga vulgaris* Ménétrières, Men. Acad. Sci. St. Pétersb., Vol. 3, Part. 2, 1885, p. 534, pl. 14, fig. 1 (= ♂). Brasil (Río de Janeiro y Minas Geraës).

*Conopophaga lineata anomala*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 263.

Distribución. — Brasil (Pernambuco?, Bahía hasta Río Grande do Sul y por el W. hasta Matto Grosso), E. Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).

352. CORYTHOPIS Sundevall, 1835

- \* 673. **Corythopsis delalandi** (Lesson) Atrapamosquitos.

*Muscicapa delalandi* Lesson, Traité d'Ornith., Vol. 5, 1830, p. 93. Brasil (Río de Janeiro).

*Corythopsis calcarata*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 325.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Matto Grosso, Río de Janeiro, São Paulo), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).

Familia **Rhinocryptidae** (*Tapacolas*)

353. PTEROPTOCHOS Kittlitz, 1830

- \* 674. **Pteroptochos tarnii** (King) Tapacola.

*Hylactes Tarnii* King, Proc. Comm. Sci. Corresp. Zool. Soc. Lond., Vol. 1, 1831, p. 15. Chile (Isla Chiloé y Atway).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 281.

Distribución. — Chile (Concepción al estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz).

354. *SCELORCHILUS* Oberholser, 1923

- \* 675. *Scelorchilus rubecula* (Kittlitz) Chucáo.

*Pteroptochos rubecula* Kittlitz, Mém. Ac. Sci. St. Pétersb., Vol. 1, 1830, p. 179., pl. 2. Chile (Concepción).

*Pteroptocus rubecula*, Dabbene, Physis, Vol. 1, N° 8, 1914, p. 325.

Distribución. — Chile (Concepción hasta Colchagua), Argentina (Neuquén, Río Negro, Chubut).

355. *RHINOCRYPTA* Gray, 1830

- \* 676. *Rhinocrypta lanceolata* (Geoffroy-Saint Hilaire) Gallito de agua.

*Rhinomya lanceolata* Geoffroy-Saint Hilaire, Mag. Zool., Vol. 2, 1832, cl. 2, pl. 3. Argentina (Río Negro).

*Rhinocrypta lanceolata*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 281.

Distribución. — Argentina (Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires).

356. *TELEDROMAS* Wetmore et Peters, 1922

- \* 677. *Teledromas fuscus* (Sclater et Salvin) Gallito negro.

*Rhinocrypta fusca* Sclater et Salvin, Nonmencl. Av. Neotrop., 1873, p. 161. Argentina (Mendoza).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 281.

Distribución. — Argentina (Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro).

357. *SCYTALOPUS* Gould, 1837

- \* 678. *Scytalopus speluncae* (Ménétrières). Ratona del bosque.

*Malacorynchus speluncae* Ménétrières, Mém. Acad. Sci. St. Pétersb., Vol. 3, Part. 2, 1835, p. 527, pl. 13, fig. 1. Brasil (Minas Geraës, cerca de São Joao do Rey).

Bertoni, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 258. Misiones (Puerto León).

Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro, São Paulo), Argentina (Misiones?).

- \* 679. *Scytalopus magellanicus magellanicus* (Gmelin) Chircán.

*Motacilla magellanica* Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 979. Argentina (Tierra del Fuego).

*Scytalopus niger*, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 262.

Distribución. — Chile (Malleco hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Islas Malvinas).

- \* 680. *Scytalopus magellanicus fuscus* Gould Churrín.

*Scytalopus fuscus* Gould, P. Z. S. London, Vol. 4, 1837, p. 89. Chile.

*Scytalopus magellanicus fuscus*, Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Pub. 308, 1932, pp. 224-228, part. Argentina (Mendoza, Valle Horcones).

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Concepción), Argentina (Mendoza, Valle Horcones).

- \* 681. *Scytalopus superciliaris* Cabanis Churrín cejas blancas.

*Scytalopus superciliaris* Cabanis, Journ. f. Ornith., Vol. 31, 1883, p. 105, pl. 2, fig. 2. Argentina (Tucumán).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 280.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Catamarca, Chumbicha).

### Superfamilia Tyrannoidea

#### Familia Cotingidae (*Cotingas, Anambés, Bataras etc.*)

#### 358. PHIBALURA Vieillot, 1816

- \* 682. *Phibalura flavirostris flavirostris* Vieillot Tesourinha.

*Phibalura flavirostris* Vieillot, An. Nouv. Orn. Elém., 1816, p. 68. Brasil.

Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 349.

Distribución. — SE. Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

#### 359. CASIORNIS Des Murs, 1856

- \* 683. *Casiornis rufa* (Vieillot) Batará rojo.

*Thamnophilus rufus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 316. Paraguay.

*Casiornis rufa*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 312.

Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso, Maranhão hasta Paraná), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco).

#### 360. PACHYRAMPHUS Gray, 1840

- \* 684. *Pachyrhamphus viridis viridis* (Vieillot) Anambé acollarado.

*Tityra viridis* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 348. Paraguay.

*Pachyrhamphus viridis*, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 348.

Distribución. — E. Brasil (Piauhy, Ceará hasta Río Grande do Sul, E. Matto Grosso), Bolivia (Santa Cruz), Paraguay, Argentina (Misiones, N. Santa Fé, Chaco, Formosa, Tucumán, Salta).

(Continuará)