
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Lista sistemática de las aves argentinas Zotta, A. R. 1939

Cita: Zotta, A. R. (1939) Lista sistemática de las aves argentinas. *Hornero* 007 (02) : 299-326

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES ARGENTINAS

ELABORADA POR LA SECCIÓN ORNITOLÓGICA DEL MUSEO ARGENTINO
DE CIENCIAS NATURALES - BUENOS AIRES

(Continuación de la pág. 124, Vol. VII)

- * 685. *Pachyramphus castaneus castaneus* (Jardine et Selby) Anambé rojizo.

Tityra castanea Jardine et Selby, *Illust. Orn.*, Vol. 1, 1827, pl. 10, fig. 2. Brasil.

Pachyramphus castaneus, Dabbene, *An. Mus. Nac. Hist. Nat.*, Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 311.

Distribución. — E. Brasil (Bahía, Goyaz hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 686. *Pachyramphus polychropterus spixii* (Swainson) Anambé común.

Pachyrhynchus spixii Swainson, *Anim. Menag.*, 1837, p. 289. Brasil?

Pachyramphus polychropterus notius, Dabbene, *EL HORNERO*, Vol. 1, 1919, p. 239.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, E. Córdoba).

361. XENOPSARIS Ridgway, 1891

- * 687. *Xenopsaris albinucha albinucha* (Burmeister) Tijerilla.

Pachyrhamphus albinucha Burmeister, *P. Z. S. Lond.*, 1868, p. 635. Argentina (Buenos Aires, Belgrano).

Xenopsaris albinucha, Dabbene, *An. Mus. Nac. Hist. Nat.*, Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 312.

Distribución. — E. Brasil (Piauhy, Bahía) Paraguay (Chaco), Argentina (Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fé, Buenos Aires).

362. HABRURA Cabanis et Heiné, 1850

- * 688. *Habrura pectoralis pectoralis* (Vieillot) Tachurí.

Sylvia pectoralis Vieillot, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 210. Paraguay.

Habrura pectoralis, Dabbene, *An. Mus. Nac. Hist. Nat.*, Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 328.

Distribución. — S. Brasil (Matto Grosso, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Chaco, Sgo. del Estero, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).

363. ACROCHORDOPUS Berlepsch et Hellmayr, 1905

* 689. **Acrochordopus burmeisteri** (Cabanis et Heine)

Phyllomyias burmeisteri Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 57. Brasil.
Acrochordopus subviridis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 336.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, hasta Paraná), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).

364. PLATYPSARIS Sclater, 1857

* 690. **Platypsaris rufus rufus** (Vieillot) Canelleiro.

Tityra rufa Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 3, 1816, p. 347. Paraguay.
Platypsaris rufus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 310.

Distribución. — Brasil (Ceará, Piauh, Goyaz, Matto Grosso, hasta Santa Catharina), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Chaco, Santa Fé).

* 691. **Platypsaris rufus audax** (Cabanis) Canelleiro audax.

Hadrostomus audax Cabanis, Journ. Orn., Vol. 21, 1873, p. 68. Perú (Ayacucho, Monterico).
Platypsaris audax, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 310.

Distribución. — Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja).

365. TITYRA Vieillot, 1816

* 692. **Tityra cayana braziliensis** (Swainson) Correo, aroponguira.

Psaris braziliensis Swainson, Anim. Menag., 1837, p. 286. N. Brasil.
Tityra braziliensis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 347.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Pernambuco hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

* 693. **Tityra inquisitor inquisitor** (Lichtenstein) Iribú-ti-mi.

Tyrannus atricapillus (no, Vieillot, 1807) Vieillot, Tabl. Enc. Méth., Orn., Vol. 2, 1823, livr. 93, p. 256. Paraguay.
Tityra inquisitor, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 347.

Distribución. — Brasil (Piauh, Bahía, hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

366. PYRODERUS Gray, 1840

* 694. **Pyroderus scutatus scutatus** (Shaw) Yacu-toro.

Coracias scutata Shaw, Mus. Lever., N° 4, 1792, p. 199, con plancha. SE. Brasil?
Pyroderus scutatus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 350.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes).

367. *PROCNIAS* Illiger, 1811

- * 695. *Procnias nudicollis* (Vieillot) Ferreiro.

Ampelis nudicollis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd. Vol. 8, 1817, p. 164. Brasil.

Procnias nudicollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 432.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia *Pipridae* (Saltarines)368. *PIPRITES* Cabanis, 1847

696. *Piprites chloris chloris* (Temminck) Saltarín.

Pipra chloris Temminck, Nouv. Rec. Pl. Col., livr. 29, 1822, pl. 172, fig. 2. Brasil (São Paulo, Ypanema).

Piprites chloris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 432.

Distribución. — Brasil (Espíritu Santo, São Paulo, Paraná, Río Grande do Sul), E. Paraguay, Argentina (Misiones).

369. *CHIROXIPHIA* Cabanis, 1847

- * 697. *Chiroxiphia caudata* (Shaw et Nodder) Bailarín.

Pipra caudata Shaw et Nodder, Natur. Misc., Vol. 5, 1793, pl. 153. Sudamérica.

Chiroxiphia caudata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 313.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Paraná), SE. Paraguay, Argentina (Misiones).

370. *MANACUS* Brisson, 1760

- * 698. *Manacus manacus gutturosus* (Desmarest) Saltarín garganta blanca.

Pipra gutturosa Desmarest, Hist. Nat. Tang., Manakins et Todiers, livr. 6, 1806, pl. 58. Localidad no especificada.

Manacus manacus gutturosus, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 435.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Paraná), SE. Paraguay, Argentina (Misiones).

371. *SCHIFFORNIS* Bonaparte, 1854

- * 699. *Schiffornis virescens* (Lafresnaye) Saltarín verde.

Muscicapa virescens (no de Temminck, 1824) Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 802. Brasil (Bahía, Arragal da Conquista)

Scotothorus unicolor, Bertoni, An. Soc. Cient. Arg., Vol. 75, 1913, p. 94. Misiones, Iguazú.

Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia **Tyrannidae** (*Papamoscas, Pájaros burlistos*)Subfamilia **Fluvicolinae**372. **AGRIORNIS** Gould, 1839

- * 700. **Agriornis livida fortis** Berlepsch Zorzal mero.
Agriornis livida fortis Berlepsch, Ornith., Vol. 14, 1907, pp. 352, 466. Argentina (Chubut, Valle del Lago Blanco).
Agriornis livida, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 313.
 Distribución. — Chile (Llanquihué hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego, a través de la región andina).
- * 701. **Agriornis microptera microptera** Gould Zozal de campo.
Agriornis microptera Gould en Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Part. 6, 1839, pl. 12, p. 57. Argentina (Santa Cruz, Puerto Deseado y San Julián).
Agriornis striata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 314.
 Distribución. — Uruguay, Argentina (Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fé, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires hasta Tierra del Fuego).
- * 702. **Agriornis microptera andecola** (d'Orbigny) Zorzal de la sierra.
Pepoaza andecola d'Orbigny, Voyage Amér. Mérid., Ois., 1839, p. 351. Bolivia (sur les parties les plus élevés du plateau des Andes).
Agriornis andecola, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 315.
Agriornis microptera andecola, Zimmer, Amer. Mus. Nov., n° 930, 1937, p. 1; A. R. Zotta, EL HORNERO, Vol. 7, n° 2, 1939, p. 248.
 Distribución. — Perú (Puno, Tirapata), Bolivia (Cuchacancha), Argentina (Los Andes, Jujuy, Salta, Catamarca).
- * 703. **Agriornis montana montana** (Lafresnaye et d'Orbigny) Aniero.
Pepoaza montana Lafr. et d'Orb. Syn. Av., Vol. 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 64, Bolivia (Chuquisaca).
Agriornis maritima, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 314.
 Distribución. — E. Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca), Argentina (Jujuy, Tucumán, Catamarca).
- * 704. **Agriornis montana leucura** Gould Gaucho.
Agriornis leucurus Gould en Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Part. 6, 1839, pl. 13. Argentina (Santa Cruz, Puerto Deseado).
Agriornis maritima, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 315.
 Distribución. — Chile (Aconcagua hasta Colchagua), Argentina (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires hasta Santa Cruz).

- * 705. **Agriornis andicola albicauda** (Philippi et Landbeck) Zorzal cola blanca.
Dasycephala albicauda Philippi et Landbeck, Arch. Naturg., Vol. 29, 1863, p. 132.
 Perú, según Philippi.
Agriornis pollens, (ex Lillo) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 314.
 Distribución. — Chile (Tacna), Perú, Ecuador, E. Bolivia, Argentina (Tucumán, Taff Viejo, Aconquija, Cerro Muñoz).
373. XOLMIS Boie, 1826
- * 706. **Xolmis cinerea** (Vieillot) Escarchero, María Blanca.
Tyrannus cinereus Vieillot, Analyse nouv. Ornith. élém., 1816, p. 68, « América Meridional ».
Taenioptera cinerea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 315.
 Distribución. — Brasil (E. Pará, Matto Grosso, Maranhão hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fé, Sgo. del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires).
- * 707. **Xolmis dominicana** (Vieillot) Monjita, Domínico, Padrecito, Nievita.
Tyrannus dominicanus Vieillot, Tabl. enc. méth., Orn., Vol. 2 libr. 93, 1823, p. 856. Paraguay.
Taenioptera dominicana, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 316.
 Distribución. — SE. Brasil (Paraná, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires).
- * 708. **Xolmis coronata** (Vieillot) Animita, Aurora.
Tyrannus coronatus Vieillot, Tabl. enc. méth., Orn., Vol. 2 libr. 93, 1823, p. 855. Paraguay y Río de la Plata.
Taenioptera coronata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 316.
 Distribución. — E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fé, Sgo. del Estero, Corrientes hasta La Pampa y Río Negro).
- * 709. **Xolmis irupero irupero** (Vieillot) Ihrupéró; Monjita, Nievecita.
Tyrannus irupero Vieillot, Tabl. enc. méth., Orn., Vol. 2, libr. 93, 1823, p. 856. Paraguay.
Taenioptera irupero, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 316.
 Distribución. — E. Bolivia, E. Brasil (Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, San Luis, Buenos Aires).

- * 710. **Xolmis murina** (Lafresnaye et d'Orbigny) Tile.
Pepoaza murina Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, p. 63. Argentina (Río Negro).
Taenioptera murina, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 316.
 Distribución. — E. Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Rioja, hasta Chubut).
- * 711. **Xolmis rubetra** (Burmeister) Diucón espalda castaña.
Taenioptera rubetra Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 247. Argentina (Mendoza, entre San Carlos y Totoral).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.
 Distribución. — Argentina (Chubut hasta Mendoza, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).
- * 712. **Xolmis pyrope** (Kittlitz) Carpídora.
Muscicapa pyrope Kittlitz, Mém. Ac. Sci. St. Pétersb., Vol. 1, libr. 2, 1830, p. 191, pl. 10. Chile (Concepción).
Taenioptera pyrope, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 316.
 Distribución. — Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Neuquén hasta Tierra del Fuego a través de los Andes Patagónicos).
374. **MUSCISAXICOLA** Lafresnaye et d'Orbigny, 1837
- * 713. **Muscisaxicola rufivertex rufivertex** Lafresnaye et d'Orbigny Dormilón.
Muscisaxicola rufivertex Lafr. et d'Orb., Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 66. Chile (Antofagasta).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — Chile (Antofagasta hasta Colchagua), Argentina (Mendoza).
- * 714. **Muscisaxicola rufivertex pallidiceps** Hellmayr Dormilona nuca rojiza.
Muscisaxicola rufivertex pallidiceps Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Vol. 13, Part 5, 1927, p. 21. Chile, Antofagasta (cerca de San Pedro).
Muscisaxicola rufivertex, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — Perú (Aconcagua, Arequipa), N. Bolivia, Chile (Tacna, Tarapacá, Antofagasta), Argentina (Salta, Tucumán, Jujuy, Los Andes, Catamarca, Córdoba).
- * 715. **Muscisaxicola albilora** Lafresnaye Dormilona cabeza rojiza.
Muscisaxicola albilora Lafresnaye, Rev. Mag. Zool., Vol. 7, 1855, p. 60. Localidad no determinada, Chile (Santiago) según Bangs et Penard.
 Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, N° 2, 1936, pp. 290-291. Tucumán, Taff Viejo.
 Distribución. — Chile (Aconcagua, Santiago, Colchagua), Bolivia, Perú, S. Ecuador, Argentina (Tucumán, Taff Viejo).

716. **Muscisaxicola juninensis** Taczanowski Dormilona del Perú.
Muscisaxicola juninensis Taczanowski, Orn. Pér., Vol. 2, 1884, p. 214. Perú (Junín).
 Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — S. Perú, N. Clile, Argentina (Jujuy, Maimará ?).
- * 717. **Muscisaxicola flavinucha** Lafresnaye Fraile.
Muscisaxicola flavinucha Lafresnaye, Rev. Mag. Zool., Vol. 7, 1855, pl. 3, p. 59. Chile.
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, N. Chile (Colchagua hasta Antofagasta), Argentina (Los Andes, Salta, Jujuy, Tucumán, por el oeste hasta Santa Cruz).
- * 718. **Muscisaxicola capistrata** (Burmeister) Dormilona cabeza marrón.
Ptyonura capistrata Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 248. Argentina (Mendoza).
Muscisaxicola capistrata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 322.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, Chile, Argentina (por el oeste desde Jujuy, Los Andes, Tucumán hasta Tierra del Fuego).
- * 719. **Muscisaxicola frontalis** (Burmeister) Dormilona frente negra.
Ptyonura frontalis Burmeister, Journ. Orn., Vol. 8, 1860, p. 248. Argentina (Mendoza, Uspallata).
Muscisaxicola frontalis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910.
 Distribución. — Chile (Antofagasta hasta Colchagua). Argentina (Jujuy, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Río Negro).
- * 720. **Muscisaxicola alpina argentina** Hellmayr Dormilona cenicienta.
Muscisaxicola alpina argentina Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 308, Vol. 19, 1932, p. 126. Argentina (Tucumán, Las Parvas).
Muscisaxicola grisea, Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
Muscisaxicola alpina grisea, Zotta, A. R., EL HORNERO, Vol. 6, 1936, p. 291.
 Distribución. — Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).
721. **Muscisaxicola macloviana macloviana** (Garnot) Dormilona de Malvinas.
Sylvia macloviana Garnot, Voyage Coquille, Zool., Vol. 1, 1829, p. 540. Argentina (Islas Malvinas, Puerto Duperrey).
Muscisaxicola macloviana, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — Argentina (Islas Malvinas).
- * 722. **Muscisaxicola macloviana mentalis** Lafresnaye et d'Orbigny Tontito.
Muscisaxicola mentalis Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 66. Argentina (Río Negro, Carmen de Patagones).
Muscisaxicola macloviana, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 321.
 Distribución. — S. Perú, Chile, Argentina (Tierra del Fuego, Patagonia, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos).

- * 723. **Muscisaxicola maculirostris maculirostris** Lafresnaye et d'Orbigny
Tontito pico amarillo.
Muscisaxicola maculirostris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 66. Bolivia (La Paz).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 322.
Muscisaxicola brumea, Dabbene, Ibid., p. 322.
Distribución. — S. Perú, Bolivia, Chile (Cautín hasta Tacna), Argentina (por el oeste desde Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca hasta Río Negro, Chubut y Santa Cruz).
- * 724. **Muscisaxicola fluviatilis** Selater et Salvin
Dormilón chico.
Muscisaxicola fluviatilis Selater et Salvin, P. Z. S. Lond., 1866, p. 187. Perú (Ucayali).
Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 338.
Distribución. — Perú, Bolivia, Argentina (Tucumán).

375. LESSONIA Swainson, 1832

- * 725. **Lessonia rufa rufa** (Gmelin)
Sobrepuesto, Negrito.
Alauda rufa Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, (2), 1789, p. 792, basado en Daubenton, Pl. Enl., 738, fig «1» (= 2) y en Buffon «Alouette noire, à dos fauve», Buenos Aires, coll. Commerson.
Lessonia nigra, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 323.
Distribución. — Brasil (Río Grande do Sul), Uruguay, Chile (Copiapó hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Formosa, Salta, Tucumán, hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).
- * 726. **Lessonia rufa oreas** (Sc Slater et Salvin)
Colegial, Animita.
Centrites oreas Sc Slater et Salvin, P. Z. S. Lond., 1869, p. 154. Perú (Cuzco).
Lessonia oreas, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 323.
Distribución. — S. Perú, W. Bolivia, N. Chile, Argentina (Jujuy, Catamarca).

376. MYIOTHERETES Reichenbach, 1850

- * 727. **Myiotheretes striaticollis pallidus** Berlepsch
Solitario.
Myiotheretes striaticollis pallidus Berlepsch, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 16, 1906, p. 98
Argentina (Tucumán, Norco).
Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 315.
Distribución. — S. Perú, W. Bolivia, Argentina (Tucumán, Salta).

377. NEOXOLMIS Hellmayr, 1927

- * 728. **Neoxolmis rufiventris** (Vieillot)
Pájaro bobo
Tyrannus rufiventris Vieillot, Tabl. enc. méth., Orn. Vol. 2, livr. 93, 1823, p. 856.
Uruguay (Montevideo).
Myiotheretes rufiventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 315.
Distribución. — Uruguay, Chile (Magallanes), Argentina (Misiones?, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos hasta Tierra del Fuego).

378. OCHTHOECA Cabanis, 1847

* 729. *Ochthoeca oenanthoides oenanthoides* (Lafresnaye et d'Orbigny) Pitajo.

F(luicola)oenanthoides Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 60. Bolivia (La Paz).

Muscisaxicola morenoi Bruch, Rev. Mus. La Plata, Vol. 11, 1904, p. 258. Argentina (Jujuy, Santa Catalina).

Ochthoeca oenanthoides, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.

Distribución. — S. Perú, W. Bolivia, Chile (Tacna), Argentina (Jujuy, Tucumán).

* 730. *Ochthoeca leucophrys tucumana* Berlepsch Pitajo gris.

Ochthoeca leucophrys tucumana Berlepsch, Bull. Brit. Orn., Cl., Vol. 16, 1906, p. 98. Argentina (Tucumán).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.

Distribución. — Argentina (Tucumán, Catamarca, La Rioja).

379. SAYORNIS Bonaparte, 1854

* 731. *Sayornis nigricans latirostris* (Cabanis et Heine) Negro.

Aulanax latirostris Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 68. Bolivia.

Sayornis nigricans cineracea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 346.

Distribución. — N. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán).

380. COLONIA J. E. Gray, 1829

* 732. *Colonia colonus colonus* (Vieillot) Coludo frente blanca.

Muscicapa colonus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd. Vol. 21, 1818, p. 448. Paraguay.

Copurus colonus colonus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 320.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Santa Catharina, Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones).

381. GUBERNETES Such., 1825

* 733. *Gubernetes yetapa yetapa* (Vieillot) Gallito, Yipirú.

Muscicapa yetapa Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 460. Paraguay.

Gubernetes yetapa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 318.

Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Matto Grosso, hasta São Paulo), Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco).

382. ALECTRURUS Vieillot, 1816

- * 734. **Alectrurus tricolor** (Vieillot) Gwihrá-dyetapá.
Gallita tricolor Vieillot, Analyse nouv. Orn. élém., 1816, p. 68. « l'Amérique méridionale » = Paraguay.
Alectrurus tricolor, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 318.
 Distribución. — Brasil (Bahía, Minas Geraës, Matto Grosso hasta Paraná), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes).

383. YETAPA Lesson, 1831

- * 735. **Yetapa risora** (Vieillot) Tijereta de las pajas, Cola-yietapá, Yetapá.
Muscicapa risora Vieillot (et Oudart), Galerie Ois., Vol. 1, 1824, pl. 131, p. 209. Brasil.
Alectrurus risorius, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 318.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, N. Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, San Luis).

384. KNIPOLEGUS Boie, 1826

- * 736. **Knipolegus aterrimus aterrimus** (Kaup) Viudita de la Sierra.
Knipolegus aterrimus (sic) Kaup., Journ. Orn., Vol. 1, 1853, p. 29, basado en *Fluvicola nigerrima* (no *Muscicapa nigerrima* Vieillot) Lafresnaye et d'Orbigny y *Ada nigerrima* d'Orbigny part. Bolivia (Ayupaya, Cochabamba, Chiquisaca).
Knipolegus anthracinus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.
 Distribución. — E. Bolivia (Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija), Argentina (Jujuy, Salta, hasta Chubut, por el oeste hasta Buenos Aires y Entre Ríos).
- * 737. **Knipolegus cyanirostris** (Vieillot) Viudita.
Muscicapa cyanirostris Vieillot, Nouv. Dist. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 447. Paraguay.
Knipolegus cyanirostris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.
 Distribución. — Brasil (Matto Grosso, S. Goyaz, Minas Geraës hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa).
- * 738. **Knipolegus cabanisi** (Schulz) Viudita grande.
Knipolegus cabanisi (sic) Schulz, Journ. Orn., Vol. 30, 1882, p. 462. Argentina (Tucumán, cerca de Sauciyaca y Chaquebil).
Knipolegus cabanisi Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.
 Distribución. — S. Perú? Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

385. PHAEOTRICCUS Ridgway, 1905

- * 739. **Phaeotriccus hudsoni** (Selater) Remoloncito.

Cripolegus hudsoni (sic) Selater, P. Z. S. Lond., 1872, p. 541, pl. 31. Argentina (Río Negro).

Knipolegus hudsoni, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.

Distribución. — Bolivia (Santa Cruz), Argentina (Río Negro, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos).

386. ENTOTRICCUS Wetmore et Peters, 1923

- * 740. **Entotriccus striaticeps** (Lafresnaye et d'Orbigny) Viudita chica.

Muscisaxicola striaticeps Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 66. Bolivia (La Paz = Chiquitos).

Knipolegus striaticeps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Córdoba, La Rioja).

387. HYMENOPS Lesson, 1828

- * 741. **Hymenops perspicillata perspicillata** (Gmelin) Pico de plata.

Motacilla perspicillata Gmelin, Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 969, basado en Buffon « Le Clignot », Uruguay (Montevideo).

Lichenops perspicillata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 319.

Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Neuquén, La Pampa, Buenos Aires hasta Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Salta y Jujuy).

- * 742. **Hymenops perspicillata andina** Ridgway Runrún.

Lichenops perspicillata, *B. andinus* Ridgway, Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. 1, «1878», p. 483, 1879. Chile.

Himenops perspicillata andina Peters, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 65, 1923, p. 236.

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Valdivia), Argentina (W. Chubut, Río Negro).

388. MUSCIPIPRA Lesson, 1831

743. **Muscipipra vetula** (Lichtenstein) Papa mosca.

Muscicapa vetula Lichtenstein, Verz. Dubl. Berliner Mus., 1823, p. 53. Brasil (São Paulo).

Muscipripa vetula, Dabbene (ex Bertoni), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 433.

Distribución. — Brasil (S. Minas Geraës hasta Santa Catharina), Paraguay, Argentina (Misiones).

389. FLUVICULA Swainson, 1827

- * 744. **Fluvicola pica albiventer** (Spix) Viudita, Burlistito del agua.

Muscicapa albiventer Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, pl. 30, fig. 1, p. 21, Brasil.

Fluvicola albiventer, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.

Distribución. — SE. Perú, Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Amazonas, S. Pará, Ceará, Piahuay, Bahía), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Tucumán, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Buenos Aires).

390. ARUNDINICOLA d'Orbigny, 1839

- * 745. **Arundinicola leucocephala** (Linné). Lavandera.

Pipra leucocephala Linné, Mus. Ad. Frid., Vol. 2, Prodr., 1764, p. 33. Localidad no indicada.

Arundinicola leucocephala, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.

Distribución. — Trinidad, Venezuela, Colombia, Guayanas, Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Corrientes).

391. PYROCEPHALUS Gould, 1839

- * 746. **Pyrocephalus rubinus rubinus** (Boddaert) Churrinche, Brasita de fuego.

Muscicapa rubinus Boddaert, Tabl. Pl. enl., 1783, p. 42, basado en Daubenton, Pl. enl. 675, fig. 2, y en Buffon, « Le Rubin, de la rivièrre des Amazones ».

Pyrocephalus rubinus rubinus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 343.

Distribución. — Brasil, S. Colombia, N. Perú, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Río Negro).

392. SATRAPA Strickland, 1844

- * 747. **Satrapa icterophrys hellmayri** (Chubb) Amarillo del norte.

Sisopygis hellmayri Chubb, Bull. Brit. Orn. Cl., Vol. 29, 1907, p. 63. Bolivia (Tapacari, Dept. Cochabamba).

Satrapa icterophrys hellmayri, Zotta A. R., EL HORNERO, Vol. 7, 1939, p. 249.

Distribución. — Bolivia (Cochabamba hasta W. Tarija), Argentina (Jujuy, Maimará, Guerrero).

- * 748. **Satrapa icterophrys icterophrys** (Vieillot) Amarillo.

Muscicapa icterophrys Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 1, 1818, p. 458. Paraguay.

Sisopygis icterophrys, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 236.

Distribución. — S. Venezuela, Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el N., Salta?, hasta Buenos Aires).

393. MACHETORNIS Gray, 1837

- * 749. **Machetornis rixosa rixosa** (Vieillot) Pica-buey, Ovejero, Matadura, Domador.
Tyrannus rixosus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819, p. 85.
 Paraguay.
Machetornis rixosa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 320.
 Distribución. — E. Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Córdoba y Buenos Aires).

Subfamilia Tyranninae

394. MUSCIVORA Lacépède, 1799

- * 750. **Muscivora tyrannus tyrannus** (Linné) Tijereta.
Muscivora tyrannus Linné, Syst. Nat., 12th ed., Vol. 1, 1766, p. 325, basado en *Tyrannus cauda bifurca* Brisson, Orn., Vol. 2, pl. 39, fig. 3, p. 395. Guayana Francesa (Cayena).
Muscivora tyrannus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 349.
 Distribución. — Trinidad, Guayanas, S. Colombia, SW. Venezuela, E. Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Buenos Aires y La Pampa).

395. TYRANNUS Lacépède, 1799

- * 751. **Tyrannus melancholicus melancholicus** Vieillot Benteveo real, Suirirí-guasú.
Tyrannus melancholicus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819, p. 84. Paraguay.
Tyrannus melancholicus melancholicus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 349.
 Distribución. — Venezuela, Guayanas, Brasil, E. Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro).

396. EMPIDONOMUS Cabanis et Heine, 1859

- * 752. **Empidonomus varius varius** (Vieillot) Tuquito.
Muscivora varia Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 458. Paraguay.
Empidonomus varius, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 348.
 Distribución. — E. Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Argentina (La Rioja, Tucumán, Sgo. del Estero, Misiones, Entre Ríos, San Luis, La Pampa).

- * 753. *Empidonomus aurantio-atro-cristatus aurantio-atro-cristatus* (Lafresnaye et d'Orbigny) Tuc, Churí, Yaguarasapá.

Tyrannus aurantio-atro-cristatus Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 45. Bolivia (Valle Grande).

Empidonomus aurantio-atro-cristatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 348.

Distribución. — Brasil (Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, São Paulo, hasta Río Grande do Sul), S. Venezuela, S. Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Jujuy, Salta, Chaco, Misiones, hasta Mendoza, La Pampa, Buenos Aires).

397. LEGATUS Sclater, 1859

- * 754. *Legatus leucophaeus leucophaeus* (Vieillot) Burlisto de corona.

Platyrhynchus leucophaeus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 27, 1818, p. 11, « L'Amérique méridionale » = Guayana Francesa (Cayena).

Legatus albicollis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 340.

Distribución. — Nicaragua, hasta Panamá, por toda la América del Sur hasta Bolivia, Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Misiones).

398. SIRYSTES Cabanis et Heine, 1859

- * 755. *Sirystes sibilator sibilator* (Vieillot) Papamosca cabeza negra.

Muscicapa sibilator Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 457. Paraguay.

Sirystes sibilator, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 345.

Distribución. — Brasil (Bahía, Goyaz, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

399. MYIODINASTES Bonaparte, 1857

- * 756. *Myiodynastes solitarius* (Vieillot) Benteveo chico, Huequero.

Tyrannus solitarius Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819, p. 88. Paraguay.

Myiodynastes solitarius, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 238.

Distribución. — Guayana Inglesa, Brasil, S. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa).

400. MEGARYNCHUS Thunberg, 1824

- * 757. *Megarynchus pitangua pitangua* (Linné) Pihtaguá-guasú.

Lanius pitangua Linné, Syst. Nat., 12 th ed., Vol. 1, 1766, p. 136, basado en Brisson (ex Marcgrave). E. Brasil.

Megarynchus pitangua, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 434.

Distribución. — Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayanas, E. Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

401. *CONOPIAS* Cabanis et Heine, 1859

* 758. *Conopias trivirgata trivirgata* (Wied) Benteveo de corona blanca.

Muscicapa trivirgata Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 871. Brasil (Bahía).

Conopias trivirgata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 341.

Distribución. — SE. Brasil (Bahía hasta São Paulo), Paraguay, Argentina (Misiones).

402. *MYIOZETETES* Sclater, 1859

* 759. *Myiozetetes similis similis* (Spix) Ben-te-vi-zinho.

Muscicapa similis Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, p. 18. Brasil (Amazonas).

Myiozetetes similis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 344.

Distribución. — Brasil, S. Colombia, S. Venezuela, E. Ecuador, E. Perú, Paraguay, Argentina (Misiones).

403. *PITANGUS* Swainson, 1826

* 760. *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Lafresnaye) Benteveo, Pito Juan.

Saurophagus bolivianus Lafresnaye, Rev. Mag. Zool., Vol. 4, 1852, p. 463. Bolivia (Chuquisaca).

Pitangus sulphuratus bolivianus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 341.

Distribución. — Bolivia, S. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Buenos Aires, San Luis, Mendoza).

Subfamilia *Myiarchinae*

404. *MYIARCHUS* Cabanis, 1844

* 761. *Myiarchus tyrannulus tyrannulus* (Müller) Burlisto ala marrón.

Muscicapa Tyrannulus P. L. S. Müller, Natursyst., Suppl., 1776, p. 169, basado en Daubeton, Pl. enl. 571, fig. 1. Guayana Francesa (Cayena).

Myiarchus tyrannulus chlorepsciscus Berlepsch et Leverkühn, Ornith., Vol. 6, 1890, p. 16. Brasil (Matto Grosso, Cuyabá) y Bolivia (Guayayos, San Miguel).

Myiarchus tyrannulus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 348.

Distribución. — Guayanas, I. Trinidad, I. Margarita, N. Colombia, Venezuela, E. Perú, Brasil (parte central y Matto Grosso), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca).

- * 762. *Myiarchus swainsoni ferocior* Cabanis Burlisto pico crema.
Myiarchus ferocior Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 214. Argentina (Tucumán, San Javier).
Myiarchus ferox, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 348.
Myiarchus pelzelni (no de Berlepsch) Wetmore, Bull. U. S. Nat., Mus. Vol. 133, 1926, p. 336.
 Distribución. — E. Perú, Bolivia (Santa Cruz), Uruguay, Argentina (La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Tucumán, Salta, La Rioja), emigrando hacia Perú y Colombia.
- * 763. *Myiarchus swainsoni swainsoni* Cabanis et Heine Irré.
Myiarchus swainsoni Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 72. Brasil.
Myiarchus swainsoni Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 242, Vol. 13, 1927, p. 174. Misiones (Eldorado, Iguazú, río Paraná).
 Distribución. — Colombia, Venezuela, Guayanas como emigrante, E. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).
- * 764. *Myiarchus ferox australis* Hellmayr Irré común
Myiarchus ferox australis Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 242, Vol. 13, 1927, p. 177. Brasil (Minas Geraës, Agua Suja).
Myiarchus ferox swainsoni (no de Cab. et Hiene) Wetmore, Bull. U. S. Nat. Mus., Vol. 133, 1926, p. 336.
 Distribución. — Colombia, Venezuela, E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso, Minas Geraës, Espírito Santo, hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Formosa, Tucumán, Chaco, E. Santa Fé, Buenos Aires).
- * 765. *Myiarchus tuberculifer atriceps* Cabanis Tristón.
Myiarchus atriceps Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 215. Argentina (Tucumán, San Javier).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 348.
 Distribución. — Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).
405. MYIOCHANES Cabanis et Heine, 1855 (1)
- * 766. *Myiochanes cinereus cinereus* (Spix) Abubilla.
Platyrrhynchus cinereus Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, pl. 13, fig. 2, p. 11. Brasil (Río de Janeiro).
Myiochanes cinereus cinereus Hellmayr, Field Mus. Nat. Zool. Series, Publ. 242, Vol. 13, 1927, p. 193. Brasil (Bahía, São Marcello).
 Distribución. — S. E. Brasil (Minas Geraës hasta Paraná), Paraguay, Argentina (Misiones).
- * 767. *Myiochanes cinereus pallescens* Hellmayr Frailecillo de cabeza negra.
Myiochanes cinereus pallescens Hellmayr, Field Mus. Nat. Zool. Series, Publ. 242, Vol. 13, 1927, p. 194. Brasil (Bahía, São Marcello).

(1) *Myiochanes brachytarsus* (Scl.) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 346, no habita en la Argentina, su distribución se extiende desde el SE. de Mejico hasta Panamá.

Myiochanes cinereus subsp. *pileatus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 347.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Pernambuco, Matto Grosso), N. Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

* 768. *Myiochanes fumigatus brachyrhynchus* (Cabanis) Frailecillo copetón.

Contopus brachyrhynchus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 214. Argentina (Tucumán).

Myiochanes fumigatus subsp. *brachyrhynchus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 347. Argentina (Tucumán).

Distribución. — Argentina (Jujuy?, Salta?, Tucumán).

406. EMPIDONAX Cabanis, 1855

769. *Empidonax traillii traillii* (Audubon) Burlisto americano.

Muscicapa traillii Audubon, Birds America, folio ed., Vol. 1, pl. 45, 1828.

Empidonax traillii traillii Hellmayr, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Series, Publ. 242, Vol. 13, 1927, p. 208, Salta (Embarcación).

Distribución. — América del Norte, emigrando hacia Centro y Sudamérica hasta Argentina (Salta, Embarcación), como emigrante.

* 770. *Empidonax euleri euleri* (Cabanis) Papa mosca.

Empidonax Euleri Cabanis, Journ. Orn., Vol. 16, 1868, p. 195. Brasil, (Río de Janeiro Cantagallo).

Empidonax Euleri, Dabbene (ex Venturi), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 344.

Distribución. — Brasil (Amazonas, Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (Misiones).

* 771. *Empidonax euleri argentinus* (Cabanis) Guacara.

Empidonax argentinus Cabanis, Journ. Orn., Vol. 16, 1868, p. 196. Argentina (Buenos Aires).

Empidonax argentinus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 344.

Distribución. — W. Paraguay, Perú, Argentina (Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires).

407. CNEMOTRICCUS Hellmayr, 1927

* 772. *Cnemotriccus fuscatus bimaculatus* (Lafresnaye et d'Orbigny)

Guacara vuçu

Muscipeta bimaculata Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 48. Bolivia (Yungas).

Empidonax fuscatus bimaculatus, Hartert et Venturi, Nov. Zool., Vol. 16, 1909, p. 202. Argentina (Santa Fe, Ocampo).

Distribución. — E. Brasil (Ceará, Piauí, Goyaz, Matto Grosso, Bahía, hasta Santa Catharina), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Santa Fé).

408. PYRRHOMYIAS Cabanis et Heine, 1859

* 773. *Pyrrhomyias cinnamomea cinnamomea* (Lafresnaye et d'Orbigny)

Mosqueta castaño.

Muscipeta cinnamomea Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 49. Bolivia (Yungas).

Pyrrhomyias cinnamomea, Dabbene (ex Lillo), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 343, Physis, Vol. 1, 1914, p. 345.

Distribución. — S. Perú, Bolivia, Argentina (Tucumán).

409. MYIOPHOBUS Reichenbach, 1850

* 774. *Myiophobus fasciatus flammiceps* (Temminck)

Mosqueta.

Muscicapa flammiceps Temminck, Nouv. Rec. Pl. col., 1822, livr. 24, pl. 144, fig. 3, Brasil (Río de Janeiro).

Myiophobus fasciatus auriceps Ridgway, Bull. U. S. Nat. Mus., Vol. 50, Part 14, 1907, p. 543. Argentina.

Myiophobus fasciatus fasciatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 343.

Distribución. — Brasil (Pará, Matto Grosso, por el este hasta Bahía y Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Jujuy, Formosa, Misiones hasta Buenos Aires a través de Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos).

410. HIRUNDINEA Lafresnaye et d'Orbigny, 1837

* 775. *Hirundinea bellicosa bellicosa* (Vieillot)

Birro.

Tyrannus bellicosus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819, p. 74. Paraguay.

Hirundo bellicosa, Menegaux, Rev. Franc. d'Ornit., Vol. 10, 1918, p. 334. Misiones.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Ceará hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

* 776. *Hirundinea bellicosa pallidior* Harter et Goodson

Golondrina de las cruces.

Hirundinea bellicosa pallidior Hartert et Goodson, Nov. Zool., Vol. 24, 1917, p. 411. Argentina (Salta, Cachí).

Hirundinea bellicosa, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 342.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba).

Subfamilia *Platyrrinchinae*

411. PLATYRINCHUS Desmarest, 1805

* 777. *Platyrrinchus mystaceus mystaceus* Vieillot

Pico chato.

Platyrhynchus (us) mystaceus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 27, 1818, p. 14. Paraguay.

Platyrinchus mystaceus, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 98.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

412. *TOLMOMYIAS* Hellmayr, 1927

- * 778. *Tolmomyias sulphurescens sulphurescens* (Spix) Pico chato verdoso.

Platyrrhynchus sulphurescens Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, pl. 12, fig. 1, p. 10. Brasil (Río de Janeiro).

Rhynchocyclus sulphurescens, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 324.

Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro, Minas Geraës, S. Goyaz hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán).

- * 779. *Tolmomyias megalcephalus* (Swainson) Pico chato cabezón.

Tyrannula megalcephala Swainson, Orn. Draw., Part 4, 1836, pl. 47 (?). Brasil.

Rhynchocyclus megalcephalus, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 194.

Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso, São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

Subfamilia *Euscarthminae*413. *EUSCARTHORNIS* Oberholser, 1923

- * 780. *Euscarthmornis plumbeiceps plumbeiceps* (Lafresnaye) Ferreirino.

Todirostrum plumbeiceps Lafresnaye, Rev. Zool., Vol. 9, 1846, p. 361. Paraguay.

Euscarthmus gularis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 339.

Distribución. — Brasil (Espíritu Santo, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Corrientes?).

- * 781. *Euscarthmornis plumbeiceps viridiceps* (Salvadori) Papa sebo.

Euscarthmus viridiceps Salvadori, Boll. Mus. Zool. Torino, Vol. 12, N° 292, 1897, p. 12. Argentina, Jujuy (San Lorenzo).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 325.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta).

- * 782. *Euscarthmornis margaritaceiventer margaritaceiventer* (Lafr. et d'Orb.)

Papa sebo, garganta gris.

Todirostrum margaritaceiventer Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 46. Bolivia, (Chiquitos).

Euscarthmus margaritaceiventer margaritaceiventer, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 325.

Distribución. — Perú, S. Brasil (Matto Grosso, Goyaz, hasta Río Grande do Sul), Bolivia, Paraguay, Argentina (Salta, Jujuy, Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos).

414. MYIORNIS Bertoni, 1901

- * 783. *Myiornis auricularis* (Vieillot) Orejudito.
Platyrrhynchos auricularis Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 27, 1818,
 p. 16. Brasil (Río de Janeiro).
Orchilus pyrrhotis, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 339.
 Distribución. — Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina
 (Misiones).

415. HEMITRICCUS Cabanis et Heine, 1859

- * 784. *Hemitriccus diops diops* (Temminck) Raterito
Muscicapa diops Temminck, Nouv. Rec. Pl. col. livr. 24, 1822, pl. 144, fig. 1. Brasil
 (São Paulo, Ypanema).
Hemitriccus diops, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 339.
 Distribución. — SE. Brasil (Espíritu Santo hasta Paraná), Paraguay, Argentina
 (Misiones?).

416. POGONOTRICCUS Cabanis et Heine, 1859

- * 785. *Pogonotriccus eximius* (Temminck) Verdón.
Muscicapa eximia Temminck, Nouv. Rev. Pl. Col. livr. 24, 1822, pl. 144, fig. 2. Brasil
 (São Paulo, Ypanema).
Pogonotriccus eximius, Dabbene (ex Bertoni), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires,
 Vol. 18, 1910, p. 329.
 Distribución. — S. Brasil (Río de Janeiro hasta Paraná), Paraguay, Argentina
 (Misiones).

417. LEPTOTRICCUS Cabanis et Heine, 1859

- * 786. *Leptotriccus sylviolus* Cabanis et Heine Barriga gris.
Leptotriccus sylviolus Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 54. Brasil.
 Dabbene (ex Bertoni), An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 329.
 Distribución. — SE. Brasil (Río de Janeiro), Paraguay, Argentina (Misiones?).

418. PHYLLOSCARTES Cabanis et Heine, 1859

- * 787. *Phylloscartes ventralis ventralis* (Temminck). Ligerito.
Muscicapa ventralis Temminck, Nouv. Rec. Pl. col., 1824. livr. 46, pl. 275, fig. 2,
 Brasil (São Paulo, Ypanema).
Phylloscartes ventralis ventralis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol.
 18, 1910, p. 326.
 Distribución. — S. E. Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay,
 Uruguay, Argentina (Misiones, Entre Ríos).

- * 788. **Phylloscartes ventralis angustirostris** (Lafresnaye et d'Orbigny) Asustado.
Muscicapa angustirostris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 52. Bolivia (Yungas).
Phylloscartes ventralis angustirostris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 326.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja).
- * 789. **Phylloscartes paulistus** Ihering et Ihering Ligerito del Brasil.
Phylloscartes paulista Ihering et Ihering, Cat. Faun. Braz., Vol. 1, 1907, p. 272. Brasil (São Paulo, Fazenda).
 Distribución. — SE. Brasil (São Paulo), Paraguay (Puerto Bertoni, Alto Paraná), Argentina (Iguazú?).

419. CAPSIEMPIS Cabanis et Heine, 1859

- * 790. **Capsiempis flaveola flaveola** (Lichtenstein) Tirano.
Muscicapa flaveola Lichtenstein, Verz. Dubl. Berliner Mus., 1823, p. 56. Brasil (Bahía).
Capsiempis flaveola, Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 342.
 Distribución. — Venezuela, Guayanas, E. Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina (Misiones).

420. EUSCARTHMUS Wied, 1831

- * 791. **Euscarthmus meloryphus meloryphus** Wied Enano copetón.
Euscarthmus meloryphus Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 947. Brasil (Minas Geraës y Bahía).
Hapalocercus meloryphus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 328.
 Distribución. — SE. Colombia, E. Venezuela, E. Bolivia, E. Brasil, Paraguay, Argentina (Salta, Tucumán, Chaco, Córdoba, Entre Ríos).

421. PSEUDOCOLOPTERYX Lillo, 1905

- * 792. **Pseudocolopteryx dinellianus** Lillo Doradito.
Pseudocolopteryx dinellianus Lillo, Rev. Letr. Cienc. Soc., Vol. 3, 1905, p. 48. Argentina (Tucumán, cerca de la Cap. de Tucumán).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 327.
 Distribución. — Argentina (Tucumán).
- * 793. **Pseudocolopteryx sclateri** (Oustalet) Doradito copetón.
Anaeretes sclateri Oustalet, Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., París, Vol. 4, 1892, p. 217.
 « Chile », = error, Argentina (Buenos Aires).
Pseudocolopteryx sclateri sclateri Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 327.
 Distribución. — Trinidad, Guayana Inglesa, Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (Formosa, Chaco, Sgo. del Estero, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires).

- * 794. *Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater et Salvin) Pillo.
Hapalocercus acutipennis Sclater et Salvin, P. Z. S. Lond., 1873, p. 187. Colombia, (Bogotá) y Perú (Cosnipata).
Myiosympotes acutipennis, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 328.
 Distribución. — W. de la América del Sur, desde Colombia hasta Bolivia y Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba).
- * 795. *Pseudocolopteryx flaviventris* (Lafresnaye et d'Orbigny). Piojito amarillo.
Alecturus flaviventris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., Vol. 1, in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 55. Argentina (Corrientes).
Myiosympotes flaviventris, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 328.
 Distribución. — Chile (Santiago hasta Valdivia), Paraguay (Chaco), Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes).

422. CULICIVORA Swainson, 1827

- * 796. *Culicivora caudacuta* (Vieillot) Piojito coludo.
Muscicapa caudacuta Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 455. Paraguay.
Culicivora stenura, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 329.
 Distribución. — SE. Brasil (Matto Grosso hasta Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé).

Subfamilia Serpophaginae

423. TACHURIS Lafresnaye, 1836

- * 797. *Tachuris rubrigastra rubrigastra* (Vieillot) Siete colores de laguna.
 Papa-pirí.
Sylvia rubigastra (err. typ.) Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 277. Paraguay y Argentina (Buenos Aires).
Cyanotis rubrigaster, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 331.
 Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Llanquihué), Paraguay, SE. Brasil (São Paulo hasta Río Grande do Sul), Uruguay, Argentina (Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Chubut hasta Santa Cruz).
- * 798. *Tachuris rubrigastra alticola* (Berlepsch et Stolzmann) Siete colores de laguna del norte.
Cyanotis rubrigastra alticola Berlepsch et Stolzmann, P. Z. S. Lond., 1896, p. 361. Perú (Lago Junín, Ingapirca).
Tachuris rubrigastra alticola, Zotta A. R., EL HORNERO, Vol. 7, N° 1, 1938, pp. 62-63. Argentina (Jujuy, Volcán).
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, NW. Argentina (Jujuy, Volcán).

424. SPIZITORNIS Oberholser, 1920

- * 799. **Spizitornis parulus parulus** (Kittlitz) Torito.
Muscicapa parulus Kittlitz, Mém. Acad. Sci. St. Pétersb., Vol. 1, livr. 2, 1830, pl. 9, p. 190. Chile (Concepción y Valparaíso).
Spizitornis parulus patagonicus Peters, Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. 65, 1923, p. 324.
 Distribución. — Chile (Copiapó hasta la Isla Chiló), Argentina (Neuquén).
- * 800. **Spizitornis parulus lippus** Wetmore Pelitoparado.
Spizitornis parulus lippus Wetmore, Univ. Calif. Publ. Zool., Vol. 21, 1923, p. 336.
 Chile (Islas Evans y Owens).
Anaeretes parulus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 331.
 Distribución. — Chile (Aysen, hasta Magallanes), Argentina (Tierra del Fuego).
- * 801. **Spizitornis parulus patagonicus** Hellmayr Cachudita.
Spizitornis parulus patagonicus Hellmayr, Arch. Naturg., Vol. 85, A, Heft. 10, 1920, p. 51. Argentina (Neuquén).
Anaeretes parulus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 331.
 Distribución. — Argentina (Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chubut, N. Santa Cruz).
- * 802. **Spizitornis parulus aequatorialis** (Berlepsch et Taczanowski) Cuernito.
Anaeretes parulus aequatorialis Berlepsch et Taczanowski, P. Z. S. Lond., 1884, p. 296.
 Ecuador (Cechce).
Anaeretes parulus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 331.
 Distribución. — Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Tucumán).
- * 803. **Spizitornis flavirostris flavirostris** (Selater et Salvin) Cachudita pico amarillo.
Anaeretes flavirostris Selater et Salvin, P. Z. S. Lond., 1876, p. 355. Bolivia (Yungas, Tilotilo).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 331.
 Distribución. — Perú, Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro).

425. STIGMATURA Selater et Salvin, 1866

- * 804. **Stigmatura budytoides inzonata** Wetmore et Peters Calandrita.
Stigmatura budytoides inzonata Wetmore et Peters, Proc. Biol. Soc. Wash., Vol. 36, 1923, p. 143. Argentina (Tucumán, Tapia).
Stigmatura budytoides, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 329.
Stigmatura flavo-cinerea Dabbene, Ibid., p. 330.
 Distribución. — S. Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Sgo. del Estero).

- * 805. **Stigmatura budytoides flavocinerea** (Burmeister) Rabicano.
Phylloscartes flavo-cinereus Burmeister, Reise La Plata St., Vol. 2, 1861, p. 455. Argentina (Mendoza, Uspallata).
Stigmatura flavo-cinerea, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 330.
 Distribución. — Argentina (Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Río Negro).

426. SERPOPHAGA Gould, 1839

- * 806. **Serpophaga subcristata** (Vieillot) Piojito, Saquecito, Turí-turí.
Sylvia subcristata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 229. Paraguay.
Serpophaga subcristata Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 330.
 Distribución. — E. Brasil (Piauhy, Pernambuco hasta Río Grande do Sul), E Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Río Negro).
- * 807. **Serpophaga munda** Berlepsch Chinchurisa.
Serpophaga munda Berlepsch, Orn.Monatsber, Vol. 1, 1893, p. 12. Bolivia (Santa Cruz).
 Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 330.
 Distribución. — E. Bolivia, Brasil (Matto Grosso), Paraguay, Argentina (por todo el norte hasta La Pampa).
- * 808. **Serpophaga nigricans** (Vieillot) Piojito gris, Obscurito.
Sylvia nigricans Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 204. Paraguay.
Serpophaga nigricans, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 330.
 Distribución. — S. Brasil (Minas Geraes Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Uruguay, Argentina (por todo el norte hasta Río Negro).

427. MECOCERCULUS Selater, 1862

- * 809. **Mecocerculus leucophrys leucophrys** (Lafresnaye et d'Orbigny) Piojito cejas blancas.
Muscicapa leucophrys Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2, 1837, p. 53. Bolivia.
Mecocerculus leucophrys, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 317.
 Distribución. — S. Perú, Bolivia, Argentina (Salta, Tucumán, Catamarca).

428. COLORHAMPHUS Sundevall, 1872

- * 810. **Colorhamphus parvirostris** (Darwin) Viudita.
Myiobius parvirostris Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, Part 9, 1839, p. 48. Tierra del Fuego, « Banks of the La Plata » (errore), y Chile (cerca de Valparaíso).

Colorhamphus parvirostris, Zotta, A. R. EL HORNERO, Vol. 7, 1939, p. 251.

Distribución. — Chile (Aconcagua hasta Tierra del Fuego), Argentina (Neuquén, Río Negro hasta Tierra del Fuego a través de los Andes patagónicos).

Subfamilia **Elaeniinae**

429. ELAENIA Sundevall, 1835

- * 811. **Elaenia flavogaster flavogaster** (Thunberg) Bentevi miudo.
Pipra flavogaster Thunberg, Mém. Ac. Sci. St. Pétersb., Vol. 8, 1822, p. 286. Brasil (Río de Janeiro).
Elaenia martinica flavogastra, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 338.
 Distribución. — Isla Tobago, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guayanas hasta el E. Bolivia y Argentina (Misiones, Santa Fé, Tucumán).
- * 812. **Elaenia spectabilis** (Pelzeln) Afrechero grande.
Elainea spectabilis Pelzeln, Orn. Bras., Vol. 2, 1868, p. 107, 176. Brasil (Goyaz).
Elaenia flavogastra, Lillo, Apunt. Hist. Nat., Vol. 1, 1909, p. 41.
 Distribución. — Perú, S. Brasil, Bolivia, Argentina (Tucumán, Corrientes).
- * 813. **Elaenia albiceps chilensis** Hellmayr Ffo-ffo.
Elaenia albiceps chilensis, Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., Vol. 13, Part 5, 1927, p. 413. Chile (Curacautin, Malleco).
Elaenia albiceps Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 338.
 Distribución. — Chile (Atacama hasta el Estrecho de Magallanes), Argentina (Catamarca, Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos hasta Tierra del Fuego e Isla de los Estados).
- * 814. **Elaenia parvirostris** (Pelzeln) Afrechero.
Elainea parvirostris Pelzeln, Orn. Bras., Vol. 2, 1868, p. 107, 178. Brasil (Paraná, Curytiba).
Elaenia parvirostris, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1919, p. 237.
 Distribución. — Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil, E. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis).
- * 815. **Elaenia mesoleuca** (Cabanis et Heine) Verdecito.
Elainea mesoleuca Cabanis et Heine, Mus. Hein., Vol. 2, 1859, p. 60. Brasil (Río Grande do Sul).
Elaenia mesoleuca, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 339.
 Distribución. — E. Brasil (Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Santa Fé).
- * 816. **Elaenia strepera** (Cabanis) Ceniciento.
Elainea strepera Cabanis, Journ. Orn., Vol. 31, 1883, p. 215. Argentina (Tucumán).
Elaenia strepera, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 339.
 Distribución. — Venezuela, Ecuador, Argentina (Tucumán, Buenos Aires).

- * 817. **Elaenia obscura obscura** (Lafresnaye et d'Orbigny) Obscurito.
Muscipeta obscura Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., in Mag. Zool., Vol. 7, cl. 2. 1837, p. 48. Bolivia (Yungas).
Elaenia obscura, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 339.
 Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul), Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina (Misiones, Santa Fé, Tucumán).
- * 818. **Elænia viridicata viridicata** (Vieillot) Piojito copetón.
Sylvia viridicata Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817, p. 171. Paraguay.
Myiopagis viridicata viridicata, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 333.
 Distribución. — Brasil (Piauhy, Pará hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina (Tucumán).
- * 819. **Elaenia caniceps caniceps** (Swainson) Fiú-fiú.
Tyrannula caniceps Swainson, Ornith. Draw., Part 5, 1837, pl. 49. Brasil.
Myiopagis caniceps, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 333.
 Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauhy, Bahía, hasta Matto Grosso, Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Jujuy, Salta).

430. SUIRIRI d'Orbigny, 1839

- * 820. **Suiriri suiriri** (Vieillot) Suirirí.
Muscicapa suiriri Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 21, 1818, p. 487. Paraguay.
Empidagra suiriri, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 339.
 Distribución. — E. Bolivia (Brasil, Matto Grosso, São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (por todo el norte hasta La Pampa).

431. SUBLEGATUS Sclater et Salvin, 1868

- * 821. **Sublegatus modestus modestus** (Wied) Copetón.
Muscipeta modesta Wied, Beitr. Naturg. Bras., Vol. 3, 1831, p. 923. Brasil (Bahía, y Camamú).
Sublegatus fasciatus fasciatus, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 340.
 Distribución. — Perú, Brasil (Piauhy, Bahía hasta Matto Grosso y Río Grande do Sul), Bolivia, Paraguay, Argentina (Tucumán, Sgo. del Estero, Chaco, Santa Fé hasta Buenos Aires, La Pampa, Mendoza).

432. PHAEMYIAS Berlepsch, 1902

- * 822. **Phaemyias murina murina** (Spix) Bagageiro.
Platyrhynchus murinus Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, pl. 16, fig. 2, p. 14. Brasil.
Phaemyias murina, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 334.

Phaeomyias incompta (sic) Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 343.

Distribución. — Brasil (S. Amazonas, Matto Grosso, Goyaz, Minas Geraës, Río Grande do Sul), E. Bolivia, Paraguay, Argentina (Tucumán).

433. CAMPTOSTOMA Sclater, 1857

- * 823. **Camptostoma obsoletum obsoletum** (Temminck) Barriga blanca.

Muscicapa obsoleta Temminck, Nouv. Rec. Pl. col., livr. 46, pl. 275, fig. 1, 1824. Brasil (Paraná, Curytiba).

Ornithion obsoletum obsoletum, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 337.

Distribución. — Brasil (Río de Janeiro, São Paulo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones, Chaco, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos).

434. XANTHOMYIAS Berlepsch, 1907

- * 824. **Xanthomyias virescens virescens** (Temminck) Verdón.

Muscicapa virescens Temminck, Nouv. Rec. Pl. col., 1824. livr. 46, pl. 275, fig. 3; Brasil (Paraná, Curytiba).

Xanthomyias virescens, Dabbene (ex Bertoni), Physis, Vol. 1, 1914, p. 342.

Distribución. — Brasil (Espíritu Santo, Minas Geraës hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

- * 825. **Xanthomyias sclateri sclateri** (Berlepsch) Tirano amarillo.

Phyllomyias sclateri Berlepsch, Journ. Orn., Vol. 49, 1901, p. 90. Bolivia (Santa Cruz y Cochabamba).

Xanthomyias sclateri, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 334.

Distribución. — Bolivia, Argentina (Jujuy, Salta, Tucumán).

435. PHYLLOMYIAS Cabanis et Heine, 1859

- * 826. **Phyllomyias fasciatus brevisrostris** (Spix) Cagasebinho.

Platyrhynchus brevisrostris Spix, Av. Bras., Vol. 2, 1825, p. 13, pl. 15, fig. 2. Brasil (Río de Janeiro).

Phyllomyias brevisrostris, Dabbene, EL HORNERO, Vol. 1, 1918, p. 97.

Distribución. — Brasil (Minas Geraës, Espíritu Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

436. LEPTOPOGON Cabanis, 1844

- * 827. **Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus** Tschudi Movedizo.

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, Faun. Perú, Aves, 1846, p. 162. Brasil (São Paulo, Ypanema).

Leptopogon amaurocephalus var. *icastus*, Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 332.

Distribución. — Brasil (Maranhão, Piauí, Pernambuco hasta Matto Grosso y Santa Catharina), Paraguay, E. Bolivia, Argentina (Misiones, Chaco, Salta, Jujuy.)

437. PIPROMORPHA Gray, 1855

- * 828. **Pipromorpha rufiventris** (Cabanis) Ladrillito.

Mionectes rufiventris Cabanis, in Tschudi, Faun. Perú., Aves, 1846, p. 148. Brasil. Dabbene, Physis, Vol. 1, 1914, p. 342.

Distribución. — Brasil (Espíritu Santo hasta Río Grande do Sul), Paraguay, Argentina (Misiones).

Familia **Phytotomidae** (Cortarramas)

438. PHYTOTOMA Molina, 1782

- * 829. **Phytotoma rara** Molina Cadí, Rara.

Phytotoma rara Molina, Saggio Stor. Nat. Chili, 1782, p. 254. Chile. Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 349.

Distribución. — Chile (Coquimbo hasta Llanquihué), Argentina (Neuquén, Río Negro).

- * 830. **Phytotoma rutila rutila** Vieillot Cortarrama, Quejón, Queo.

Phytotoma rutila Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 26, 1818, p. 64. Paraguay.

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 350.

Distribución. — S. Paraguay, Uruguay, Argentina (Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca hasta Río Negro).

- * 831. **Phytotoma rutila angustirostris** Lafresnaye et d'Orbigny Perezoso.

Phytotoma angustirostris Lafresnaye et d'Orbigny, Syn. Av., 1, in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, cl. 2, p. 37. Bolivia (La Paz).

Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat., Bs. Aires, Vol. 18, 1910, p. 349.

Distribución. — Bolivia (La Paz hasta Tarija), Argentina (Salta).

(Continuará)