

---

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Nota sobre el inmaduro del Vencejo de Collar Blanco, *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw)

Pergolani de Costa, M. J. I.  
1944

Cita: Pergolani de Costa, M. J. I. (1944) Nota sobre el inmaduro del Vencejo de Collar Blanco, *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw). *Hornero* 008 (03) : 491-493

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

**NOTA SOBRE EL INMATURO DEL  
VENCEJO DE COLLAR BLANCO,  
*STREPTOPROCNE ZONARIS ZONARIS* (SHAW)**

POR MARIA JUANA I. PERGOLANI

---

Un lindo ejemplar hembra inmaturo que atribuyo a la especie *Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw), ha sido cazado en Río Tercero, Córdoba (col. Pedro Cristina, 29 de Enero, 1943), no existiendo otro similar en nuestras colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Los jóvenes e inmaturos del género *Streptoprocne* difieren notablemente de los adultos: mientras los adultos son uniformemente negros (excepto el collar blanco), los jóvenes tienen parte de las plumas ribeteadas con blanco y no muestran bien delimitado el collar.

Ridgway (1) da la descripción de joven e inmaturo de *Streptoprocne zonaris mexicana* Ridg., que resulta parecido a nuestro ejemplar. Este tiene las siguientes características, muy bien representadas en la lámina dibujada por el Sr. Magno:

Todas las plumas, excepto las de la espalda, algunas de las cubiertas menores del ala y de los flancos tienen el ápice blanco, siendo en algunas el ribete más ancho que en otras.

Todas las plumas de la cabeza, barba y garganta, tienen el borde blanco bien notable. La frente casi blanca; desde los lados del pico hasta la región preocular (5 mm antes del ojo), más blanco (las bases de las plumas casi no se ven). Presenta una ceja blanca, angosta, pero notable.

El collar blanco, entero y angosto en la parte posterior del cuello; en los lados y anteriormente, moteado de oscuro porque la parte central de las plumas tiene un triángulo negruzco. En la línea media anterior del cuello, el borde de la zona más blanca, que será el futuro collar, dibuja una punta hacia la garganta.


Las plumas de la región inferior, incluyendo tapadas caudales, están terminadas con un borde blanco; desde la mitad de la espalda hasta las cubiertas superiores de la cola, cada pluma con un pequeño punto blanco en el ápice, más grande en las cubiertas caudales.

(1) RIDGWAY, *Bull. U. S. N. M.*, 50, part. V, 1911, p. 700.

Primarias negras con el ápice blanco. Secundarias y cubiertas, lindamente ribeteadas con blanco. Cola negra, ribeteada suavemente con blanquecino; los raquis sobresalen en el ápice.

Coloración de fondo: Abajo castaño muy oscuro, arriba, más oscuro, prácticamente negro con lustre verdoso metálico. Cabeza más clara que el resto.

Medidas: Longitud total: 227 mm; ala: 212; culmen: 9 mm.



*Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw) (vencejo de collar blanco). En primer plano, una ♀ inmadura; detrás, un ♂ adulto. Dibuj. S. MAGNO.

Este ejemplar tiene casi las mismas medidas que los ejemplares más grandes de nuestra colección, debiendo hacer notar que la talla de los adultos de esta misma colección, varía entre 204 y 229 mm, y el ala entre 168 y 213.

Durante mi reciente viaje a Tucumán, he visto las colecciones del Instituto Miguel Lillo, hallando tres ejemplares jóvenes de este vencejo,

muy semejantes al que acabo de describir pero de menor talla; una ♀, n° 808, Tucumán, 28-II-1908, col. Dinelli a 450 m; medidas: l. t., 186; ala, 191,5; pico, 10 mm (el rótulo trae las siguientes medidas: l. t., 200; ala, 190; cola, 180 mm). Un ♂, n° 810, Tucumán, 16-II-1900, col. Dinelli a 450 m; l. t., 196; ala, 203; pico, 11 mm; con el fondo más negro y con más lustre metálico que el anterior y también más notables las puntitas blancas de las plumas de casi todo el cuerpo. Otro ♂, n° 811, Tucumán, 1-IV-1900, col. Dinelli a 450 m; l. t., 194; ala, 211; pico, 10 mm. Se observa mucha variación en las medidas, tanto en los jóvenes como en los adultos.

*Streptoprocne zonaris zonaris* (Shaw), está señalada para Brasil (Río de Janeiro, San Pablo, Río Grande do Sul), Bolivia y, dentro de nuestro territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Mendoza. Tenemos ahora este ejemplar colectado en Córdoba. Debo decir que también en Córdoba nuestro consocio, el Sr. Salvador Magno, dice haber visto numerosos vencejos que atribuye a esta especie.