
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Una nueva subespecie de *Dendrocolaptes pallescens* Pelzeln Steullet, A.; Deautier, E. A. 1950

Cita: Steullet, A.; Deautier, E. A. (1950) Una nueva subespecie de
Dendrocolaptes pallescens Pelzeln. *Hornero* 009 (02) : 175-177

UNA NUEVA SUBESPECIE DE

Dendrocolaptes pallescens PELZELN

Por A. STEULLET y E. DEAUTIER

La dispersión geográfica de esta especie abarca el oeste de Matto Grosso (Brasil), el este de Bolivia, el Paraguay y el noroeste de la Argentina. En 1941, Brodkorb encontró que los individuos que viven en el sudeste del Paraguay (Puerto Gibaja, sobre el alto Paraná, a los 25°40' Lat. S., aproximadamente) presentan variaciones en la tonalidad de la coloración que los alejan de los del Brasil; por esta razón los separó bajo el nombre de *Dendrocolaptes picumnus extimus* (1).

Examinando la colección de *Dendrocolaptes* del Museo Argentino de Ciencias Naturales, nos llamó la atención el tamaño mayor de los ejemplares de proveniencia argentina, respecto de uno coleccionado en Urucúm (cerca de Corumbá, Matto Grosso — topotípico de *pallescens* — y otros coleccionados en el Paraguay y en Bella Vista (Bolivia). Esta comprobación se vió robustecida al cotejarlos con dos especímenes pertenecientes al Museo de La Plata y ocho del Instituto Miguel Lillo, de Tucumán.

He aquí una síntesis de las variaciones de tamaño verificadas, en cuya preparación hemos dejado a un lado las pieles que tienen alguna de sus partes dañadas.

Catorce ejemplares (once machos y tres hembras) capturados en Tucumán, Salta (departamento de Orán) y Jujuy (Fraile Pintado): culmen 35-38 mm.; ala 122-139 mm.; cola (sólo de nueve especímenes) 112 - 130 mm.

En la piel de Urucúm las dimensiones son: culmen 33 mm.; ala (puntas algo gastadas) 121 mm; cola 98 mm (pero la porción distal de los mástiles está muy gastada).

Para fijar la amplitud de estas diferencias, solicitamos del doctor John T. Zimmer, ornitólogo del American Museum (Nueva York) una información acerca de las dimensiones de las pieles de *D. pallescens* que hubiere en ese Instituto. El informe circunstanciado que ese distinguido investigador nos

(1) Brodkorb, *Occas. Papers Mus. Zool. Michigan*, N° 453, 1941, p. 1. Aunque al denominar esta forma la coloca como subespecie de *picumnus* — en lo cual sigue a Zimmer, que considera a *D. picumnus* y *D. pallescens* como una unidad específica. — Brodkorb añade que si la última se mantuviese específicamente separada, la forma *extimus* debería ser tratada como raza de *pallescens* más bien que de *picumnus*.

hizo llegar, y que nos complacemos en agradecer, comprende las medidas tomadas sobre seis pieles procedentes de Urucúm (Matto Grosso), dos de Piedra Blanca (Bolivia), tres del Paraguay y tres de la Argentina. En las seis de Urucúm (dos machos y cuatro hembras) el largo del culmen varía entre 30 y 32 mm, el del ala desde 119 hasta 130 mm (promedio 124,3 mm.); en cuanto a la cola (sólo se dan las medidas de tres, pues en los otros está muy gastada la porción distal de los mástiles), la longitud varía de 111 a 113,5 mm. (promedio 112,5).

En lo que atañe a los de proveniencia argentina, en dos de ellos (capturados en Perico, Jujuy) el culmen mide 34 mm. y el tercero (cazado en "Tafi trail") 31,5 mm.; en los dos primeros el pico es más largo que en los de Urucúm, pero no sucede lo mismo con el otro.

Consideramos que el espécimen que lleva en el rótulo la indicación de haber sido coleccionado en "Tafi trail" (1) es simplemente un caso aberrante, dado que en todos los otros ejemplares argentinos que hemos tenido a mano (18 en total) el pico es netamente más largo que en los de Urucúm, pues hasta en aquéllos en que la parte terminal de la mandíbula está destruída, es posible verificar, por lo que resta, que el culmen poseía una longitud mayor que en los brasileños. Por ello nos parece indudable que los especímenes argentinos constituyen una subespecie bien caracterizada y para ella damos el nombre de

Dendrocolaptes pallescens casaresi.

CARACTERES SUBESPECÍFICOS.—Semejante en coloración a *Dendrocolaptes pallescens* Pelzeln de Urucúm (Matto Grosso), pero de pico más largo; el promedio de la longitud de las alas y de la cola es también mayor.

TIPO.—Nº 1697a de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales; ♂, Concepción (Tucumán), 10 de junio de 1925, Juan Mogensen.

MEDIDAS DEL TIPO.—Culmen expuesto, 38mm, culmen desde la base (desde el frontal), 43,5 mm; ala 139 mm; cola 130 mm.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Por el noroeste de la Argentina: provincia de Tucumán, desde Concepción hacia el norte, este de Salta (departamento de Orán) y de Jujuy (Fraile Pintado y Perico).

Los que viven en el este de Bolivia aparentemente pertenecen a la típica *pallescens*, lo mismo que los del noroeste del Paraguay.

Nos complace en designar esta subespecie en honor del doctor Jorge Casares, a cuya espontánea gestión se debe que el Museo de La Plata iniciase la publicación del "Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina", de que somos autores.

Diferimos para otra oportunidad la descripción del tipo.

EJEMPLARES EXAMINADOS

D. pallescens casaresi. Del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Tucumán: Concepción, tres ♂ ♂ (con exclusión del tipo); Salta: El Cedral (Orán), un ♂ y dos ♀ ♀; Aguaray, dos ♂ ♂ ..

(1) Apuntamos, de paso, la vaguedad de la expresión "Camino de Tafi".

Del Museo de La Plata. Salta: Urundel, ♂ ; Río Zenta (Orán), ♂ .

Del Instituto Miguel Lillo. Jujuy: Fraile Pintado, dos ♂ ♂ y dos ♀ ♀
Salta: Agua Blanca (cerca de Aguaray), dos ♂ ♂; Quebrada de Capiazuti, ♂ ;
Quebrada de Solazuti, ♀ .

D. pallescens pallescens. Del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bra-
síl: Urucúm (cerca de Corumbá) un ejemplar sin indicación de sexo. Bolivia:
Buena Vista (Santa Cruz), ♂ . Paraguay: Puerto Guaraní, ♂ ♀ ; Puerto
Casado, ♂ ♀ .

M E D I D A S

Las dimensiones se expresan en milímetros. En los casos en que el pico
está roto o la cola muy gastada, añadimos una letra "x" para indicar que la
medida no es completa.

LOCALIDAD	SEXO	CULMEN EXPUESTO	ALA	COLA
Tucumán:				
Concepción	♂ ♂ ♂	38 - 37,5 - 33 + x	125 - 126 - 126	112 - 110 + x 110 + x
Salta:				
El Cedral (Orán)	♂ ♀ ♀	37 - 37 - 36,5	126,5 - 128,5 130	113 - 113 - 114 + x
Aguaray	♂ ♂	37 - 37,4	124 - 127	120 - 118
Urundel	♂	37	127	112 + x
Río de Zenta	♂	36,5	130	122
Agua Blanca	♂ ♂	35 - 35	122 - 128	112 + x - 112 + x
Quebrada de Capiazuti ..	♂	32 + x	125	125
Quebrada de Solazuti (1)	♀		130	119
Jujuy:				
Fraile Pintado	♂ ♂ ♀ ♀	35 - 34,5 + x - -38 - 32 + x	124 - 123 - 127 - 125	116 + x - 111 + x 119 - 111 + x

MEDIDAS DE LOS EJEMPLARES DEL AMERICAN MUSEUM

LOCALIDAD	SEXO	CULMEN EXPUESTO	ALA	COLA
Urucum, Matto Grosso (2)	♂ ♂	32 - 31,5	130 - 122	113
Urucum, Matto Grosso (2)	♀ ♀ ♀ ♀	32 - 30 - 31,5 - 31	120 - 127 - 128 - 119	111 - 113,5
Piedra Blanca, Bolivia	♀	29,5	129	118
Piedra Blanca, Bolivia	♂	30	125	108,5
Fort Wheeler, Paraguay ..	♀ ♀	31 - 30,5	126,5 - 124,5	116 - 108
Fort Wheeler, Paraguay ..	♂	28,5	128	108,5
Tafí trail, Tucumán	♀	31,5	—	124
Perico, Jujuy (3)	♂	34	129	—
Perico, Jujuy (3)	♀	34	130	—

(1) No es posible dar la medida del culmen expuesto, pero la longitud desde la base del frontal es de 42,5 mm.

(2) Algunos de los ejemplares tienen la cola muy gastada.

(3) La cola y las alas están muy gastadas, especialmente la cola.