
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Algo sobre el langostero

Delius, J. D.

1953

Cita: Delius, J. D. (1953) Algo sobre el langostero. *Hornero* 010 (01) : 080a-080

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

NOTAS GENERALES

ALGO SOBRE EL LANGOSTERO

A fines de noviembre y comienzos de diciembre de 1951 observé en Monte Buey (Departamento Marcos Juárez, Córdoba) una gran bandada, a la que le calculé unos 3000 individuos, del águila langostera *Buteo swainsoni* Bonaparte.

Venida del norte, esta bandada aniquiló casi por completo a las langostas que dañaban a los cultivos de la región, de modo que pocas llegaron a desovar. Mientras que algunos de los buteoninos se alimentaban, los ya satisfechos se remontaban, planeando a grandes alturas, retirándose todos ellos al anochecer a los montes de eucaliptos, robles, paraísos, etc., para pasar la noche. Al salir el sol se dirigían nuevamente al lugar donde sabían a las mangas de langostas. Cuando éstas quedaron casi exterminadas siguieron hacia el sur, para volver luego cuando aparecieron las mosquitas. Terminadas éstas desaparecieron definitivamente hacia el norte.

Según la señorita Franca Hammerschmidt, se observaron en Cabrera, a unos 150 km del punto antes citado, los mismos rapaces alrededor de la misma fecha. — JUAN D. DELIUS, *Buenos Aires, mayo 13 de 1952.*

INTERESANTE CAPTURA DEL PICAFLOR COLUDO

En Villa María, Córdoba, fué capturado el 16 de agosto de 1952 un ejemplar hembra del picaflor *Sappho sparganura sappho* (Lesson), que pasó a las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires con el número 52-542.

Este troquílido, típicamente serrano, se distribuye geográficamente por el oeste argentino desde Salta hasta Neuquén. Para la llanura no ha sido citado aún en forma categórica, pues Serié y Smyth (Hornero, 3: 45, 1923) lo señalan sin confirmar para Santa Elena (Entre Ríos) y Zotta (Lista Sist. Av. Arg., p. 92, 1944), luego de dar su distribución geográfica normal, agrega « ocasionalmente en Buenos Aires ». Para esta provincia la única cita documentada es la de Pereyra (Av. zona rib. NE prov. Bs. Aires, p. 167, 1938).

Con el ejemplar mencionado, obtenido por uno de nosotros (F. H.), podemos basar una cita para la planicie ya que Villa María se halla a unos cien kilómetros al este de las sierras cordobesas donde el Picaflor coludo es frecuente. — JUAN D. DELIUS y FRANCA HAMMERSCHMIDT, *Buenos Aires, noviembre de 1952.*