EL HORNERO
REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL
Establecida en 1917
ISSN 0073-3407
Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Nidificaciones de aves de la provincia de Santa Fe

De la Peña, M. R.

1973

Cita: De la Peña, M. R. (1973) Nidificaciones de aves de la provincia de Santa Fe. *Hornero* 011 (03) : 219-221

www.digital.bl.fcen.uba.ar
Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

En la mayoría de los nidos había huevos en avanzado estado de incubación y muchos próximos a la eclosión. Repetidamente vimos pichones rompiendo el cascarón. Todas estas escenas fueron abundamentemente documentadas con fotografías y películas en colores.

La postura común máxima era de tres huevos siendo excepcionales los nidos con dos y sólo fue hallado uno con cuatro. La coloración de los huevos es olivácea clara en la base, con manchas negruzcas, pardas y liláceas desvaídas. Sin embargo, este es sólo el modelo más común, existiendo en la colonia e incluso dentro de la nidada enorme variedad.

Hay huevos con base olivácea oscura, otros celestes y hasta blancuzcos y las manchas pueden estar distribuidas en toda la cáscara, agrupadas hacia el polo obtuso formando corona o muy rara vez hacia el agudo o faltar casi por completo. En general son más claros que los de *L. maculipennis*, su tamaño en milímetros va de 51,2 a 56,2 por 37,2 a 40 (promedio 54,3 por 38,9), y su peso varía entre 30 y 40 gramos aproximadamente.

Conclusión: Como era de prever y de acuerdo a la opinión de Venturi mencionada en la obra de Escalante ya citada, y a la de Pereyra (Mem. Jard. Zool. La Plata 9: 120, 1938), la Gaviota de Capucho gris, *Larus cirrhocephalus*, nidifica en la República Argentina, siendo éste, según suponemos, el primer hallazgo de una colonia en tierra firme y además la primera vez que la misma ha sido suficientemente documentada con huevos, pichones y fotografías.

Agradecimiento: Al doctor Fernando A. Román, intendente de Melincué y al señor Horacio Romera, Secretario de Obras Públicas, por la colaboración prestada a nuestra labor y por su profunda preocupación conservacionista. Al doctor Víctor Constantino Alday, médico de la localidad de Carreras, por haber puesto a nuestra disposición la lancha, sin la cual hubiese sido imposible llegar a la colonia.

S. Narosky y D. Izurieta

NIDIFICACIONES DE AVES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Nido de **Euscarthmornis margaritaceiventer**

El día 24 de noviembre de 1971, en la zona rural de Arroyo Leyes, distante unos 35 kilómetros de Santa Fe, en un monte que rodeaba un río, se encontró un nido de *Euscarthmornis margaritaceiventer.*

En una parte sombría del monte, donde se formaba una pequeña galería de plantas y enredaderas, pendía de una rama fina el nido.

Este tiene forma de una pequeña bolsita con entrada lateral.

Está construido con fibras vegetales entrelazadas, bastante mullido. En la parte inferior las fibras son largas y tienen entretejidas corteza de árboles y pequeñas raicillas.

La cámara de postura está forrada principalmente con plumas y algunas cerdas. El largo del nido es de unos 20 centímetros y las fibras vegetales, entrelazadas con corteza de árboles, cuelgan unos 25 centímetros más.

La boca situada en un costado está a unos 15 centímetros del extremo superior del nido. Tiene forma circular, de unos 3 centímetros de diámetro y presenta un pequeño alero.

El ancho del nido es de 6-7 centímetros y la profundidad de la taza de 5 centímetros.

Estaba a 1,30 metros del suelo.

El primer día de observación tenía un huevo; al quinto, dos.

El huevo es de color crema, con pintas marrones claras.

Medidas: 13 por 18 milímetros.

Nido de *Euscarthmornis margaritaceiventer*, mostrando la entrada lateral.

Nido de **Elaenia spectabilis**

Viudita grande

Las observaciones se realizaron entre el 26-2-71 y 10-3-71 en la zona rural, ubicada a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza (Santa Fe).

Los nidos fueron hallados en montes formados principalmente por: Aromos, Cina-cina, Chañar y Talas.

Entre las fechas indicadas fueron observados cuatro nidos.

Nido Nº 1 — Construido en una horqueta de una rama lateral de una Cina-cina a unos 2,30 metros del suelo. Tenía un pichón y un huevo. El pi-



Nido de *Elaenia spectabilis*, con dos huevos.

chón fue observado a los diez días, estando bien emplumado, pronto para abandonar el nido.

Nido Nº 2 — Construido en una bifurcación del tronco principal de un Chañar, a unos 4 metros del suelo. No fue posible observarlo. La pareja estuvo siempre muy cerca del nido.

Nido Nº 3 — Construido en una bifurcación del tronco principal de un Chañar, a unos 4 metros del suelo, con dos huevos en avanzado estado de incubación.

Nido Nº 4 — Construido en una rama lateral de un Chañar a unos 4 metros del suelo. Uno de los ejemplares traía insectos al nido, no fue posible observarlo, pero pienso que tenía pichones.

El nido es una pequeña tacita de unos 8 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura. Es construido con fibras vegetales, recubierto en su parte externa por líquenes y en la interna tapizado con plumas de palomita (*Columbina picuí*).

El huevo es de color crema claro con pintas y manchas marrones oscuras y claras, en mayor cantidad en el polo obtuso. Medidas del huevo: 25 por 17 milímetros.

Los pájaros estaban en parejas, cuidando sus nidos y eran relativamente mansos. Generalmente estaban en la copa de los árboles. El canto es más bien una especie de silbido fuerte y característico.