
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Registro ocular del Playerito Menor (*Calidris minutilla* Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay

Heinonen, S.; Chebez, J. C.

1988

Cita: Heinonen, S.; Chebez, J. C. (1988) Registro ocular del Playerito Menor (*Calidris minutilla* Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay. *Hornero* 013 (01) : 083-084

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Intihuasi, SL. 3 ? 20,6 gr RA: 20,5-21 gr, 24 Set. 1981, Salinas de Ambargasta, SE. 2 ? 20,5 y 24,5 gr, 6 Mar. 1985, El Cantadero, LR.

Poospiza torquata: ♀ 10 gr, 10 Jul. 1967, Oran, SA.

Poospiza erythrophrys: 2 ♀ 14 y 14 gr y 1 ♂ 15 gr, 19 Oct. 1976, Santa Bárbara, JU. 7 ? X: 15,6 gr DS: ± 1,06 RA: 14,2-17,2 gr, Mar. 1984 y 1985, El Cantadero, LR.

AGRADECIMIENTOS

A Manuel Nores por la concreción de varias salidas al campo, en las que el autor obtuvo la mayoría de los datos. A Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y permitir al autor trabajar con la colección ornitológica del Instituto Fundación Miguel Lillo. El trabajo de campo fue realizado con un subsidio proveniente del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves, acordado a Manuel Nores.

BIBLIOGRAFIA CITADA

Contreras, J.R. 1975. Características ponderables de las aves del Parque Nacional Nahuel Huapi y regiones adyacentes. *Physis* 34: 97-107.

———. 1979. Bird weights from northeastern Argentina. *Bull. B.O.C.* 99: 21-24.

———. 1983a. Notas sobre peso de aves argentinas. I. *Hist. Nat.* 3: 16.

———. 1983b. Notas sobre peso de aves argentinas. II. *Hist. Nat.* 3: 39-40.

———. 1983c. Notas sobre peso de aves argentinas. III. *Hist. Nat.* 3: 95-96.

———. y Y.E. Davis. 1980. Aportes para el conocimiento del peso de las aves argentinas. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 21-29

Fiora, A. 1933. El peso de las aves. *Hornero* 5: 174-188.

———. 1934. El peso de las aves. *Hornero* 5: 353-365.

* *Bv. Sarmiento 698, 5900 Villa María, Córdoba, Argentina.*

Registro ocular del playerito menor (*Calidris minutilla* Charadriiformes, Scolopacidae) en Uruguay

Sofía Heinonen* y Juan Carlos Chebez**

ABSTRACT.- The ocular observation of *Calidris minutilla* on the Uruguayan coast is commented, thus including it in that countries avifauna.

Durante los días 10 y 11 de noviembre de 1985, en ocasión de una excursión que los autores efectuaron en compañía de Guillermo Heinonen a La Barra del Arroyo Maldonado (34° 52' S, 55° 10' W), en los alrededores de Punta del Este (Dpto. Maldonado) en la República Oriental del Uruguay, pudieron registrar la presencia de varios ejemplares de un pequeño escolopácido que identificaron como *Calidris minutilla*.

Las aves se hallaban preferentemente en el borde de unas pequeñas matas de gramíneas halófilas (pastos marinos) que crecían inmediatamente por detrás de los roquedales costeros ubicados al este de la desembocadura del Arroyo Maldonado en el Atlántico, y donde también solían posarse en compañía del abundante *Pluvialis dominica* y *Calidris fuscicollis*.

También se registraron en el área *Charadrius falklandicus* y *Calidris canutus*.

En esos días, entre las 9 y 11 hs., se los visualizó en cinco ocasiones. desde una distancia que oscilaba entre los 8 y 15 m con la ayuda de unos binoculares 8 x 30 mm, tratándose de individuos solitarios en vuelo o posados, impidiendo el estado del tiempo fotografíarlos. El 26 de diciembre, en otra excursión por el mismo sitio, uno de los autores pudo volver a observarlos tratándose en esta oportunidad de un grupo de 4 ejemplares.

Calidris minutilla, conocido con los nombres vulgares de playerito diminuto, menor o enano, era fácilmente distinguible por sus patas amarillentas, su conspicua banda alar blanca que se ve muy bien en vuelo y su menor tamaño, siendo confundible en nuestra zona con *Calidris fuscicollis* quien posee una notable rabadilla blanca y patas oscuras, *Calidris bairdii* quien posee también patas oscuras y rabadilla partida y *Calidris pusilla* del que se distingue por el pico más fino, el dorso más oscuro, el pecho estriado en forma definida, las patas amarillentas y su tamaño levemente menor.

Su distribución regular abarca desde las costas del Atlántico y Pacífico en los Estados Unidos, hasta las del norte del Brasil. Ocasionalmente alcanza Bolivia donde Gildenstolpe lo cita por primera vez en 1945, confirmando su presencia Schmitt et al. (1986). Para Chile se lo conoce por dos registros, el primero es un ejemplar capturado el 4 de octubre de 1948 en Caleta Vitor, 20 km al sur de Arica (Goodall et. al 1964) y el segundo una captura efectuada en Playa Changa (Bahía de Coquimbo) efectuada por M. Sallaberry, P. Meyer y E. Tabilo (1985). También Araya (1985) lo menciona para este país.

En Brasil habita las costas de Pará y Pernambuco, siendo Bahía su extremo meridional de dispersión (Sick 1985). Naumburg (1930) lo cita para Matto Grosso (Cuyabá, Engenho do Cap. Gama), Pernambuco, Pará, Bahía, Marajó (Taperá, S. Natal). Belton (1984) no lo señala para Rio Grande do Sul.

Gore & Gepp (1978) y Cuello (1985) no citan a *Calidris minutilla* para Uruguay, tampoco en la literatura hay denuncia para Argentina por la que la presente sería la localidad más austral para la costa atlántica de Sud América, ubicada a unos 1500 km más al sur que Bahía, lugar de Brasil considerado, hasta ahora, como límite sur de la distribución de invernada para esta especie en la costa oriental del continente.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Araya, B. 1985. Lista patrón de las aves chilenas (2da. edición). Public. Ocas. N.3, Inst. Oceanología, Univ. de Valparaíso.
- Belton, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 1. Rheidae through Furnariidae. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 178; 369-631.
- Cuello, P. 1985. Lista de referencia y bibliografía de las aves uruguayas. Servicio de divulgación N 1, Mus. Damaso Larrañaga, Montevideo.
- Gildenstolpe, N. 1945. A contribution to the Ornithology of Northern Bolivia. Kungl Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar. Tredje Serien. Band 23 N° 1.
- Goodall, J., Johnson, W., Philippi, R. 1964. 2 suplemento de las aves de Chile, pp. 443-521, Establ. Platt, Bs.As.
- Gore, M.E.J. y A.R.M. Gepp. 1978. Las aves del Uruguay, Montevideo.
- Naumburg. 1930. Birds of Matto Grosso, Brazil. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. LX: 81 1-430.
- Sallaberry, M., P. Mayer y E. Tabilo. 1985. Revista Naturaleza. Chile.
- Schmitt C.G., D.C. Schmitt, J.V. Remsen Jr. y B.D. Glick. 1986. New bird Records for Departamento Santa Cruz, Bolivia. Hornero 12: 307-311.
- Sick, H. 1985. Ornitología brasileira, uma introdução vol. 1, Edit. Univ. de Brasilia, Brasilia.

* Roque Saenz Peña 1240, 1636 Olivos, Buenos Aires, Argentina.

** Fundación Vida Silvestre Argentina. Defensa 245, 1065 Capital Federal, Argentina.